

# 1. Gyakorlat

## Középiskolai ismeretek ismétlése.

**F1. (Egyenletek megoldása).** Oldjuk meg  $\mathbb{R}$ -en a következő egyenleteket és szemléltessük megoldáshalmazukat a számegyenesen:

$$(a) \quad x + 2 = \sqrt{4x + 13},$$

$$(b) \quad \left| \frac{3x + 2}{x - 1} \right| = 3.$$

**F2. (Abszolútértékes egyenlőtlenség megoldása).** Oldjuk meg  $\mathbb{R}$ -en a következő egyenlőtlenséget, és szemléltessük a megoldáshalmazt a számegyenesen:

$$\left| \frac{x + 2}{2} \right| \leq 3.$$

**F3. (Egyenlőtlenségrendszer felírása).** Írjunk fel olyan egyenlőtlenségrendszert, melynek megoldáshalmaza az  $\mathbf{A}(0, 0)$ ,  $\mathbf{B}(0, 5)$  és  $\mathbf{C}(1, 3)$  csúcspontú háromszög belseje!

**F4. (Körök és parabolák ábrázolása).** Vázlatosan ábrázoljuk azon pontok mértani helyét a síkon, melyekre az alábbi egyenlőtlenségek egyszerre teljesülnek

$$x^2 + y^2 + 2y < 3 \quad \text{és} \quad y^2 < x + 2.$$

**F5. (Halmazműveletek).** Lássuk be, hogy a következő halmazok esetén teljesül, hogy  $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{A} \neq \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{B} \cup \mathbf{C} = \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{2, 10\}$ , ahol

$$\mathbf{A} = \{1, 2, 10\}, \quad \mathbf{B} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 1\}, \quad \mathbf{C} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \geq 1\}.$$

**Opcionális(ha marad idő)**

**F6. (Teljes indukció).** Bizonyítsuk be teljes indukcióval minden  $n \in \mathbb{N}$  természetes számra, hogy

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

**F7. (Indirekt bizonyítás).** Igazoljuk, hogy  $\sqrt{5}$  irracionális szám.