

A1 2. zárthelyi (B) MEGOLDÁS

2022. november 22.

GTK Nemzetközi Gazdálkodás és Pénzügy Számvitel szakos hallgatóinak

1. Számítsuk ki a következő határértékeket!

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-7}{x+1} \right)^{3x} \quad \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x)}{2x}.$$

Megoldás.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-7}{x+1} \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 - \frac{8}{x+1} \right)^{x+1} \right)^{\frac{3x}{x+1}} = (e^{-8})^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{x+1}} = (e^{-8})^3 = e^{-24}. \quad (3 \text{ pont})$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x)}{2x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \cdot \frac{1}{2 \cos(x)} = 1 \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2}.$$

VAGY

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x)}{2x} = \frac{0}{0} \rightsquigarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos^2(x)} = \frac{1}{2}. \quad (2 \text{ pont})$$

2. Írjuk fel az alábbi függvény $x_0 = 0$ ponthoz tartozó érintőjének egyenletét!

$$f(x) = e^{3x} + x^2 - 2.$$

Megoldás.

$$f(0) = e^0 + 0^2 - 2 = 1 - 2 = -1. \quad (1 \text{ pont})$$

$$f'(x) = 3e^{3x} + 2x. \quad (1 \text{ pont})$$

$$f'(0) = 3e^0 + 2 \cdot 0 = 3 \cdot 1 + 0 = 3. \quad (1 \text{ pont})$$

Az érintő egyenlete

$$y = 3(x - 0) - 1 = 3x - 1.$$

(2 pont)

3. Határozzuk meg az alábbi függvény monotonitási intervallumait, lokális szélsőérték helyeit és azok értékét!

$$f(x) = \frac{x+1}{(x-1)^2}.$$

Megoldás. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ (1 pont)

$$f'(x) = \frac{(x-1)^2 - 2(x+1)(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{(x-1) - 2(x+1)}{(x-1)^3} = \frac{-3-x}{(x-1)^3} \quad (1 \text{ pont})$$

A derivált zérushelye $x = -3$, ha $x < -3$ a számláló pozitív, ha $x > -3$ a számláló negatív. A derivált nevezője pozitív, ha $x > -1$, negatív, ha $x < -1$. (1 pont)

x	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	$(1, \infty)$
f'	$-$	0	$+$	$-$
f	\searrow	\min	\nearrow	\searrow

A lokális minimum értéke: $-\frac{1}{8}$. (2 pont)

4. Van-e az f függvénynek aszimptotája? Ha igen, akkor határozzuk meg!

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}.$$

Megoldás. $D_f = \mathbb{R}$, mivel $x^2 + 1 > 0$ minden $x \in \mathbb{R}$ -re teljesül. A függvénynek nincs szakadási helye így nincsen függőleges aszimptóta (1 pont)

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{x^2 + 1} = \infty$, tehát a függvénynek a $\pm\infty$ -ben nincs is vízszintes aszimptotája. (1 pont)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 1} - x = \text{"}\infty - \infty\text{"} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Ferde aszimptotája tehát a ∞ -ben az $y = x + 0 = x$ egyenes. (2 pont)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{(-1)|x|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{-1} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + 1} + x = \text{"}\infty + (-\infty)\text{"} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} - x} = \frac{1}{\infty - (-\infty)} = 0.$$

Ferde aszimptotája a $-\infty$ -ben az $y = -x$. (1 pont)