

## 9. Gyakorlat

### Teljes függvényvizsgálat.

**F1. (Fgv.vizsgálat.)** Az alábbi függvényeken végezzünk teljes függvényvizsgálatot:

1. értelmezési tartomány,
2. zérushely,
3. paritás, periodicitás,
4. határértékek, aszimptoták,
5. első derivált: monotonitás, lokális szélsőértékek,
6. második derivált: konvexitás, inflexiós pontok,
7. grafikon vázolása,
8. értékkészlet.

$$(a) f(x) = x^4 - 5x^2 + 4,$$

$$(b) f(x) = \left( \frac{x-1}{2x+1} \right)^2,$$

$$(c) f(x) = \frac{x^2 - 3}{2 - x} \quad (\mathbf{hf}),$$

$$(d) f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6},$$

$$(e) f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

**Megoldás [F1(a)].**  $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$

1. értelmezési tartomány:  $\mathbb{R}$
2. zérushely:  $a = x^2$  helyettesítéssel másodfokú kifejezés  $a^2 - 5a + 4 = 0$  gyökei az 1 és a 4. Így a függvény szorzat alakja:  $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$ .
3. paritás:  $f(-x) = (-x)^4 - 5(-x)^2 + 4 = x^4 - 5x^2 + 4 = f(x)$ , tehát páros.  
periodicitás: nem periodikus (pl. véges sok nullhely van).

4. értelmezési tartomány széléin határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 - 5x^2 + 4 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^4 \left( 1 - \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^4} \right) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 - 5x^2 + 4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 \left( 1 - \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^4} \right) = \infty$$

Nincs vízszintes aszimptota.

Ferde aszimptota van-e?

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 - 5x + 4 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left( 1 - \frac{5}{x^2} + \frac{4}{x^3} \right) = \infty,$$

így nincs ferde aszimptota a  $+\infty$ -ben. Hasonló számolással kapjuk, hogy a  $-\infty$ -ben sincsen.

5. első derivált:  $f'(x) = 4x^3 - 10x = 2x(2x^2 - 5)$ ,

melynek  $x = 0$  és  $x = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}$  a zérushelyei.


$x$	$(-\infty, -\sqrt{\frac{5}{2}})$	$-\sqrt{\frac{5}{2}}$	$(-\sqrt{\frac{5}{2}}, 0)$	$0$	$(0, \sqrt{\frac{5}{2}})$	$\sqrt{\frac{5}{2}}$	$(\sqrt{\frac{5}{2}}, +\infty)$
$f'$	-	0	+	0	-	0	+
$f$	$\searrow$	<i>max</i>	$\nearrow$		$\searrow$	<i>min</i>	$\nearrow$

A lokális maximum értéke:  $f(0) = 4$ , a lokális minimum értéke:  $f(-\sqrt{\frac{5}{2}}) = f(\sqrt{\frac{5}{2}}) = -\frac{9}{4}$ .

6. második derivált:  $f''(x) = 12x^2 - 10$ , melynek nullhelyei az  $x = \pm\sqrt{\frac{5}{6}}$ .

$x$	$(-\infty, -\sqrt{\frac{5}{6}})$	$-\sqrt{\frac{5}{6}}$	$(-\sqrt{\frac{5}{6}}, \sqrt{\frac{5}{6}})$	$\sqrt{\frac{5}{6}}$	$(\sqrt{\frac{5}{6}}, +\infty)$
$f'$	+	0	-	0	+
$f$	$\smile$	<i>infl</i>	$\frown$	<i>infl</i>	$\smile$

7.



8. értékkészlet:  $\left[-\frac{9}{4}, \infty\right)$ .

**Megoldás [F1(b)].**  $f(x) = \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2$

1. értelmezési tartomány:  $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

2. zérushely:

3. paritás:  $f(-x) = \left(\frac{-x-1}{-2x+1}\right)^2 = \left(\frac{x+1}{2x-1}\right)^2 \neq \pm f(x)$ , tehát nincs paritása.

periodicitás: nem periodikus (pl. véges sok nullhely van).

4. értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 = \frac{9}{4} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} \left(\frac{1}{2x+1}\right)^2 = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{(0^+)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 = \frac{9}{4} \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^-} \left(\frac{1}{2x+1}\right)^2 = \frac{9}{4} \cdot \frac{1}{(0^-)^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-\frac{1}{x}}{2+\frac{1}{x}}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-1}{2x+1}\right)^2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1-\frac{1}{x}}{2+\frac{1}{x}}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

$y = -\frac{1}{2}$ -nél függőleges aszimptota van. Az  $x = \frac{1}{4}$  vízszintes aszimptota.

5. első derivált:  $f'(x) = 2 \cdot \frac{x-1}{2x+1} \cdot \frac{2x+1-2(x-1)}{(2x+1)^2} = \frac{6(x-1)}{(2x+1)^3}$ , melynek  $x=1$  a zérushelye.


$x$	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, 1)$	1	$(1, \infty)$
$f'$	+	-	0	+
$f$	$\nearrow$	$\searrow$	<i>min</i>	$\nearrow$

A lokális minimum értéke:  $f(1) = 0$ .

6. második derivált:  $f''(x) = 6 \cdot \frac{(2x+1)^3 - (x-1)3(2x+1)^2 \cdot 2}{(2x+1)^6} = 6 \cdot \frac{(2x+1) - 6(x-1)}{(2x+1)^4} = 6 \cdot \frac{7-4x}{(2x+1)^4}$ , melynek nullhelye az  $x = \frac{7}{4}$ .

$x$	$(-\infty, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, \frac{7}{4})$	$\frac{7}{4}$	$(\frac{7}{4}, \infty)$
$f''$	+	+	0	-
$f$	$\smile$	$\smile$	<i>infl</i>	$\frown$

7.



8. értékkészlet:  $[0, \infty)$ .

**Megoldás [F1(c)].**  $f(x) = \frac{x^2 - 3}{2 - x}$

1. értelmezési tartomány:  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

2. zérushely:  $x = \pm\sqrt{3}$

3. paritás:  $f(-x) = \frac{(-x)^2 - 3}{2 + x} = \frac{x^2 - 3}{2 + x} \neq f(x)$ , tehát nincs paritása.

periodicitás: nem periodikus (pl. véges sok nullhely van).

4. értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 3}{2 - x} = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 3}{2 - x} = \frac{1}{0^+} = \infty$$

Az  $x = 2$  függőleges aszimptóta.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3}{2 - x} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3}{2 - x} = \infty$$

Nincs vízszintes aszimptota.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{3}{x}}{2 - x} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) + x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3 + 2x - x^2}{2 + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-3 + 2x}{2 + x} = 2$$

így a ferde aszimptota a  $+\infty$ -ben  $y = -x + 2$ . Hasonló számolással kapjuk, hogy a  $-\infty$ -ben ugyanez az egyenes.

5. első derivált:  $f'(x) = \frac{2x(2-x) + (x^2-3)}{(2-x)^2} = \frac{4x - x^2 - 3}{(2-x)^2}$ ,

melynek  $x = 3$  és  $x = 1$  a zérushelyei.

$x$	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	$(2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$f'$	-	0	+	+	0	-
$f$	$\searrow$	<i>min</i>	$\nearrow$	$\nearrow$	<i>max</i>	$\searrow$


A lokális minimum értéke:  $f(1) = 2$ , a lokális maximum értéke:  $f(3) = -6$ .

6. második derivált:  $f''(x) = \frac{(4-2x)(2-x)^2 + (4x-x^2-3)2(2-x)}{(2-x)^4} = \frac{2}{(2-x)^3}$ , melynek

nincs zérushelye.

$x$	$(-\infty, 2)$	$(2, \infty)$
$f'$	+	-
$f$	∪	∩

7.



8. értékkészlet:  $\mathbb{R} \setminus (-2, -6)$ .

**Megoldás [ F1(d) ].**  $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$

1. értelmezési tartomány:  $\mathbb{R} \setminus (2, 3)$

2. zérushely:  $x = 2, 3$

3. paritás:  $f(-x) = \sqrt{(-x)^2 + 5x + 6} \neq f(x)$ , tehát nincs paritása.

periodicitás: nem periodikus (pl. véges sok nullhely van).

4. értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \sqrt{x^2 - 5x + 6} = 0$$

Nincs függőleges aszimptóta.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6} = \infty$$

Nincs vízszintes aszimptota.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 - 5x + 6} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5x + 6 - x^2}{\sqrt{x^2 - 5x + 6} + x} = -\frac{5}{2}$$

így a ferde aszimptota a  $+\infty$ -ben  $y = x - \frac{5}{2}$ . Hasonló számolással kapjuk, hogy a  $-\infty$ -ben az  $y = -x + \frac{5}{2}$  egyenes.

5. első derivált:  $f'(x) = \frac{2x - 5}{2\sqrt{x^2 - 5x + 6}}$ ,

melynek  $x = \frac{5}{2}$  a zérushelye.

$x$	$(-\infty, 2)$	$(3, +\infty)$
$f'$	-	+
$f$	$\searrow$	$\nearrow$


6. második derivált:

$$f''(x) = \frac{4\sqrt{x^2 - 5x + 6} - (2x - 5)\frac{2x - 5}{\sqrt{x^2 - 5x + 6}}}{4x^2 - 20x + 24} = \frac{4x^2 - 20x + 24 - (2x - 5)^2}{2^3\sqrt{x^2 - 5x + 6}^3} = -\frac{1}{4\sqrt{x^2 - 5x + 6}^3},$$

melynek nincs zérushelye.

$x$	$(-\infty, 2)$	$(3, \infty)$
$f'$	-	-
$f$	$\frown$	$\frown$

7.



8. értékészlet:  $[0, \infty)$ .

Megoldás [F1(e)].  $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$

1. értelmezési tartomány:  $\mathbb{R}$

2. zérushely: nincs

3. paritás:  $f(-x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{e^x + 1} \neq f(x)$ , tehát nincs paritása.

periodicitás: nem periodikus.

4. értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{-x} + 1} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{0}{1 + 0} = 0$$

Nincs függőleges aszimptóta. Vízszintes aszimptota van a  $\infty$ -ben:  $y = 1$  és a  $-\infty$ -ben is  $y = 0$ . Így a ferde aszimptota nincs.

5. első derivált:  $f'(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^{2x}}{(1 + e^x)^2} = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$ , melynek nincs zérushelye.

$x$	$(-\infty, +\infty)$
$f'$	+
$f$	$\nearrow$

6. második derivált:


$$f''(x) = \frac{e^x(1 + e^x)^2 - 2e^{2x}(1 + e^x)}{(1 + e^x)^4} = \frac{e^x + 2e^{2x} + e^{3x} - 2e^{2x} - 2e^{3x}}{(1 + e^x)^4} = \frac{e^x - e^{3x}}{(1 + e^x)^4} = \frac{e^x(1 - e^x)}{(1 + e^x)^3},$$

melynek zérushelye az  $x = 0$ .

$x$	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \infty)$
$f'$	+	0	-
$f$	$\smile$	<i>infl</i>	$\frown$

7.





8. értékkészlet:  $(0, 1)$ .