

## 10. számelmélet gyakorlat (2008/2009)

1. Jelölje  $|\mathbb{Z}$  és  $|\mathbb{G}$  az egészek illetve a Gauss-egészek közötti oszthatóság relációt, hasonlóan  $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{Z}}$  és  $(\cdot, \cdot)_{\mathbb{G}}$  a megfelelő legnagyobb közös osztót. Bizonyítsd be, hogy ha  $a, b \in \mathbb{Z}$ , akkor

(a)  $a |\mathbb{Z} b \iff a |\mathbb{G} b$ ,

(b) egység szorzótól eltekintve  $(a, b)_{\mathbb{Z}} = (a, b)_{\mathbb{G}}$ .

2. Legyen  $a, b > 0$  relatív prím pár. Bizonyítsd be, hogy  $ab - a - b$  nem áll elő  $ax + by$ ,  $x, y \geq 0$  alakban, de minden nála nagyobb szám igen.

3. Határozd meg az alábbi legnagyobb közös osztókat:

(a)  $(11 - 3i, 8 + i)$ ,

(b)  $(10 - 11i, 16 + 11i)$ .

4. Bontsd fel Gauss-prímek szorzatára az alábbi Gauss-egészeket:

(a)  $270 + 2610i$ ,

(b)  $2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13^2 + 2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 13^2 i$ .

5.  $(39(1 - i)^3, 62(2 + i)^3) = ?$

**HF.** Melyik igaz, melyik hamis?

(a)  $(N(\alpha), N(\beta)) = 1 \Rightarrow (\alpha, \beta) = 1$ .

(b)  $(\alpha, \beta) = 1 \Rightarrow (N(\alpha), N(\beta)) = 1$ .

(c)  $(\alpha, \beta) = (\bar{\alpha}, \beta) = 1 \Rightarrow (N(\alpha), N(\beta)) = 1$ .

(d) Ha  $\alpha = \beta^3$ , akkor  $N(\alpha)$  köbszám.

(e) Ha  $\alpha | \bar{\alpha}$ , akkor  $N(\alpha)$  négyzetszám vagy egy négyzetszám kétszerese.

(f) Ha  $N(\alpha)$  négyzetszám vagy egy négyzetszám kétszerese, akkor  $\alpha | \bar{\alpha}$ .