



**Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem**  
**Matematika Intézet**

**A Matematika A1a tárgy**  
**gyakorlati anyaga**  
vegyész, környezetmérnök és biomérnök hallgatóknak

Összeállította: Ruzsa Zoltán  
Szerkesztette: Nagy Ilona

**BME Budapest**  
**2013**

## 1. feladatsor: halmazok, komplex számok

1. Így szokás halmazokat definiálni:  $\{x \in \text{alaphalmaz} \mid \text{feltételek } x\text{-re}\}$ . Definiáljuk:
- a) 1-nél kisebb pozitív valós számok halmaza,
  - b) racionális; irracionális számok halmaza,
  - c) a négyzetszámok halmaza,
  - d) a második síknegyed pontjai,
  - e)<sup>hf</sup> páros számok halmaza,
  - f)<sup>hf</sup> prímszámok halmaza,
  - g)<sup>hf</sup> az egységsugarú gömbön belüli pontok,
  - h)<sup>hf</sup> harmadfokú polinomok halmaza.
2. Fogalmazzuk meg, hogy mit mondanak a következő állítások. Melyek igazak és melyek nem a valós számok körében? Írjuk fel az állítások tagadását!
- a)  $\forall x \exists y (y > x)$
  - b)  $\exists a \forall b (b^a > 0)$
  - c)  $p > 0 \Rightarrow [\exists q (p = q^2)]$
  - d)<sup>hf</sup>  $\forall x \forall y \exists z (x = y^z)$
  - e)<sup>hf</sup>  $x > 0 \Leftrightarrow [\exists y (y > 0 \wedge x - y > 0)]$
  - f)<sup>hf</sup>  $[x \in \mathbb{N} \wedge y \in (\mathbb{N} \setminus \{1, x\})] \Rightarrow x/y \notin \mathbb{N}$
3. Legyen  $z = 1 - 4i$ . Mi lesz  $\operatorname{Re} z$ ,  $\operatorname{Im} z$ ,  $\bar{z}$ ,  $|z|$ ,  $\arg z$ ?
4. Ábrázoljuk a komplex számsíkon a következő halmazokat:
- a)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| = 2\}$
  - b)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 3\}$
  - c)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < -2\}$
  - d)  $\{z \in \mathbb{C} : |z - 3| = 2\}$
  - e)  $\{z \in \mathbb{C} : |z + i| = |z - 2|\}$
  - f)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 3\}$
  - g)  $\{z \in \mathbb{C} : 1 < \arg z < 2\}$
  - h)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : |z + 2i| = \pi\}$
  - i)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : |z + i| \geq |z|\}$
  - j)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z \geq \operatorname{Re} z\}$
  - k)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : -3 > \operatorname{Re} z \geq 0\}$
  - l)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : z = \bar{z}\}$
5. Mi lehet  $z$ , ha
- a)  $\bar{z} - z = 3$ ,  $\operatorname{Im} z = 2$
  - b)  $\operatorname{Im} z = 1$ ,  $|z| = \sqrt{2}$
  - c)<sup>hf</sup>  $\arg z = 3\pi/4$ ,  $\operatorname{Re} z = 5$
  - d)<sup>hf</sup>  $\operatorname{Re} z = \operatorname{Im} z$ ,  $|z - 2| = 3$
6. Írjuk a következő komplex számokat  $a + ib$  alakba!
- a)  $(1 + 4i)(4 - 2i)$
  - b)  $i^7$
  - c)  $\frac{3 - 2i}{-2 + i}$
  - d)  $\frac{3 - 2i}{3i}$
  - e)<sup>hf</sup>  $i^{2009}$
  - f)<sup>hf</sup>  $\frac{1}{i}$
  - g)<sup>hf</sup>  $\frac{2 - i}{i - 1}$
  - h)<sup>hf</sup>  $(2 + i)^{37}(2 - i)^{38}$

### Emlékeztető

- Logikai jelek:  $\forall$  minden;  $\exists$  létezik;  $\exists!$  létezik egyetlen;  $\wedge$  és;  $\vee$  vagy;  $\neg$  nem;  $\Rightarrow$  következik;  $\Leftrightarrow$  ekvivalens;
- Halmazok:  $\mathbb{N}$  természetes számok;  $\mathbb{Z}$  egészek;  $\mathbb{Q}$  racionálisok;  $\mathbb{R}$  valós számok;  $\emptyset$  üres halmaz.
- A *komplex számok* a  $z = a + ib$  ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) alakú számok, ahol  $i = \sqrt{-1}$ . Az itt szereplő  $a$  a szám *valós része*, azaz  $\operatorname{Re}(z) = a$ , míg  $b$  az *imaginárius*, vagy *képzetes része*, azaz  $\operatorname{Im}(z) = b$ . Minden 0-tól különböző komplex szám alkalmas  $r \geq 0$ ,  $0 \leq \varphi < 2\pi$ -vel egyértelműen írható  $z = r \cos \varphi + ir \sin \varphi$  alakba. Itt  $r$  a szám *abszolút értéke*, azaz  $|z| = r$ ,  $\varphi$  az *argumentuma*, azaz  $\arg(z) = \varphi$ .
- Egy  $z = a + ib$  komplex szám *konjugáltja*:  $\bar{z} = a - ib$ .

## 2. feladatsor: komplex számok, $n$ -edik gyökvonás

1. Ábrázoljuk a komplex számsíkon a következő halmazokat:

- a)  $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z + 1) = |z - 1|\}$
- b)  $\{z \in \mathbb{C} : |z| > 5, \operatorname{Im}(z) \geq \operatorname{Re}(z)\}$
- c)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : |z| < |z - 2i|, |z - i| \leq 1\}$
- d)<sup>hf</sup>  $\{z \in \mathbb{C} : |z + i| + |z + 3| = 7\}$

2. Írjuk a következő komplex számokat  $a + ib$ , esetleg  $r \cos \varphi + ir \sin \varphi$  alakba!

- a)  $(1 - i)^{997}$
- b)  $\sqrt{2}$
- c)  $\sqrt{i}$
- d)  $\sqrt[3]{1}$
- e)  $\sqrt[3]{1 + i}$
- f)<sup>hf</sup>  $\sqrt[3]{27i}$
- g)<sup>hf</sup>  $(1 + i\sqrt{3})^{100}$
- h)<sup>hf</sup>  $\sqrt{\frac{i}{i - 3}}$
- i)<sup>hf</sup>  $\frac{\sqrt{i}}{1 - i}$

3. Oldjuk meg a következő egyenleteket a komplex számok körében. Az egyenletekben szereplő polinomoknak írjuk fel a gyöktényezőző felbontását!

- a)  $z^2 - iz + 3 + 2i = 0$
- b)  $z^3 - 8 = 0$
- c)<sup>hf</sup>  $\bar{z} - z = 0$
- d)<sup>hf</sup>  $3z^2 - iz^2 + 3iz + 6 - i = 0$
- e)<sup>hf</sup>  $z^6 + 16z^2 = 0$

4. Adjuk meg az összes olyan  $z$  komplex számot, amelyre

- a)  $\operatorname{Re}(z) + 2 \operatorname{Im}(z) = 0$  és  $\operatorname{Re}(z^2) - 2 \operatorname{Im}(z) = 1$
- b)  $z^2 + \bar{z} = 0$
- c)<sup>hf</sup>  $\operatorname{Re}(z^2) = 2 \operatorname{Im}(z)$  és  $\operatorname{Im}(z^2) = 2 \operatorname{Re}(z)$

5. Hány komplex gyöke lehet egy hetedfokú valós együtthatós polinomnak?

6. Egy szabályos hatszög egyik csúcsa  $2 + i$ , középpontja  $3 + 2i$ . Írjuk fel a többi csúcsát!

7.<sup>hf</sup> Van-e olyan  $z$  komplex szám, amelyre  $\bar{z}^2$ , (azaz  $(\bar{z})^2$ ) és  $z^{-2}$  (azaz  $(z)^{-2}$ ) egyenlő?

8.<sup>hf</sup> Hol a hiba?  $-1 = i^2 = i \cdot i = \sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{(-1)(-1)} = \sqrt{1 \cdot 1} = \sqrt{1}\sqrt{1} = (\sqrt{1})^2 = 1$

### Emlékeztető

$$- (r \cos \alpha + ri \sin \alpha)(s \cos \beta + si \sin \beta) = rs(\cos(\alpha + \beta) + i \sin(\alpha + \beta)).$$

$$- \sqrt[n]{r(\cos \alpha + i \sin \alpha)} = \sqrt[n]{r} \left( \cos \left( \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left( \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right) \quad \text{ahol } k = 0, 1, \dots, (n-1)$$

### 3. feladatsor: sorozatok határértéke

1. Állapítsuk meg, hogy nullsorozat-e! Ha igen, akkor oldjuk meg a *közelítés alapfeladatát*, azaz a definíció alapján keressünk  $N$  küszöböt tetszőleges  $\varepsilon > 0$ -hoz.

a)  $a_n = 0$

b)  $b_n = \frac{1}{n}$

c)  $c_n = (-1)^n$

d)  $d_n = \frac{1}{n^2}$

e)<sup>hf</sup>  $e_n = \sin n$

f)<sup>hf</sup>  $f_n = \frac{(-1)^n}{\log_{10} n}$

2. Határozzuk meg a határértékeket, és keressünk  $N$  küszöböt  $\varepsilon$ -hoz a definíció alapján!

a)  $\lim \frac{3n-1}{4n+99}$

b)  $\lim \frac{3n^2+4n+7}{n^2+n+1}$

c)  $\lim \frac{n^2-10^8}{5n^6+2n^3-1}$

d)<sup>hf</sup>  $\lim \frac{7n+4}{2n-1}$

e)<sup>hf</sup>  $\lim \frac{5n^3-2}{n^3+3}$

f)<sup>hf</sup>  $\lim \frac{n-6}{6n^2+16}$

3. Íjuk fel formulával (minél kevesebb zárójellel) az  $a_n$  sorozatra vonatkozó állításokat:

a)  $a_n$  korlátos,

b)  $a_n$  monoton növekvő,

c)<sup>hf</sup>  $a_n \not\rightarrow a$ ,

d)<sup>hf</sup>  $a_n$  divergens.

4. Számítsuk ki az  $a_n = \left(\sqrt{n^2+n-3} - n\right)$  sorozat határértékét, és keressünk  $N$  küszöbindexet az  $\varepsilon = 0.01$  hibahatárhoz! Bizonyítsuk be, hogy tényleg annyi a határérték!

5.<sup>hf</sup> Egy egyre pontosodó mérési sorozat  $n$ -edik mérésének eredménye  $a_n = 1 + (-1)^{n+1}2^{3-n}$ . Hányadik mérés után csökken a mért mennyiség és a mért érték eltérése (azaz a hiba)  $\varepsilon = 10^{-4}$  alá?

6. Vizsgáljuk konvergencia szempontjából az alábbi sorozatokat:

a)  $a_n = \frac{(n+1)!}{(5-2n)n!}$

b)  $b_n = \frac{\binom{n}{2}}{\binom{n}{3}}$

7.<sup>hf</sup> A gonosz varázsló mindennap arannyá változtatja a Földön lévő vízmennyiség felét. Mennyi idő múlva csökken a vízkészlet 1 pohányi alá? (A Földön kb.  $1386 \cdot 10^6$  km<sup>3</sup> víz van.) Mennyi idő múlva marad csak 1 vízmolekula?

### Emlékeztető

– Az  $a_1, a_2, \dots, a_k, \dots$  valós számokból álló *sorozatot* ( $a_n$ ) jelöli.

– Az  $a_n$  sorozat *nullsorozat*, ha  $\forall \varepsilon > 0$ -hoz  $\exists N \in \mathbb{N}$ , hogy  $n > N$  esetén  $|a_n| < \varepsilon$ . Ezt kétféleképp lehet jelölni:  $a_n \rightarrow 0$  vagy  $\lim a_n = 0$ .

– Az  $a_n$  sorozat *határértéke az  $a$  szám*, jelölve  $a_n \rightarrow a$  vagy  $\lim a_n = a$ , ha  $a_n - a$  nullsorozat. Ekkor  $a_n$  *konvergens*, különben *divergens*.

(Közvetlenül ez így is fogalmazható:  $\lim a_n = a$ , ha  $\forall \varepsilon > 0$ -hoz  $\exists N \in \mathbb{N}$ , hogy  $n > N$  esetén  $|a_n - a| < \varepsilon$ .)

#### 4. feladatsor: sorozatok határértéke

1. Vizsgáljuk: korlátosság, supremum, infimum, határérték.

a)  $\frac{\cos(n\pi)}{n} + (-1)^{n+1}$       b)  $(-2)^n + \frac{1}{n!}$       c)  $n^{-n}$       d)  $n^{(-1)^n}$

2. Mennyi lehet  $\lim a^n$  értéke ( $a$ -tól függően,  $a \in \mathbb{R}$ )?

3. Számoljuk ki a határértékeket:

<p>a) <math>\lim \frac{n^{-1}}{1+n^{-2}}</math></p> <p>c) <math>\lim \frac{n^{22} + 18n^{18}}{8n^{22} - 4n^2}</math></p> <p>e) <math>\lim \frac{5^n + 401n + 402}{2^{2n} + n - 88}</math></p> <p>g) <math>\lim \left( \sqrt{4n-3} - \sqrt{n+9} \right)</math></p> <p>i) <math>\lim \left( \sqrt{n^4 + 2n} - n^2 \right)</math></p>	<p>b) <math>\lim \frac{n^5 - 216n^2 + n - 2}{-n^8 + 500n^4 + 86}</math></p> <p>d) <math>\lim \frac{2^n + 82n^{47} + 23610}{-14n^{25} + 2n^8 + 3}</math></p> <p>f) <math>\lim \frac{25n! + n^{25}}{25n^n}</math></p> <p>h) <math>\lim \left( \sqrt{2n^2 + 5n} - \sqrt{2n^2 - n} \right)</math></p> <p>j) <math>\lim \frac{1}{n - \sqrt{n^2 + 3n + 5}}</math></p>
--	---

4. Igaz? Hamis?

a) ha $a_n \rightarrow a$ , akkor $a_n^2 \rightarrow a^2$	b) ha $a_n^2 \rightarrow a^2$ , akkor $a_n \rightarrow a$
c) ha $a_n > 0$ és $b_n \rightarrow \infty$ , akkor $a_n b_n \rightarrow \infty$	d) $a_n \rightarrow 0 \Rightarrow 1/a_n \rightarrow \infty$
e) $a_n \rightarrow \infty \Rightarrow 1/a_n \rightarrow 0$	f) [ $a_n > 0$ és $a_n$ konvergens] $\Rightarrow \lim a_n > 0$
g) [ $a_n$ korlátos, $b_n \rightarrow 0$ ] $\Rightarrow a_n b_n \rightarrow 0$	

5.<sup>hf</sup> Számoljuk ki a következő határértékeket:

<p>a) <math>\lim \frac{n^{2/3} + 8n^{\sqrt{3}} + \sqrt{n} + 12}{n^2 + 5n - 7}</math></p> <p>c) <math>\lim \frac{9\sqrt[3]{n} - 3\sqrt{2n} + 1}{\sqrt[4]{n} + \sqrt{3n}}</math></p> <p>e) <math>\lim \frac{(-3)^{n+1} + 2^{2n+3}}{8 + 5^n}</math></p> <p>g) <math>\lim \frac{4^{n-1} + n^5 \cdot 3^{n+3}}{2^{2n+3} + 2^{n-3}}</math></p> <p>i) <math>\lim \left( \sqrt{9n^2 + 7} - \sqrt{9n^2 + 2n + 5} \right)</math></p>	<p>b) <math>\lim \frac{n^{-2} + 4}{2n^{-3} - 1}</math></p> <p>d) <math>\lim \frac{\log_{10}(n^2) + 3}{\log_3(n) - 1}</math></p> <p>f) <math>\lim \frac{n^3 \cdot 2^n + 3^n}{2^{2n} - 3n^2}</math></p> <p>h) <math>\lim \frac{7^n + n^7 + 7}{2^{2n} + (2n)^2 + 2}</math></p> <p>j) <math>\lim \left( \sqrt[3]{n^3 - 3n + 3} - \sqrt[3]{n^3 + 123n^2 - 1} \right)</math></p>
---	--

6.<sup>hf</sup> Legyen  $p(x)$  és  $q(x)$  egy-egy polinom. Adjunk módszert  $\lim \frac{p(n)}{q(n)}$  meghatározására!

#### Emlékeztető

- Ha  $a_n$  divergens, de  $\forall K$ -hoz  $\exists N \in \mathbb{N}$ , hogy  $n > N$  esetén  $a_n > K$ , akkor  $a_n \rightarrow \infty$ .
- Egy  $H \subset \mathbb{R}$  halmaz *infimuma* (azaz  $\inf H$ ) a  $H$  halmaz alsó korlátjai közül a legnagyobb.  $H$  *supremuma* (azaz  $\sup H$ ) pedig  $H$  felső korlátjai közül a legkisebb.  $H$  *minimuma*  $l$ , ha  $l \in H$  és  $l = \inf H$ .  $H$  *maximuma*  $h$ , ha  $h \in H$  és  $h = \sup H$ .
- Egy sorozat infimuma, supremuma az elemei által alkotott halmaz infimuma, supremuma.

## 5. feladatsor: speciális sorozatok, limesz superior, limesz inferior

1. Számoljuk ki:

a)  $\lim \left(1 - \frac{3}{n^3}\right)^{n^3}$

b)  $\lim \left(\frac{n-1}{n+2}\right)^{n-3}$

c)  $\lim \left(\frac{n^2+2}{n^2+3}\right)^{n^2+7}$

d)  $\lim \left(\frac{3n+5}{3n-4}\right)^{3n}$

e)  $\lim \left(\frac{4n+1}{4n-3}\right)^{\frac{n}{2}+1}$

f)  $\lim \frac{\left(5 - \frac{1}{n}\right)^n}{\left(5 + \frac{1}{n}\right)^n}$

g)<sup>hf</sup>  $\lim \left(1 + \frac{1}{n^2+3}\right)^{4n^2}$

h)<sup>hf</sup>  $\lim \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$

i)<sup>hf</sup>  $\lim \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

2. Felhasználva hogy  $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$  és  $\sqrt[p]{p} \rightarrow 1$  ( $p > 0$ ), számoljuk ki az alábbi határértékeket:

a)  $\lim \sqrt[2n]{2n}$

b)  $\lim \sqrt[n]{2n}$

c)  $\lim \sqrt[2n]{n}$

d)  $\lim \sqrt[99n]{99n^{99}}$

e)  $\lim \sqrt[n]{n+5}$

f)  $\lim \sqrt[n]{2n^3+3}$

g)<sup>hf</sup>  $\lim \sqrt[n]{\frac{2n^2+3}{4n^2+n}}$

h)<sup>hf</sup>  $\lim \sqrt[n^2]{n}$

3.<sup>hf</sup> A plutónium-238 felezési ideje 87.7 év. Jelöljük  $a_n$ -el egy gyártáskor 50 kilogramm Pu-238-at tartalmazó atombombában  $n$  év eltelte után maradó Pu-238 tömegét. Írjuk fel az  $a_n$  sorozatot! Hányadik évben fog a Pu-238 tömege 0.1 kilogramm alá csökkenni?

4. Határozzuk meg a következő sorozatok limesz superiorját, limesz inferiorját, és ha létezik a limeszét!

a)<sup>hf</sup>  $a_n = \frac{4-n^2}{n+3}$

b)  $b_n = \left(\cos n\frac{\pi}{2}\right) \frac{2n^2-3}{n^2+n+8}$

c)  $c_n = \left(\cos n\frac{\pi}{2}\right) \frac{2n^2-3}{n^3+n+8}$

d)  $d_n = \frac{(-3)^n+8}{5+2^{2n+1}}$

e)  $e_n = \frac{(-4)^n+8}{5+2^{2n+1}}$

### Emlékeztető

- A *rendőrszabály* vagy *csendőrelv*: Ha  $a_n \leq b_n \leq c_n$ , és  $\lim a_n = \lim c_n = h$ , akkor  $b_n \rightarrow h$  is.
- Előadáson szerepelt, hogy az  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  sorozat konvergens, és a határértékére bevezettük az  $e$  jelölést. Ekkor  $\forall x \in \mathbb{R}$  esetén  $\lim \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ .
- $\limsup$  és  $\liminf$  mindig létezik (lehet  $\pm\infty$ ).
- $\lim$  pontosan akkor létezik, ha  $\limsup = \liminf$ , és ekkor  $\lim = \limsup = \liminf$ .

## 6. feladatsor: határértékszámolás, folytonosság

1. A definíció alapján határozzuk meg a határértékeket. Számoljuk ki, hogy  $x$ -nek mennyire kell közel lennie  $x_0$ -hoz ahhoz, hogy a függvényérték a határértéket legalább  $\varepsilon = 10^{-2}$  pontossággal megközelítse.

a)  $\lim_{x \rightarrow 4} 3x - 1$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sgn} x$

c)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2(x^2 - 1)}{x + 1}$

d)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - 2x}{x + 3}$

e)  $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8 - 2x^2}{x + 2}$

f)  $\lim_{x \rightarrow -3} \sqrt{1 - 5x}$

2. Definiáljuk a következő fogalmakat:

a)  $\lim_{x \rightarrow 7^+} f(x) = -\infty$

b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$

c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$

3. Számoljuk ki a határértékeket:

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^9 + 4x^6 + 1)$

b)  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x^2 - 1)^2}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{(x^2 - 1)^2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{[6 - x]}{2 + \{3x\}}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{[6 - x]}{2 + \{3x\}}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{\sqrt{3x^2 + 1} - 2x}$

g)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x (\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 3})$

h)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x)$

i)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x} + x}$

j)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9 + x} - 3}{\sqrt{4 + x} - 2}$

k)  $\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{2}{x^2 - 1} + \frac{3}{x^3 - 1} \right)$

l)  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^5 - 3x^2 + 1}{x^7 + 4x^3 + 5}$

4. Számoljuk ki a határértékeket:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$

b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 4x}{\sin 3x}$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 9x^2}{x^2}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x^2}{\operatorname{tg} 3x^2}$

e)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x - \sin 8x}{7x + \sin 2x}$

f)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x}$

5. Ábrázoljuk a függvényeket, majd határozzuk meg a határértékeket.

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin x$

b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

d)  $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$

6. Mutassunk példát olyan  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvényre, amely

a) minden pontban folytonos

b) semely pontban sem folytonos

c) pontosan egy pontban nem folytonos

d) pontosan egy pontban folytonos

### Emlékeztető

– Egy  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvénynek a *határértéke*  $x_0$ -ban  $a$ , (jelölésben  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ ), ha minden  $(x_n) \rightarrow x_0$ ,  $x_i \neq x_0$  sorozat esetén  $f(x_n) \rightarrow a$ . Ekvivalens definíció:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$ , ha  $\forall \varepsilon > 0$ -hoz  $\exists \delta$ , hogy  $|x - x_0| < \delta$ , és  $x \neq x_0$  esetén  $|f(x) - a| < \varepsilon$ .

–  $f$  *folytonos* az  $x_0$  pontban, ha  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .  $f$  *folytonos*, ha az értelmezési tartományának minden pontjában folytonos.

## 7. feladatsor: differenciálszámítás

1. Hol deriválhatóak a következő függvények? Adjuk meg a deriváltakat!

- |  |                                      |                             |   |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|
| a) $x^7$   | b) $ x $                             | c) $1/x^{111}$              | d) $x^{-7}\sqrt[5]{x}$                  |
| e) $\sin x^3$                                      | f) $\operatorname{ctg} x$            | g) $x \sin x$               | h) $7^x$                                |
| i) $\frac{x^2 + 2x - 1}{x^7 + 2x + 1}$             | j) $\frac{\sin x}{x^3} + e^x \cos x$ | k) $\sin^5(x^3)$            | l) <sup>hf</sup> $\operatorname{sgn} x$ |
| m) <sup>hf</sup> $x \sin x \cos x$                 | n) <sup>hf</sup> $\log_3 x$          | o) <sup>hf</sup> $\log_x x$ | p) <sup>hf</sup> $(x^3 - 3x + 8)^7$     |
| q) <sup>hf</sup> $\frac{x^2 + 1}{\sqrt{1 + 2x^2}}$ | r) <sup>hf</sup> $(\sin^3(x) + 2)^7$ | s) <sup>hf</sup> $x^x$      | t) <sup>hf</sup> $(\sin x)^{\cos x}$    |

2. a) Legyen  $f(x) = \sqrt[3]{x}$ . Mutassuk meg, hogy  $f'(0)$  nem létezik!

b) Legyen  $f(x) = \sqrt[3]{x} \cdot \sin \sqrt[3]{x}$ .  $f'(x) = ?$  ( $x = 0$ -ban használjuk a definíciót.)

c)<sup>hf</sup> Legyen  $f(x) = |x - 1| \cdot \sin(2x - 2)$ .  $f'(x) = ?$  ( $x = 1$ -ben használjuk a definíciót.)

3. Legyen  $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{1+x}{1-x}$ , ha  $x \neq 1$  és  $f(1) = \beta$ .

a) Megválasztható-e  $\beta$  értéke úgy, hogy az  $f$  függvény folytonos legyen  $x = 1$ -ben?

b)  $f'(x) = ?$ , ha  $x \neq 1$

c)  $\lim_{x \rightarrow 1} f'(x) = ?$  Létezik-e  $f'(1)$ ?

4. Írjuk fel az alábbi függvények grafikonjának  $x_0$  abszcisszájú pontjához húzott érintőegyenest egyenletét!

a)  $f(x) = x^3$ ,  $x_0 = 2$ ;

b)  $f(x) = \ln 3x$ ,  $x_0 = e^2/3$ ;

c)<sup>hf</sup>  $f(x) = \sin x$ ,  $x_0 = \pi$ ;

d)<sup>hf</sup>  $f(x) = 1 + \sin(xe^{2x+1})$ ,  $x_0 = 0$ .

5. Milyen  $\alpha$  és  $\beta$  mellett deriválható?

a)  $f(x) = \begin{cases} \alpha + \cos x & \text{ha } x > 0 \\ \beta x & \text{különben} \end{cases}$

b)<sup>hf</sup>  $g(x) = \begin{cases} \sin(\alpha x) & \text{ha } x > 0 \\ x + \beta & \text{különben} \end{cases}$

6. Pista ceruzájának a hegye a  $(4, 0)$  pontban van, és innen érintőegyenest szeretne húzni az  $f(x) = x^2/3$  függvényhez. Hány fokos szögben kell elindítania a ceruzáját?

7.<sup>hf</sup> Van-e az  $f(x) = x^2 - 1$  parabolának olyan érintője, amely átmegy a  $(2, 2)$  ponton? Ha igen, írjuk fel az érintő egyenletét!

8.<sup>hf</sup> Ha a holdon felfelé elhajítanánk egy követ 24m/s kezdősebességgel, akkor  $t$  másodperc múlva  $24t - 0.8t^2$  magasan lenne.

a) Írjuk fel a kő sebességét az idő függvényében.

b) Milyen magasra repül a kő?

c) Mekkora a holdon a gravitációs gyorsulás?

d) Mennyi idő alatt esik vissza?

### Emlékeztető

– Ha az  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  függvény értelmezve van  $x_0$  egy környezetében, akkor a  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$  számot (amennyiben létezik és véges)  $f$   $x_0$ -beli *deriváltjának* nevezzük, és  $f'(x_0)$ -val jelöljük.

– Az  $x \mapsto f'(x)$  függvényt  $f$  *derivált függvényének*, vagy röviden *deriváltjának* nevezzük, és  $f'$ -vel jelöljük.



## A deriválás alapszabályai

$$c' = 0$$

$$(cf)' = cf'$$

$$(f + g)' = f' + g'$$

$$(fg)' = f'g + g'f$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

$$(f \circ g)' = (f' \circ g)g'$$

$$(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$$

$$(cf(x))' = cf'(x)$$

$$(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x)$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}$$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x))g'(x)$$

$$(f^{-1}(y))' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

## Az alapfüggvények deriváltjai

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$(\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

$$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arcctg} x)' = \frac{-1}{1+x^2}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

$$(\operatorname{cth} x)' = \frac{-1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

$$\left( \operatorname{sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \operatorname{th} x = \frac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} x} \quad \operatorname{cth} x = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{sh} x} \right)$$

## Függvényvizsgálat

az  $[a, b]$  intervallumon  $f' \geq 0$   $\Rightarrow$   $f$  monoton növekszik  $[a, b]$ -n  
az  $[a, b]$  intervallumon  $f' \leq 0$   $\Rightarrow$   $f$  monoton csökken  $[a, b]$ -n  
 $f'(a) = 0$ , és  $f'$  előjelet vált  $a$ -nál  $\Rightarrow$   $f$ -nek lokális szélsőértéke van  $a$ -ban

az  $[a, b]$  intervallumon  $f'' \geq 0$   $\Rightarrow$   $f$  konvex  $[a, b]$ -n  
az  $[a, b]$  intervallumon  $f'' \leq 0$   $\Rightarrow$   $f$  konkáv  $[a, b]$ -n  
 $f''(a) = 0$ , és  $f''$  előjelet vált  $a$ -nál  $\Rightarrow$   $f$ -nek  $a$  inflexió pontja

## 8. feladatsor: L'Hospital-szabály, szélsőérték-keresés

1. Milyen  $\alpha, \beta$ -ra deriválhatóak a következő függvények?

$$\text{a) } \begin{cases} \alpha - \cos x & \text{ha } x > 0 \\ \beta x & \text{különben} \end{cases} \quad \text{b) }^{\text{hf}} \begin{cases} \sin x & \text{ha } x > 0 \\ \alpha x + \beta & \text{különben} \end{cases} \quad \text{c) }^{\text{hf}} \begin{cases} x^3 + \alpha & \text{ha } x > 1 \\ 2 - \beta x & \text{különben} \end{cases}$$

2. Kiszámolandó határértékek:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^3} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-5x} \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} (\ln x) \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} x & \text{e) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x + \sin x} & \text{f) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{x^3} \\ \text{g) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} & \text{h) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 2\pi} \frac{x \cos x}{(2\pi - x)^2} & \text{i) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \sin x} \right) \\ \text{j) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt{x} \ln x^7 & \text{k) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) & \text{l) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0+} x^{\operatorname{tg} x} \\ \text{m) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow \pi/4} (\operatorname{tg} x)^{\operatorname{tg} 2x} & \text{n) }^{\text{hf}} \lim_{x \rightarrow 0+} (\operatorname{ctg} x)^{\frac{1}{\ln x}} \end{array}$$

3. Keressük meg az alábbi függvények lokális szélsőértékeit:

$$\text{a) } f(x) = x^3 - 3x^2 - 18x + 5 \quad \text{b) }^{\text{hf}} f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x + 7$$

4. Zsiga pálinkafőzdeje hetente  $x$  hordó pálinkát  $x^3 - 6x^2 + 15x$  ezer forint költséggel képes előállítani, és  $y$  hordót  $9y$  ezer forintért tud eladni. Mennyit kell termelnie, hogy maximális legyen a profitja?

5. Keressük meg a függvények adott intervallumon vett szélsőértékeit.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x) = x^2 + 2x - 3, & I = [-3, 1] \quad \text{b) } f(x) = |x|, \quad I = (-1, 1) \\ \text{c) }^{\text{hf}} f(x) = \sin x, & I = [-1, 2] \quad \text{d) }^{\text{hf}} f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5, \quad I = [-1/2, 4) \end{array}$$

6.<sup>hf</sup> Ede akkora téglalap alakú folyóparti telket kap, amekkorát 1000 méternyi drótkerítéssel körül tud keríteni. (A folyópart egy egyenes, a teleknek erre kell illeszkednie. A telek folyóparti oldalára nem kell kerítés.) Milyen alakban kell felépítenie a kerítést, hogy a lehető legnagyobb területű legyen a telke?

7.<sup>hf</sup> Hogyan válasszunk két pozitív számot úgy, hogy az összegük 50 legyen, a szorzatuk pedig a lehető legnagyobb?

Hogyan válasszunk két pozitív számot, hogy a szorzatuk 50 legyen, az összegük pedig a lehető legnagyobb?

### Emlékeztető

– A *L'Hospital-szabály*: Legyenek az  $f$  és  $g$  függvények differenciálhatóak az  $x_0$  egy környezetében, és legyen itt  $g(x) \neq 0$  és  $g'(x) \neq 0$ . Legyen továbbá  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

$$\text{vagy } \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = +\infty. \text{ Ha } \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g'(x)} = A, \text{ akkor } \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = A, \text{ ahol } x_0 \text{ és } A$$

lehet valós szám vagy  $\pm\infty$ .

## Szöveges szélsőérték-feladatok

1. Egy téglalap alakú,  $1 \times 2$  méteres kartonpapírból felül nyitott, téglalap alakú dobozt hajtogatunk úgy, hogy a papír négy sarkából négy egybevágó négyzetet vágunk ki, majd felhajtjuk a doboz oldalait. Mekkora négyzeteket kell kivágnunk, hogy a doboz térfogata maximális legyen?
2. Egy épülő atlétikapályán két párhuzamos egyenes szakaszból és az őket összekötő félkörívekből áll a futópálya. Hogyan kell kialakítani a pálya alakját, hogy a futópálya hossza 400 méter legyen, és a lehető legnagyobb területű téglalap alakú focipálya férjen el a belsejében?
3. A Populista Párt vezetője tudja, hogy ha hatalomra kerülése esetére a bérek  $x$ -szeresére való növelését ígéri meg, akkor a szavazók  $30(x - 1)^2$  százaléka nem fog hinni neki, viszont a maradék szavazók  $50(x - 1)$  százaléka a pártra fog szavazni. Hányszoros bérnövekedést kell ígérnie, hogy a lehető legtöbb szavazatot kapja?
4. Egy derékszögű háromszög átfogója 10 cm. Maximum mennyi lehet a területe?
5. Egy egyenes körkúp alapkörének a sugara 2 méter, magassága 5 méter. Határozzuk meg a kúpba írható maximális térfogatú henger adatait!
- 6.<sup>hf</sup> Magyarországon a teljes lakosság 1 év alatt összesen  $10^{13}$  forintnyi jövedelmet kap. Tudjuk, hogy ha a keresetek  $(100y)\%$ -át kéne jövedelemadóként befizetni, akkor a lakosság a befizetendő adó  $(100y^3)\%$ -át elcsalná (nem fizetné be). Ilyen feltételek mellett mekkorára kéne az adókulcsot állítani, hogy a lehető legtöbb pénz folyjon be?
- 7.<sup>hf</sup> Egy egyenlő szárú trapéz két szára és az alapja 1 cm hosszú. Hogyan kell megválasztani a száraznak az alappal bezárt szögét, hogy a területe maximális legyen?
- 8.<sup>hf</sup> Lenke elhatározta, hogy feltölti a 10000 literes úszómedencéjét, melyhez a vizet a közeli kútról fogja vödörrel hordani. Tetszőlegesen nagy vödört választhat a munkához, de tudja, hogy ha egy fordulóval  $l$  liter vizet hoz, akkor a forduló  $64 + l^2$  másodpercig fog tartani. Hogyan válassza meg  $l$  értékét, hogy a lehető leggyorsabban végezzen?
- 9.<sup>hf</sup> Roland elhatározza, hogy kifesti a szobáját. Persze ehhez előbb a bútorokat többé-kevésbé össze kell tologatnia, hogy mindenütt hozzáférjen a falhoz. Roland tudja, hogy ha  $t$  órát fordít a bútorok összetologatására, akkor a festéssel  $10(1 + 1/t)$  óra alatt végez, viszont a festés után megint  $t$  órát vesz igénybe a bútorok eredeti helyzetbe való állítása. Hogyan kell  $t$  értékét megválasztania, hogy a lehető leghamarabb legyen kész?
- 10.<sup>hf</sup> Egy hajó üzemeltetési költségeit a fűtőanyag-fogyasztás és egyéb kiadások képezik. Az óránként felhasznált fűtőanyag  $A$  értéke függ a sebességtől; az összefüggést az  $A = 0,03 \cdot v^3$  képlet fejezi ki, ahol  $v$  (km/h) a sebesség; az egyéb kiadások  $B$  forintot tesznek ki. Határozzuk meg, milyen sebességgel haladjon a hajó, hogy a kilométerenkénti költség a lehető legkisebb legyen. (Vegyük  $B$ -t pl. 480 Ft-nak.)
- 11.<sup>hf</sup> Két egymást merőlegesen metsző folyosó szélessége 2,4 m, illetve 1,6 m. Mekkora az a leghosszabb létra, amelyet (vízszintes helyzetben) az egyik folyosóról a másikra át lehet vinni?
- 12.<sup>hf</sup> Egy házra olyan ablakokat terveznek, amelyeknek alsó része téglalap alakú, felső része pedig a téglalaphoz illő félkör. Egy-egy ablak adott kerülete  $K$ . Hogyan kell megválasztani az ablakok méreteit, hogy minél több fényt engedjenek át?

## 9. feladatsor: Taylor-polinom, függvényvizsgálat

- Számoljuk ki a következő Taylor-polinomokat, és írjuk fel a hozzájuk tartozó hibtagot!
  - $f(x) = (x - 2)^{-2}$ , középpont: 3,  $T_3(x) = ?$
  - $f(x) = \sin x$ , középpont:  $\pi$ ,  $T_n(x) = ?$
  - $f(x) = e^x$ , középpont: 0,  $T_5(x) = ?$
  - $f(x) = \ln \cos x$ , középpont: 0,  $T_6(x) = ?$
- $\ln(1.1)$ -et szeretnénk közelítőleg kiszámolni a  $\ln(1 + x)$  függvény 0 középpú Taylor-polinomja segítségével. Hányadik tagig kell elmennünk, hogy a közelítés hibája  $10^{-8}$  alá csökkenjen?
- Írjuk fel az  $f(x) = x^2 + 5x - 3 + \sin 2x$  függvény  $x_0 = 0$  középpontú harmadrendű Taylor-polinomját és a hozzá tartozó hibtagot! Legfeljebb mekkora hibát követünk el, ha  $f(0.1)$  értékét  $T_3(0.1)$  értékével közelítjük?
- Számoljuk ki közelítőleg a megadott számokat egy alkalmas függvény 2., 3., 4. rendű Taylor-polinomját használva eszközül. Becsüljük meg a közelítés hibáját!
  - $\sqrt{2}$
  - $\sin 33^\circ$
  - $e$
- Végezzük el a függvényvizsgálatot, rajzoljuk le a függvényt.
  - $2x^6 - 15x^5 + 20x^4$
  - $\frac{7}{x} - x$
  - $\frac{x}{x^2 - 1}$
  - $\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1}$
  - $\frac{x}{(1 + x)^2}$
  - $x^3 e^{-x}$
  - $e^{-x^2}$
  - $\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$
- Már láttuk, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ , sőt,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$ .
  - deriváljuk az  $\sqrt[x]{x}$  függvényt!
  - hol veszi fel az  $\sqrt[x]{x}$  függvény a maximumát?
  - ábrázoljuk a  $\sqrt[x]{x}$  függvényt!
  - $\max\{\sqrt[n]{n} \mid n \in \mathbb{N}\} = ?$
- Keressük meg az  $y^2 = x$  parabolának azt a pontját, amely a  $(6, 0)$  ponthoz a legközelebb van!

### Emlékeztető

– Egy  $n$ -szer deriválható függvény  $a$  körüli  $n$ . rendű Taylor-polinomja:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k. \text{ A közelítés hibtagja: } R_n(x, \xi) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - a)^{n+1}$$

*Taylor tétele:* Ha  $f^{(n)}$  differenciálható az  $[a, b]$  intervallumon, akkor létezik egy  $\xi \in [a, b]$ , hogy  $f(b) = T_n(b) + R_n(b, \xi)$ .

– *Függvényvizsgálat* alatt azt értjük, hogy a függvény első két deriváltjának az előjelét megvizsgálva megállapítjuk, hogy a függvény hol monoton, hol konvex, hol vannak lokális szélsőértékei, inflexiós pontjai, majd ezek ismeretében lerajzoljuk a függvény grafikonját.

## 10. feladatsor: primitívfüggvény-keresés

1. Keressük meg a primitív függvényeket.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int (3x^9 - 2x^2 + 1) dx & \text{b)} \int \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} dx & \text{c)} \int \frac{x^2 - 7x + 8}{x^2} dx \\ \text{d)}^{\text{hf}} \int \frac{x^2}{x^2 + 1} dx & \text{e)}^{\text{hf}} \int \operatorname{tg}^2 x dx & \text{f)}^{\text{hf}} \int \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x} dx \end{array}$$

2. Keressük meg a primitív függvényeket.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int (2x + 3)^5 dx & \text{b)} \int \frac{1}{(2x + 3)^5} dx & \text{c)} \int \frac{2}{9x + 1} dx \\ \text{d)} \int \frac{2}{(9x + 1)^2} dx & \text{e)} \int \frac{2}{9x^2 + 1} dx & \text{f)} \int \frac{2}{9x^2 + 3} dx \\ \text{g)} \int \frac{2x}{9x^2 + 3} dx & \text{h)} \int \sqrt{5x - 8} dx & \text{i)} \int \sqrt[3]{1 - 2x} dx \\ \text{j)} \int e^{11x} + \cos(11x) dx & \text{k)}^{\text{hf}} \int \frac{x^3}{x^4 + 5} dx & \text{l)}^{\text{hf}} \int \operatorname{tg} x dx \\ \text{m)}^{\text{hf}} \int \frac{e^{3x}}{e^{3x} + 5} dx & \text{n)}^{\text{hf}} \int \frac{1}{x \ln x} dx & \text{o)}^{\text{hf}} \int \frac{1}{\sqrt{1 - x^2} \cdot \arcsin x} dx \end{array}$$

3. Keressük meg a primitív függvényeket.

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int x^2(x^3 - 2)^5 dx & \text{b)} \int x \cdot \sqrt[3]{x^2 + 1} dx & \text{c)} \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \\ \text{d)} \int \frac{x}{\sqrt{(x^2 + 1)^3}} dx & \text{e)} \int e^{9x}(e^{9x} + 1)^9 dx & \text{f)} \int x e^{3x^2} dx \\ \text{g)} \int \frac{e^{\sqrt{t}} dt}{\sqrt{t}} & \text{h)} \int \sin^3 x \cos x dx & \text{i)} \int \frac{\ln x}{x} dx \\ \text{j)} \int \frac{\ln^3 x}{x} dx & \text{k)} \int \frac{1}{x \ln^3 x} dx & \text{l)} \int x \cos x dx \\ \text{m)} \int x e^{2x} dx & \text{n)} \int x^2 e^x dx & \text{o)}^{\text{hf}} \int \ln x dx \\ \text{p)}^{\text{hf}} \int \operatorname{arctg} x dx & \text{q)}^{\text{hf}} \int e^x \sin x dx & \text{r)}^{\text{hf}} \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx \end{array}$$

4.<sup>hf</sup> Hol a hiba?  $\ln|x| = \int \frac{1}{x} dx = \int \frac{100}{100x} dx = 100 \int \frac{1}{100x} dx = 100 \frac{\ln|100x|}{100} = \ln|100x|$

### Emlékeztető

– Legyen  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  tetszőleges függvény. Ha egy  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$  függvényre  $F' = f$ , akkor  $F$  az  $f$  *primitív függvénye*.  $f$  primitív függvényeinek halmazát  $\int f$  jelöli. Szokásos még az  $\int f(x) dx$  jelölés is, illetve a *határozatlan integrál* elnevezés.

$$\begin{array}{l} \int f(ax + b) dx = \frac{F(ax + b)}{a} \quad (\int f = F); \quad \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)|; \\ - \int f'(x) f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha + 1} \quad (\text{ha } \alpha \neq -1); \quad \int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) \quad (\int f = F); \\ \int f'(x)e^{f(x)} dx = e^{f(x)} \end{array}$$

– A *parciális integrálás*:  $\int f g' = f g - \int f' g$ .

## 11. feladatsor: helyettesítéses integrálás, törtfüggvény

1. Alkalmas helyettesítéssel számoljuk ki a következő integrálokat (dolgozatban a helyettesítést mindig megadjuk):

a)  $\int x^2 \sin(x^3) dx$

b)  $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

c)  $\int \sin x e^{\cos x} dx$

d)  $\int \sin^4 x \cos x dx$

e)<sup>hf</sup>  $\int \frac{2^{\ln x}}{x} dx$

f)<sup>hf</sup>  $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

g)<sup>hf</sup>  $\int \sqrt{4-x^2} dx$

h)<sup>hf</sup>  $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x}}$

i)<sup>hf</sup>  $\int \frac{4 dx}{1+(2x+1)^2}$

j)<sup>hf</sup>  $\int \frac{2x dx}{\sqrt{1-x^4}}$

k)<sup>hf</sup>  $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$

l)<sup>hf</sup>  $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$

2. Keressük meg a primitív függvényeket.

a)  $\int \frac{5x-3}{x^2-2x-3} dx$

b)  $\int \frac{2x^3-4x^2-x-3}{x^2-2x-3} dx$

c)  $\int \frac{x+5}{x^2+6x+9} dx$

d)  $\int \frac{2x+3}{4x^2-4x+10} dx$

e)<sup>hf</sup>  $\int \frac{1}{(x-1)^2(x^2+1)} dx$

f)<sup>hf</sup>  $\int \frac{x^4}{x^2+x-2} dx$

### Emlékeztető

– A *helyettesítéses integrálás*:  $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt|_{t=\varphi^{-1}(x)}$ , amennyiben  $\varphi'(t) < 0$  vagy  $\varphi'(t) > 0$  a kérdéses intervallumon.

(Nem korrekt, ám könnyen megjegyezhető erre így gondolni:  $\int f(x) dx = \int f(x) \left(\frac{dt}{dx}\right) dx = \int f(x) \frac{dx}{dt} dt = \int f(x(t))x'(t) dt$ . Ekkor valójában egy  $x = x(t)$  helyettesítést végzünk. A kapott eredmény  $t$  függvénye, azaz vissza kell helyettesíteni  $t$  helyébe az  $x(t)$  függvény inverzét.)

–  $\int \frac{\alpha x + \beta}{ax^2 + bx + c} dx$  kiszámolása: Legyen a nevező diszkriminánsa  $D$ .

Ha  $D = 0$ : A nevező teljes négyzet, így  $= \int \frac{A}{\left(x + \frac{b}{2a}\right)} + \frac{B}{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2} dx = A \ln \left|x + \frac{b}{2a}\right| - \frac{B}{x + \frac{b}{2a}}$ .

Ha  $D > 0$ : Parciális törtekre kell bontani:  $= \int \frac{A}{x+a} + \frac{B}{x+b} dx = A \ln|x+a| + B \ln|x+b|$ .

Ha  $D < 0$ :  $= A \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx + B \int \frac{1}{f(x)} dx = A \ln|f(x)| + B \operatorname{arctg}(\dots)$ .

## 12. feladatsor: Riemann-integrál

1. Egy 2 méter hosszú vályú keresztmetszetét az  $f(x) = 15x^2$ ,  $x \in [-0.1, 0.1]$  függvény írja le.
- Mennyi víz fér a vályúba?
  - Ha 10 liter vizet öntünk bele, milyen magas lesz a vízszint?

2. Mekkora az  $f$  és  $g$  függvények grafikonja által közrefogott síkidom területe, ha
- $f(x) = x + 2$  és  $g(x) = x^2$
  - <sup>hf</sup>  $f(x) = x^2$  és  $g(x) = x^3$
  - <sup>hf</sup>  $f(x) = x^2$  és  $g(x) = -x^2 + 2$

3. Számoljuk ki az integrálokat!

a)  $\int_0^2 |1 - x| dx$

b)  $\int_0^{5.5} [x] dx$

c)  $\int_{-1}^1 3x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$

d)  $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

e)  $\int_0^{\ln 2} x e^{-x} dx$

f) <sup>hf</sup>  $\int_{-3}^3 \{x\} dx$

g) <sup>hf</sup>  $\int_0^{10\pi} (1 - \cos 3x) \sin 3x dx$

h) <sup>hf</sup>  $\int_{1/e}^e |\ln x| dx$

i) <sup>hf</sup>  $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

4. <sup>hf</sup> Mekkora területet vág ki az  $x^2 + y^2 \leq 8$  körlapból az  $y^2 = 2x$  parabola?

### Emlékeztető

- A *Newton-Leibniz-szabály*: Ha  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  integrálható, és  $F$  egy primitív függvénye, akkor

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b := F(b) - F(a).$$

- Helyettesítés határozott integrálra: Ha  $g$  szigorúan monoton növekvő vagy csökkenő, akkor

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f(g(y))g'(y) dy. \quad (\text{Ha a képletben minden integrál létezik.})$$

### 13. feladatsor: improprius integrál, integrálfüggvény

1. Számoljuk ki a következő improprius integrálokat:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^3} dx & \text{b)} \int_{-\infty}^{\infty} x^3 dx & \text{c)} \int_0^{\infty} \sin x dx & \text{d)} \int_3^6 \frac{1}{\sqrt[3]{(x-5)^2}} dx \\ \text{e)} \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx & \text{f)} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx & \text{g)} \int_0^{1/e} \frac{1}{x \ln^2 x} dx & \text{h)} \int_0^1 \ln x dx \\ \text{i)} \int_0^3 \frac{1}{x-1} dx & \text{j)} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|} dx & \text{k)} \int_{-\infty}^2 \frac{2}{x^2+4} dx & \text{l)} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{(3x-2)^2} dx \end{array}$$

2. Határozzuk meg  $A(x)$ ,  $B(x)$ ,  $C(x)$ ,  $D(x)$  deriváltját.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} A(x) = \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt & \text{b)} B(x) = \int_0^{4x} \sqrt{1+t^8} dt \\ \text{c)} C(x) = \int_0^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt & \text{d)} D(x) = \int_x^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}} dt \end{array}$$

3. Számoljuk ki a következő határértékeket:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t) dt}{x^2} = ? & \text{b)} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{2x} \sqrt{1+t^4} dt}{x^3} = ? \end{array}$$

4. Mennyi a következő függvények  $x$  tengely körüli pörgetésével kapott testek felszíne, térfogata?

$$\begin{array}{ll} \text{a)} a(x) = x \quad (x \in [0, 6]) & \text{b)} b(x) = \sqrt{x} \quad (x \in [0, 9]) \\ \text{c)} c(x) = [x] \quad (x \in [0, 4]) & \text{d)} d(x) = \sqrt{r^2 - x^2} \quad (x \in [-r, r]) \end{array}$$

5. \* Tekintsük az  $f(x) = 1/x$ ,  $x \in [1, \infty)$  függvény  $x$  tengely körüli megpörgetésével keletkező végtelen „vázát”.

- Lássuk be, hogy a váza felszíne végtelen, a térfogata véges.
- Próbáljuk meg a vázát befesteni pirosra. Sikerülhet ez, ha a felszíne végtelen? És ha teletöltjük a vázát festékkel, majd kiöntjük? Akkor befestődik belülről! Hogyan lehet ez?

### Emlékeztető

– Az *improprius integrálnak* két alapesete van:

1) Ha az integrációs tartomány nem korlátos. Legyen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  integrálható függvény. Ekkor  $\int_a^\infty f(x) dx := \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_a^\omega f(x) dx$ , ha ez a határérték létezik. Hasonlóan definiálható  $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ .

$\int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^\infty f(x) dx$ , amennyiben az összeg létezik.

2) Ha a függvény nem korlátos. Legyen  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  nem korlátos, de korlátos és integrálható tetszőleges  $\varepsilon > 0$ -ra az  $[a + \varepsilon, b]$  intervallumon. Ekkor  $\int_a^b f(x) dx := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$ , ha ez a határérték létezik.

– Az  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$  függvény az  $f(x)$  *integrálfüggvénye*. Amennyiben  $f$  integrálható és létezik primitív függvénye, akkor  $F$  az  $f$  egy primitív függvénye lesz.

– Ha az  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  folytonosan diffható függvény grafikonját az  $x$  tengely körül megpörgetjük, akkor a kapott test felszíne:  $2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ , térfogata:  $\pi \int_a^b f(x)^2 dx$ .