



# **POLIÉDEREK ÁTHATÁSA**

**Háromoldalú gúla és  
háromoldalú vetítőhasáb  
áthatása**

Adott az  $ABCM$  szabályos háromoldalú gúla, amelynek  $ABC$  alaplapja I. fősíkra illeszkedik. Adott továbbá egy egyeneshasáb, amelynek oldalélei a  $p, q, r$  II. vetítőegyenesek. Szerkesszük meg a két síklapú test áthatását.






Keressük a két felület metszetét, az *áthatási poligont*. Először a poligon csúcsait szerkesztjük meg. Csúcsok ott keletkeznek, ahol az egyik test valamelyik éle metszi a másik test valamelyik lapját.

Meg kell tehát szerkeszteni egyrészt, hogy a gúla élei hol metszik a hasáb lapjait, másrészt pedig, hogy a hasáb élei hol metszik a gúla lapjait.


Mivel a hasáb élei II. vetítőegyeneseek, ezért az oldallapok II. vetítősíkok. Így közvetlenül leolvashatjuk, hogy ezeket hol metszik a gúla élei. Adódnak tehát az  $AM$  élen az 1, 2, a  $BM$  élen pedig a 3, 4 metszéspontok, amelyeknek I. képét rendezővel állítjuk elő. Láthatjuk, hogy a  $CM$  oldalél, valamint az alaplap élei nem metszik a hasáb felületét, *nem vesznek részt az áthatásban*.



A hasáb  $p$  és  $q$  oldaléleinek a gúla lapjaival alkotott metszéspontjait keressük. Láthatjuk, hogy az  $r$  oldalél, valamint a hasáb két véglapjának élei nem vesznek részt az áthatásban.

A metszéspontok meghatározásához a  $p$  és  $q$  éleken át felvesszük rendre az  $\alpha$  és  $\beta$  szeletelő síkokat, az  $ABC$  alaplap síkjával párhuzamosan. Ekkor a két sík által a gúlából kimetszett síkidomok az  $M$  centrumra nézve középpontosan hasonlóak az  $ABC$  alaplaphoz, vagyis a metszetek is szabályos háromszögek. Ráadásul, a centrális kapcsolat miatt, a metszetháromszögek élei párhuzamosak az alaplap megfelelő éleivel.

Így elég leolvasni például a szeletelő síkok  $CM$  oldalélen lévő metszéspontjait. Ezek I. képének megkeresése után az alapélekkel párhuzamosan rajzolva megkapjuk a (szaggatott vonalakkal jelölt) metszetháromszögeket, amelyek kijelölik a  $p$  és  $q$  éleknek a gúlapokkal közös pontjait, az 5, 6 és 7, 8 metszéspontokat.



A poligon éleinek meghatározása konvex lapokkal rendelkező (de nem feltétlenül konvex) poliéderek áthatása esetén az alábbi szabály szerint történhet.

*Két csúcspont csakis akkor köthető össze egy éllel, ha mindkét testnek van egy-egy olyan lapja, amely mindkét csúcst tartalmazza.*

Így például összeköthetők az 1 és 6 csúcsok, mivel mindketten illeszkednek a gúla  $CAM$  lapjára (lásd I. kép) és a hasáb  $pq$  lapjára (lásd II. kép). Hasonló módon összeköthetők a 3 és 7 csúcsok, mert mindketten rajta vannak a gúla  $BCM$  lapján és a hasáb  $qr$  lapján. Viszont nem köthetők össze például a 2 és 8 csúcsok, mert bár mindketten illeszkednek a gúla  $ABM$  lapjára (I. kép), de a hasábnak nincs olyan lapja, amely mindkettőt tartalmazná (ugyanis a II. képen látható, hogy az összekötő szakasz a hasáb belsejében halad).


Ezt az elvet követve kapjuk, hogy a csúcspontok egyetlen élláncot (ciklust) alkotva 1-6-2-4-5-7-3-8-1 sorrendben köthetők össze. Az így kapott térbeli nyolcszög a két test áthatási poligonja.

Bonyolultabb esetben az élek megkeresésének érdekében *illeszkedési táblázatot* is készíthetünk, amelyben minden csúcsról leírjuk, hogy az egyes testeknek melyik lapjára illeszkednek.


Például az 1 csúcs rajta van a gúla  $AM$  élén, és így illeszkedik az él mentén csatlakozó  $CAM$  és  $ABM$  lapokhoz (I. kép), másrészt rajta van a hasáb  $pq$  lapján (II. kép).

Hasonlóan, az 5 csúcs illeszkedik a gúla  $BCM$  lapjára (I. kép), illetve rajta van a hasáb  $p$  élén, és így illeszkedik az élben csatlakozó  $rp$  és  $pq$  lapokhoz (II. kép).

Ezeket az adatokat a többi csúcs esetén is meghatározzuk, és táblázatba rendezzük az alábbi módon:



	<b>ABCM</b>	<b>pqr</b>
<b>1</b>	CAM, ABM	pq
<b>2</b>	CAM, ABM	rp
<b>3</b>	ABM, BCM	qr
<b>4</b>	ABM, BCM	rp
<b>5</b>	BCM	rp, pq
<b>6</b>	CAM	rp, pq
<b>7</b>	BCM	pq, qr
<b>8</b>	ABM	pq, qr



Ha a táblázat helyesen elkészült, akkor annak alapján (az ábrától már függetlenül) az alábbi módon kapjuk a csúcsok összekötésének sorrendjét.


Induljunk ki például az 1 csúcsból. Az 1 csúcs illeszkedik például a gúla  $CAM$  lapjára és a hasáb  $pq$  lapjára. A két lap metszésvonalán haladva, keressük melyik csúcsba érkezhetünk. A táblázat szerint a 6 csúcs illeszkedik még ugyanehhez a lappárhoz.

A 6 csúcsban a  $CAM$ ,  $rp$  lappár metszésvonalára térhetünk át. A metszésvonal másik végpontja a 2 csúcs. Ide érve az  $ABM$ ,  $rp$  lappáron folytathatjuk, amelyek metszésvonalára 4-be vezet, és így tovább.

Végül a 3 csúcsból az  $ABM$ ,  $qr$  lappár metszésvonalán a 8 csúcsba jutunk, ahol az  $ABM$ ,  $pq$  lappár metszésvonalára áttérve visszaérünk az 1 csúcsba.

Így is eljuthatunk tehát az  $1-6-2-4-5-7-3-8-1$  élciklushoz.

	<b><math>ABCM</math></b>	<b><math>pqr</math></b>
<b>1</b>	$CAM, ABM$	$pq$
<b>2</b>	$CAM, ABM$	$rp$
<b>3</b>	$ABM, BCM$	$qr$
<b>4</b>	$ABM, BCM$	$rp$
<b>5</b>	$BCM$	$rp, pq$
<b>6</b>	$CAM$	$rp, pq$
<b>7</b>	$BCM$	$pq, qr$
<b>8</b>	$ABM$	$pq, qr$



A láthatóság feltüntetésekor az áthatási poligon látható éleit az alábbi szabály szerint kereshetjük meg.

*Az áthatási poligonnak egy éle pontosan akkor látható, ha mindkét testnek egy-egy látható lapjára illeszkedik.*

Esetünkben a felülnézeti képet kell vizsgálnunk. Felülnézetben a gúla oldallapjai láthatók, az  $ABC$  alaplappja pedig nem látható. A hasábnak pedig a  $pq$  és  $qr$  lapját lehet látni, míg az  $rp$  lap nem látható.

Mivel az áthatási poligon teljes egészében illeszkedik a gúla oldallapjaira, ezért azok az élek láthatók, amelyek a hasáb  $pq$  vagy  $qr$  lapján vannak. Ezek rendre az 57, 73, 38, 81, 16 élek.



A további láthatósági kérdéseket a szokásos módon dönthetjük el. Mindkét testet tömörnek tekintjük, így ha az egyik test valamely élének egy darabja a másik testen belülré esik (esetünkben az 12, 34, 56, 78 éldarabok), akkor ezeket nem létező élként nem húzzuk ki.

