

# 15. előadás

## Függvényvizsgálat I.

Horváth Márton

BME, Matematika Intézet,  
Algebra és Geometria Tanszék

2023. november 7.

# Függvényvizsgálat lépései

Adott egy  $f(x)$  függvény, megállapítjuk:

- ▶ értelmezési tartomány
- ▶ zérushely
- ▶ paritás
- ▶ periodicitás
- ▶ értelmezési tartomány szélein határértékek
  - ▶ aszimptoták
- ▶ első derivált
  - ▶ monotonitási tulajdonságok
  - ▶ lokális szélsőértékek
- ▶ második derivált
  - ▶ konvexitás
  - ▶ inflexiós pontok
- ▶ szemantik ábrázolás
- ▶ értékkészlet

## Az $e^{-x^2}$ függvény vizsgálata

Legyen  $f(x) = e^{-x^2}$  (Gauss- vagy haranggörbe).

# Az $e^{-x^2}$ függvény vizsgálata

Legyen  $f(x) = e^{-x^2}$  (Gauss- vagy haranggörbe).

- ▶ értelmezési tartomány:  $\mathbb{R}$
- ▶ zérushely: nincs, mindenütt pozitív
- ▶ paritás:

$$f(-x) = e^{-(-x)^2} = e^{-x^2} = f(x),$$

tehát páros

- ▶ periodicitás: nem periodikus (visszatérünk)
- ▶ értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2} = 0, \text{ mert } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x^2} = 0$$

Így vízszintes aszimptota van a  $\pm\infty$ -ben:  $y = 0$  egyenes.

# Az $e^{-x^2}$ függvény vizsgálata – folytatás

- ▶ első derivált:

$$f'(x) = e^{-x^2}(-2x),$$

melynek 0-ban van nullhelye

	$x < 0$	0	$0 < x$
$f'$	+	0	-
$f$	monoton nő	lok. max.	monoton csökken


Az  $x = 0$ -ban lokális maximum van, melynek értéke:  $f(0) = e^0 = 1$ .

- ▶ második derivált:

$$f''(x) = e^{-x^2}(-2x)(-2x) + e^{-x^2}(-2) = (4x^2 - 2)e^{-x^2},$$

melynek nullhelyei:  $\pm \frac{1}{\sqrt{2}}$

	$x < -\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} < x$
$f''$	+	0	-	0	+
$f$	konvex	inf. pont	konkáv	inf. pont	konvex



- ▶ értékészlet:  $(0, 1]$

$$f(x) = x^3 - 3x - 2$$

$$f(x) = x^3 - 3x - 2$$

- ▶ értelmezési tartomány:  $\mathbb{R}$
- ▶ zérushely: racionális gyökök csak a 2 osztói lehetnek:  $\pm 1, \pm 2$ , melyek közül 2 és a  $-1$  gyök, utóbbi kétszeres. Így a függvény szorzat alakja:

$$f(x) = x^3 - 3x - 2 = (x + 1)^2(x - 2)$$

- ▶ paritás:

$$f(-x) = (-x)^3 - 3(-x) - 2 = -x^3 + 3x - 2 = -f(x) - 4,$$

tehát (valószínűleg) nincs paritása, hivatkozhatunk a nullhelyekre is (nem szimmetrikusak az origóra), vagy  $f(1) = -4$  és  $f(-1) = 0$  se nem egyenlőek, se nem ellentettek.

- ▶ periodicitás: nem periodikus (véges sok nullhely)

$$f(x) = x^3 - 3x - 2$$

- értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 - 3x - 2 = \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left( 1 - \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 - 3x - 2 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left( 1 - \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) = -\infty$$

Ferde aszimptota van-e?

$$\begin{aligned} a &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - 3 - \frac{2}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left( 1 - \frac{3}{x^2} - \frac{2}{x^3} \right) = +\infty, \end{aligned}$$

így nincs ferde aszimptota a  $+\infty$ -ben.

Hasonló számolással kapjuk, hogy a  $-\infty$ -ben sincsen.



$$f(x) = x^3 - 3x - 2$$

- első derivált:  $f'(x) = 3x^2 - 3$ ,  
melynek  $x^2 = 1$  esetén, azaz  $\pm 1$ -ben van nullhelye

	$(-\infty, -1)$	$-1$	$(-1, 1)$	$1$	$(1, +\infty)$
$f'$	+	0	-	0	+
$f$	nő	max	csökken	min	nő

Tehát a  $-1$  lokális maximumhely, értéke:  $f(-1) = 0$ ,  
míg az  $1$  lokális minimumhely, értéke:  $f(1) = -4$ .

- második derivált:  $f''(x) = 3 \cdot 2x = 6x$ , melynek nullhelye a  $0$ .

	$(-\infty, 0)$	$0$	$(0, +\infty)$
$f''$	-	0	+
$f$	konkáv	inf. pont	konvex


Ugyanezek egyetlen táblázatban:

	$(-\infty, -1)$	$-1$	$(-1, 0)$	$0$	$(0, 1)$	$1$	$(1, +\infty)$
$f'$	+	0	-		0	+	
	nő	max	csökken		min	nő	
$f''$	-		0		+		
	konkáv		inf. pont		konvex		

$$f(x) = x^3 - 3x - 2$$

A táblázat:

	$(-\infty, -1)$	$-1$	$(-1, 0)$	$0$	$(0, 1)$	$1$	$(1, +\infty)$
$f'$	+	0		-		0	+
	nő	max		csökken		min	nő
$f''$		-		0		+	
		konkáv		inf. pont		konvex	



► értékészlet:  $\mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$$

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$$

- ▶ értelmezési tartomány:  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$
- ▶ zérushely:  $x^3 + 1 = 0$  esetén, azaz  $x = -1$ .
- ▶ paritás: nincsen, hiszen ha lenne, akkor 1 is nullhely lenne.
- ▶ periodicitás: nem periodikus (csak egy nullhely)
- ▶ értelmezési tartomány szélein határértékek:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + 1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^3 + 1}{x^2} = +\infty$$

Tehát az  $x = 0$ -ban függőleges aszimptota van.

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$$

- értelmezési tartomány szélein határértékek (folytatás):

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} x + \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3+1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \frac{1}{x^2} = -\infty$$

Ferde aszimptota van-e?

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^3+1}{x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x^3} = 1$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - ax) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^3+1}{x^2} - x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3+1-x^3}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0 \end{aligned}$$

így az  $y = x$  egyenletű egyenes a ferde aszimptota a  $+\infty$ -ben.

Hasonló számolással kapjuk, hogy a  $-\infty$ -ben is az  $y = x$  egyenletű egyenes a ferde aszimptota.

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$$

► első derivált:

$$f'(x) = \frac{3x^2 \cdot x^2 - (x^3 + 1) \cdot 2x}{(x^2)^2} = \frac{3x^4 - 2x^4 - 2x}{(x^2)^2} = \frac{x^4 - 2x}{x^4} = \frac{x^3 - 2}{x^3},$$

melynek  $\sqrt[3]{2}$ -ben van nullhelye.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \sqrt[3]{2})$	$\sqrt[3]{2}$	$(\sqrt[3]{2}, +\infty)$
$f'$	+	n. é.	-	0	+
$f$	$\nearrow$	n. é.	$\searrow$	min	$\nearrow$

Tehát a  $\sqrt[3]{2}$  lokális minimumhely, értéke:

$$f(\sqrt[3]{2}) = \frac{(\sqrt[3]{2})^3+1}{(\sqrt[3]{2})^2} = 3 \cdot 2^{-\frac{2}{3}} \approx 1,89.$$

► második derivált:

$$f''(x) = \frac{3x^2 \cdot x^3 - (x^3 - 2) \cdot 3x^2}{(x^3)^2} = \frac{3x^5 - (3x^5 - 6x^2)}{x^6} = \frac{6x^2}{x^6} = \frac{6}{x^4},$$


melynek nincs nullhelye.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, +\infty)$
$f''$	+	n. é.	+
$f$	$\cup$	n. é.	$\cup$

$$f(x) = \frac{x^3+1}{x^2}$$

► Az előzőek egyetlen táblázatban:

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \sqrt[3]{2})$	$\sqrt[3]{2}$	$(\sqrt[3]{2}, +\infty)$
$f'$	+	n. é.	-	0	+
$f$	↗	n. é.	↘	min	↗
$f''$	+	n. é.		+	
$f$	∪	n. é.		∪	



► értékészlet:  $\mathbb{R}$