

# Rácsfélcsoporthok az algebrában és a geometriában

VÁLASZTHATÓ TÁRGY ALKALMAZOTT MATEMATIKUS HALLGATÓKNAK, DE FIZIKUSOK  
HALLGATÓK SZÁMÁRA IS ÉRDEKES LEHET

2009/10 tanév II. félév  
Küronya Alex egyetemi docens (Algebra tanszék)

**Hely és időpont:** H 601, hétfő 10:15–12:00 (egyenlőre)

**Email:** kalex@math.bme.hu

**Tárgyleírás:** A tárgy a matematika két, nagyon régóta vizsgált területének, a konvex geometriának és az euklideszi tér egész koordinátájú pontjai vizsgálatának az ötvözete. Noha a felhasznált eszközök elemiek (az anyag követése várhatóan nem okoz gondot egy másodéves B.Sc. hallgatónak), ismertetésre kerülő formájában új, mindössze az elmúlt pár évben fogalmazódott meg.

Konvex politópok rácspontjai hagyományosan igen fontos szerepet játszottak például a számelméletben, kombinatorikában és reprezentációelméletben, újabban viszont a rácsfélcsoporthoz rendelt ún. Okounkov-testek révén a magasabb-dimenziós algebrai geometriában is határozott jelentőségre tettek szert.

A modern megfogalmazás úttörője a 2006-ban Fields-érmert kapott Andrei Okounkov volt, akinek az ötleteit továbbfejlesztve született meg a modern elmélet Kaveh–Khovanskii és Lazarsfeld–Mustață kezei között.

A félév első felében áttekintjük a konvex geometria és a konvex politópok elméletének alapjait, külön figyelmet szentelve a Minkowski-összeg és a vegyes térfogat fogalmainak. Megtárgyaljuk a Brunn–Minkowski és Alexandrov–Fenchel egyenlőtlenségeket, amelyeket részben be is bizonyítunk (ha minden jól megy, a félév végére nem csak részben). Ezután áttérünk konvex testek rácspontjainak vizsgálatára, a Kaveh–Khovanskii cikkekét követve. Egy tipikus állítás, amelyet be fogunk látni: legyen  $\Delta \subseteq \mathbb{R}^n$  egy konvex test,  $\#m\Delta$  a  $\Delta$   $m$ -szeresében lévő  $\mathbb{Z}^n$ -beli pontok száma. Ekkor

$$\lim_m \frac{\#m\Delta}{m^n} = \text{Vol}_n(\Delta),$$

azaz az  $m\Delta$ -beli rácspontok száma aszimptotikusan megegyezik  $\Delta$  térfogatával.

A félév utolsó részét annak szenteljük, hogy konvex geometriai eszközeinkkel leírjuk rácsfélcsoporthok elemszámának eloszlását, formulákat adjunk polinomoknak a félcsoporth elemein való összegzésére, esetleg (a hallgatóság háttérétől függően) algebrai geometriai alkalmazásokat is mutatva.

Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a téma egyszerre elemi (tehát egy másodéves matematikushallgató számára is követhető) és friss kutatási terület, s így alkalmas TDK vagy doktori dolgozat témájának.

**Előfeltételek:** Lineáris algebra és Algebra I. elvégzése, vagy azzal ekvivalens tudás.

**Házi feladatok és osztályozás:** Kétféleképpen lehet jegyet szerezni: vagy a félév közben hetente kiadott házi feladatok beadásával, vagy pedig a félév végén írásbeli vizsga során.

HA VALAKIT A TÁRGY ÉRDEKELNE, DE ÓRARENDI ÜTKÖZÉS VAGY EGYÉB ADMINISZTRATÍV AKADÁLY (ENGEDÉLY, STB.) MIATT NEM TUDJA FELVENNI, KÉREM, HOGY EMAILBEN VAGY SZEMÉLYESEN KERESSEN MEG.