

Matematika A4

I. gyakorlat

1. Kombinatorikus módszer

	ismétlés nélküli	ismétléses
permutáció	$n!$ n futó beérkezésének sorrendje	$\frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_r!}$ n golyót ennyiféleképpen állíthatunk sorba, ha k_1, k_2, \dots, k_r db külön-külön egyszínű
variáció	$\frac{n!}{(n-k)!}$ n futó beérkezésének sorrendje ha csak az első k helyet tekintjük	l^k l darab betűből készíthető k hosszú szavak száma
kombináció	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ n golyóból kiválasztunk k darabot és nem számít a kiválasztás sorrendje	$\binom{k+l-1}{l}$ k féle sütitől (sok van belőlük) hazaviszünk l -et, ennyiféleképpen tehetjük meg

1. A hét törpe minden este más sorrendben szeretne sorba állni, amikor Hófehérke a vacsorát osztja. Hányféleképpen tehetik ezt meg?
2. Hányféle sorrendben rakhatók ki a MATEMATIKA szó betűi?
3. Egy versenyen 5-en indulnak, az újságok az első három helyezett nevét közlik. Hányféle lehet ez a lista? (Közlik a helyezést is.)
4. Egy fagyizóban 5 féle fagyalt kapható: vanília, csoki, málna, pisztácia és citrom. Hányféleképpen vehetünk 2 gombócot, ha számít a gombócok sorrendje is, és lehet egyfajtaból többet is venni?
5. Van 6 lányismerősöm, és kettőt el akarok hívni moziba. Hányféleképpen tehetem ezt meg?
6. 3 új tanárt és egy titkárnőt akarnak felvenni egy iskolában. 6 tanár- és 3 titkárnő-jelölt van. Hányféleképpen kerülhetnek ki közülük az iskola új dolgozói?
7. Egy számkombinációs zárat 3 db különböző, 1 és 10 közötti szám begépelésével lehet kinyitni, de tudjuk, hogy a számok növekvő sorrendben vannak. Hány ilyen kombináció van?

2. Valószínűség

Elvégzünk egy kísérletet, például feldobunk egy kockát, amelynek lehetséges eredményeit **kimenetek**nek nevezük. A kimenetek összességét egy **eseménytérrel** (egy matematikai halmazzal) modellezzük. A kimeneteket mi választjuk meg. Megtehetjük azt is, hogy azt a két lehetőséget nézzük, hogy hatost dobunk-e, vagy sem. Ilyenkor két kimenetel van: hatos, vagy nem hatos, és az eseménytér egy kételemű halmaz. Egy másik lehetőség, hogy 6 kimenetelt különböztetünk meg, az eseménytér az $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. **Eseményeknek** nevezük az eseménytér részhalmazait.

A kimeneteket, vagy azok egy függvényét valószínűségi változónak nevezük, például $X =$ "kockadobásnál a fölül látható szám" egy *valószínűségi változó*. Ezekről később még sok szó lesz. Ha a dobott számok $Y = X^2$ négyzetét tekintjük, akkor az $1 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 9, 4 \rightarrow 16, 5 \rightarrow 25, 6 \rightarrow 36$ függvényre is gondolhatunk, amely

az $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ eseménytérén értelmezett. De tekinthetjük egyből az $\{1, 4, 9, 16, 25, 36\}$ eseményteret is, ezt mi dönthetjük el.

Egy kísérletsorozatban az egyes eseményekhez tartozó relatív gyakoriságok a kísérletek számának növelésével bizonyos értékek körül "ingadoznak" (a kísérletszám növelésével konvergálnak egy-egy elméleti értékhez), ezt az értéket nevezzük az adott esemény (tapasztalati) **valószínűségének**. A valószínűség pontos matematikai fogalmát a Kolmogorov-féle axiómák írják le.

A valószínűségszámítás legegyszerűbb modellje az, amikor *véges sok, egyformán valószínű kimenetel van*. Ekkor egy adott A esemény valószínűsége:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{kedvező kimenetek száma}}{\text{az összes kimenetek száma}}.$$

Ennél valamivel általánosabb az ún. *diszkrét eseménytér*, amikor véges sok, vagy megszámlálhatóan végtelen sok ω_k kimenetel van. Ekkor egy adott A esemény valószínűsége:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega_k \in A} \mathbb{P}(\{\omega_k\}) = \sum_{\omega_k \in A} p_k.$$

8. Feldobunk egy érmét kétszer egymásután. Mi a valószínűsége, hogy dobunk fejet? És hogy pontosan 1 db fejet dobunk?
9. Egy csomag magyar kártyából kivesszünk egy lapot, megnézzük a színét, majd visszatesszük. Megkeverjük a paklit, majd megint választunk egy lapot. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a két lap színe különböző?
10. Mi a valószínűsége annak, hogy két darab (szabályos) kocka feldobásakor legalább az egyik 6-os lesz? És annak a valószínűsége, hogy egyik sem lesz 6-os?
11. Mi a valószínűsége annak, hogy egy háromgyermekes családban a gyerekek mind egyneműek, ha a lányok és a fiúk születési valószínűsége egyaránt $\frac{1}{2}$?
12. Legalább hány szabályos pénzdarabot kell feldobni ahhoz, hogy 90%-nál nagyobb legyen az esély arra, hogy legyen köztük fej?
13. Mennyi a valószínűsége, hogy ha egy polcon 7 db könyvet véletlenszerűen sorba rakunk, akkor egy köztük lévő trilógia kötetei egymás mellé kerülnek?
14. Hatszor dobunk egy szabályos dobókockával. Mi a valószínűsége annak, hogy mind a hat szám előjön?
15. A brazil labdarúgó válogatott edzésének megkezdése előtt, az edzésen résztvevő 22 játékost két csoportba osztják. Mi annak a valószínűsége, ha találmra történik a szétosztás a két 11-es csoportba, hogy Ronaldo és Ronaldinho egymás ellen játszik?
16. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az ötös lottón (90-ből 5 számot húznak, sorrend nem számít) pontosan két találatunk lesz? És hogy legalább két találatunk lesz?
17. Egy dobozban 6 zöld és 4 sárga golyó van. Kihúzzunk (visszatevés nélkül) 4 golyót csukott szemmel, mennyi a valószínűsége, hogy pontosan két zöld golyót húztunk ki?
18. Mi a valószínűsége annak, hogy egy 23 fős társaságban van legalább két olyan ember, akiknek a születésnapja ugyanarra a napra esik (tegyük fel, hogy az emberek az év 365 napján egyforma eséllyel születnek)?
19. Mi a valószínűbb: 6 kockadobásból legalább egyszer hatost dobni, vagy 12 kockadobásból legalább 2-szer hatost dobni?
20. Három kockával dobva, mennyi a valószínűsége annak, hogy a dobott számok összege 10-nél nagyobb?

21. Valaki az angol abc 26 betűjéből (melyek között 5 magánhangzó és 21 mássalhangzó van) véletlenszerűen kiválaszt 4 betűt (minden választásnál mind a 26 betűnek ugyanakkora az esélye), és leírja őket egymás mellé. Mi a valószínűsége annak, hogy se magánhangzók, se mássalhangzók nem kerülnek egymás mellé?
22. Szórjunk el a sakk táblán egyenletes valószínűséggel 8 bástyát. Mennyi a valószínűsége, hogy egyik sem üti a másikat?

3. További feladatok

23. Addig dobálunk fel egy szabályos érmét, amíg az első fej kijön. Írja fel az eseményteret, amelyben a kimenetek a I (írás) és F (fej) betűk véges ill. végtelen sorozatai! Tegyük fel, hogy egy k betűből álló kimenetel valószínűsége $1/2^k$.
 - (a) Mutassa meg, hogy a véges hosszúságú sorozatok valószínűségei összesen egyet adnak, így a végtelen hosszú kimenetel (hogy mindig írást dobunk) valószínűsége zérus, bár ez a kimenetel is lehetséges!
 - (b) Mennyi a valószínűsége, hogy legfeljebb három dobás elegendő a fejhez?
 - (c) Mutassa meg, hogy $1/2^k$ a valószínűsége, hogy a dobás-sorozat nem ér véget a k -edik dobásig bezárólag, vagyis nem dobunk fejet az első k dobásban.
24. Három egyformán erős játékos: A, B és C játszik páros mérkőzéseket. Elsőként A és B játszik, majd a győztes játszik C-vel, és így tovább, mindaddig, amíg valaki kétszer egymás után nyer és így megnyeri az egész meccset. (A döntetlen lehetőségét kizárjuk.) Írja fel az eseményteret, amelyben a kimenetek a mérkőzések győzteseit megadó betűk véges ill. végtelen sorozatai! Tegyük fel, hogy bármely mérkőzést bármely játékos $1/2$ valószínűséggel nyer meg, és egy k betűből álló kimenetel valószínűsége $1/2^k$.
 - (a) Mutassa meg, hogy a véges hosszúságú sorozatok valószínűségei összesen egyet adnak, így a végtelen hosszú kimenetek valószínűsége zérus (bár ezek a kimenetek is lehetségesek)!
 - (b) Mutassa meg, hogy A, ill. B $5/14$ valószínűséggel nyeri meg a meccset, míg C győzelme $4/14$ valószínű!
 - (c) Mutassa meg, hogy $1/2^{k-1}$ a valószínűsége, hogy a meccs nem ér véget a k -edik mérkőzésig bezárólag.
25. Feldobunk két szabályos kockát. Legyen A az az esemény, hogy a dobott számok összege páratlan, B az az esemény, hogy legalább egy hatost dobunk. Írja fel az $A \cap B$, $A \cup B$, és $A \cap \bar{B}$ eseményeket mint kimenetek részalmazát! Számítsa ki a valószínűségüket!
26. Egyszerűsítse le az alábbi kifejezéseket: (a) $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$, (b) $(A \cup B) \cap (\bar{A} \cup B) \cap (A \cup \bar{B})$, (c) $(A \cup B) \cap (B \cup C)$.
27. Legyen A , B és C három tetszőleges esemény. Keressen olyan halmazalgebrai kifejezéseket, amelyek pontosan a következő eseményeket adják meg: (a) csak A következik be, (b) A és B bekövetkezik, de C nem (c) mindhárom esemény bekövetkezik, (d) legalább egyikük bekövetkezik, (e) legalább kettő bekövetkezik, (f) pontosan egyikük következik be, (g) pontosan kettő következik be, (h) egyik sem következik be, (i) legfeljebb kettő következik be.