

Kétváltozós függvények integrálása, 7. feladatsor

1. Elméleti összefoglaló

Kétváltozós függvények integrálszámítása

Az egyváltozós függvények Riemann-összege általánosítható kétváltozós esetre is. Ekkor egy az xy síkban fekvő T tartományt téglalapokra osztunk fel, és ezekhez tartozó "téglalatestekkel" közelítjük a T tartományt és a $z = f(x, y)$ függvény közé eső térfogatrészt. Be lehet látni, hogy akárcsak az egyváltozós esetben, ha az $f(x, y)$ függvény folytonos a korlátos és zárt T tartományon, akkor ott integrálható is. Tetszőleges tartományra igaz, hogy amennyiben létezik a kettős integrál a T tartományon, akkor az előjeles térfogatot jelent. Azaz amennyiben $f(x, y)$ grafikonja az xy -sík felett helyezkedik el, akkor a kettős integrál értéke nem más, mint azon T fölötti háromdimenziós testnek a térfogata, melyet alulról az xy -sík felülről pedig a $z = f(x, y)$ határol. Ha $f(x, y)$ grafikonja az xy -sík alatt helyezkedik el, akkor a $\int \int_T f(x, y) dA$ nem más, mint azon T alatti háromdimenziós testnek a térfogata, melyet felülről az xy -sík alulról pedig a $z = f(x, y)$ határol. Ha $\int \int_T f(x, y) dA = 0$, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanannyi térfogatrészünk van az xy -sík felett, mint alatta. Emellett természetesen a kettős integrálokra is általánosíthatóak az egyváltozós függvények Riemann-integráljánál tanult tulajdonságok.

Kettős integrál téglalap tartományon

Fubini tétel: Ha $f(x, y)$ folytonos a $T = [a, b] \times [c, d]$ zárt téglalap tartományon, akkor

$$\int \int_T f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

Kettős integrál normál tartományon

x-szerinti normál tartomány: A $T_x = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b \text{ és } c(x) \leq y \leq d(x)\}$, röviden az $a \leq x \leq b$ és $c(x) \leq y \leq d(x)$ tartományt *x-szerinti normál tartománynak* nevezzük.

y-szerinti normál tartomány: A $T_y = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d \text{ és } a(y) \leq x \leq b(y)\}$, röviden az $c \leq y \leq d$ és $a(y) \leq x \leq b(y)$ tartományt *y-szerinti normál tartománynak* nevezzük.

Fubini tétel, erősebb alak: Legyen $f(x, y)$ folytonos függvény a T tartományon

1. Ha $T = \{a \leq x \leq b \text{ és } c(x) \leq y \leq d(x)\}$ *x-szerinti normál tartomány*, ahol $c(x)$ és $d(x)$ folytonos függvények, akkor

$$\int \int_T f(x, y) dA = \int_a^b \left(\int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

2. Ha $T = \{c \leq y \leq d \text{ és } a(y) \leq x \leq b(y)\}$ *x-szerinti normál tartomány*, ahol $a(y)$ és $b(y)$ folytonos függvények, akkor

$$\int \int_T f(x, y) dA = \int_c^d \left(\int_{a(y)}^{b(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

3. Ha T mindkét tengelyre nézve normál tartomány, akkor a két integrál egyenlő.

Kettős integrál egyéb tartományon

Integráltranszformáció: Ha az xy -síkon minden (x, y) koordinátájú ponthoz hozzárendelünk egy $(x(u, v), (y(u, v))$ pontot az uv -síkból, azaz $f(x, y) = f(x(u, v), (y(u, v))$, és az xy -síkbeli T tartomány uv -síkbeli megfelelőjét G tartományként jelöljük, továbbá ha a $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$, $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$, $\frac{\partial y}{\partial u}$ és $\frac{\partial y}{\partial v}$ parciális deriváltak léteznek és folytonosak, valamint a

$$J(u, v) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

Jacobi determináns csak izolált pontokban vagy éppen sehol sem 0, akkor

$$\int \int_T f(x, y) dx dy = \int \int_G f(x(u, v), (y(u, v))) \cdot |J(u, v)| du dv.$$

Ennek alkalmazása a polárkoordinátás transzformáció, amit akkor érdemes használni, ha a tartományunk körlap, körcikk, körgyűrű, vagy ezek valamilyen részhalma. Itt az xy -síkról az $r\varphi$ -síkra történik a transzformáció, ahol r jelöli az (x, y) pont origótól vett távolságát, φ pedig a pont helyvektorának az x -tengely pozitív irányával bezárt szögét. Azaz

$$x(r, \varphi) = r \cos \varphi \quad \text{és} \quad y(r, \varphi) = r \sin \varphi$$

helyettesítést használva a Jacobi-determináns:

$$J(r, \varphi) = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{vmatrix} = r$$

azaz

$$dx dy = r dr d\varphi.$$

Kettős integrál alkalmazásai

Egy T korlátos zárt síktartomány *területe* (ha az integrál létezik és véges):

$$Ter = \int \int_T dA.$$

A T tartomány felett az $f(x, y)$ által meghatározott felület *felszíne* (ha az integrál létezik és véges):

$$A = \int \int_T \sqrt{1 + (f'_x(x, y))^2 + (f'_y(x, y))^2} dA.$$

Ha egy vékony, T tartományt borító fémlemez tömegeloszlásáról feltesszük, hogy folytonos, $\delta(x, y)$ -nal jelöljük a fémlemez anyagának sűrűségfüggvényét (az egységnyi területen lévő tömeget), akkor a fémlemez tömege, az x -, valamint y -tengelyre vonatkozó forgatónyomatékai és tömegközéppontjának koordinátái a következő képletekkel számolható ki (ha az integrálok léteznek és végesek):

tömeg:

$$M = \int \int_T \delta(x, y) dA;$$

forgatónyomatékok:

$$M_x = \int \int_T y \delta(x, y) dA;$$

$$M_y = \int \int_T x \delta(x, y) dA;$$

ezek segítségével a tömegközéppont koordinátái:

$$\bar{x} = \frac{M_y}{M} \quad \text{és} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M}.$$

2. Feladatok

1. Határozza meg a következő kettős integrálok értékét a megadott téglalap tartományokon!

- (a) $\int \int_T (12x - 6y - 5) dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq 2 \text{ és } -3 \leq y \leq 3\}$;
- (b) $\int \int_T \sin(x + y) dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \text{ és } 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$;
- (c) $\int \int_T (x^2 + 4y) dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq 1 \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$;
- (d) $\int \int_T e^{3x+4y} dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq \ln 2 \text{ és } 0 \leq y \leq \ln 3\}$;
- (e) $\int \int_T e^{-x-y} dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq a \text{ és } 0 \leq y \leq a\}$, ahol a pozitív egész paraméter;
- (f) $\int \int_T xy e^{x^2+y^2} dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq 1 \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$;
- (g) $\int \int_T \frac{x}{x^2 + y^2} dA =$, ahol $T = \{1 \leq x \leq \sqrt{3} \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$;
- (h) $\int \int_T \frac{2xy}{x^2 + y^2} dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq 1 \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$;
- (i) $\int \int_T xy \sin(x^2 + y^2) dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}} \text{ és } 0 \leq y \leq \sqrt{\frac{\pi}{2}}\}$;

2. Határozza meg a következő kettős integrálok értékét a megadott normál tartományokon!

- (a) $\int \int_T 2xy dA =$, ahol T az $y = x^2$ és $y = \sqrt{x}$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (b) $\int \int_T 2y dA =$, ahol T az $y = \tan x$, $x = \frac{\pi}{4}$ és $y = 1$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (c) $\int \int_T \frac{2y}{x+1} dA =$, ahol T az $y = 0$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 1$ és $x = 2$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (d) $\int \int_T y \sin x dA =$, ahol $T = \{0 \leq x \leq y \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$ háromszög;
- (e) $\int \int_T (x^2 + y) dA =$, ahol $T = \{y^2 \leq x \leq \sqrt{y} \text{ és } 0 \leq y \leq 1\}$
- (f) $\int \int_T \cos(x - y) dA =$, ahol T az $A(0, 0)$, $B(1, 1)$, $C(3, 1)$ és $D(4, 0)$ csúcspontú trapéz;
- (g) $\int \int_T (x^2 + 2y) dA =$, ahol T az $A(1, 1)$, $B(0, 3)$ és $C(3, 0)$ csúcspontú háromszög;
- (h) $\int \int_T x e^y dA =$, ahol T az $y = x^2$ és $y = x$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (i) $\int \int_T 1 + \frac{x}{2} - y dA =$, ahol T az $y = x^2 - 4$ és $y = 0$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (j) $\int \int_T 4 - y^2 dA =$, ahol T az $y = 2 - x^2$ és $y = x^2 - 2$ görbék által határolt zárt síkrész;
- (k) $\int \int_T (x^2 + y^2) dA =$, ahol T az $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ és $C(0, 2)$ csúcspontú háromszög;
- (l) $\int \int_T y dA =$, ahol T az $y = e^x$, $y = e^{-x}$ és $y = 2$ görbék által határolt zárt síkrész.

3. Határozza meg a következő kettős integrálok értékét a megadott egyéb tartományokon! (Segítség: Végezzen polárkoordinátás helyettesítést!)

(a) $\int \int_T 2x - 6y + 3dA =$, ahol T az origó középpontú 2 sugarú körlap;

(b) $\int \int_T \frac{2xy}{x^2 + y^2} dA =$, ahol $T = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$

(c) $\int \int_T \ln(x^2 + y^2) dA =$, ahol T az origó középpontú 1 és 4 sugarú körök által határolt körgyűrű;

(d) $\int \int_T \ln(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} dA =$, ahol T az origó középpontú 1 és 4 sugarú körök által határolt körgyűrű;

(e) $\int \int_T \frac{x+y}{x^2 + y^2} dA =$, ahol $T = \{1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \leq 0, 0 \leq y\}$

(f) $\int \int_T (x^2 - y^2) dA =$, ahol $T = \{0 \leq r \leq 1 \text{ és } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}\}$ körcikk;

(g) $\int \int_T \sqrt{100 - x^2 - y^2} dA =$, ahol T az origó középpontú 5 sugarú kör;

(h) $\int \int_T \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1}} dA =$, ahol T az origó középpontú, egységsugarú kör pozitív síknegyedbe eső része;

(i) $\int \int_T xy^2 dA =$, ahol T az origó középpontú, R sugarú kör első síknegyedbe eső része;

(j) $\int \int_T xy^2 dA =$, ahol T az origó középpontú R és $2R$ sugarú körök által határolt körgyűrű első síknegyedbe eső része.

4. Egy négyzet alaprajzú $(-a \leq x \leq a, -a \leq y \leq a)$ termet $z = \frac{xy}{a^2} + b$ egyenletű felülettel fedik le. Mennyi a terem térfogata?

5. Határozza meg a $z = 25 - x^2 - y^2$ egyenletű felület $z \geq 0$ félsíkba eső részének felszínét és az általa határolt korlátos térrész térfogatát!

6. Határozza meg a homogén lemezből kivágott R sugarú negyedkörlap tömegközéppontját!

7. Határozza meg az $f(x, y) = xy$ nyeregfelület $x^2 + y^2 \leq 1$ egyenletű hengerbe eső részének felszínét!

8. Határozza meg az $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$ paraboloid xy -sík feletti részének felszínét!

9. Határozza meg a $T = \{x^2 + y^2 \leq R^2, y \geq 0\}$ félkör alakú tartományt lefedő homogén síklemez tömegközéppontjának koordinátáit!