

Matematika ÉP2

Kétváltozós függvények deriválása, 5. feladatsor

2019/20. őszi félév

1. Elméleti összefoglaló

Iránymenti derivált

Az $f(x, y)$ függvény (x_0, y_0) pontbeli gradiens vektorának nevezzük az adott pontbeli parciális deriváltakból álló vektort:

$$\nabla f(x_0, y_0) = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

A parciális deriváltakhoz hasonlóan határértékkel definiálható a függvény (x_0, y_0) pontbeli tetszőleges \underline{v} irányú iránymenti deriváltja. Ez a \underline{v} irányú egységvektor és a gradiens vektor skalárszorzataként számolható:

$$f'_{\underline{v}}(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \frac{\underline{v}}{|\underline{v}|}$$

A képletről leolvasható, hogy az iránymenti derivált a gradiens irányában a legnagyobb és a gradienssel ellentétes irányban a legkisebb.

Lokális szélsőértékek

Legyen f függvény egy olyan tartományon definiálva, melynek (x_0, y_0) belső pontja. (x_0, y_0) lokális maximum/minimum hely, ha van olyan (x_0, y_0) középpontú nyílt körlap, melyben minden értelmezési tartomány belső pont függvényértéke kisebb vagy egyenlő/nagyobb vagy egyenlő $f(x_0, y_0)$ -nál. A továbbiakban feltételezzük, hogy f értelmezési tartománya egy nyílt T halmaz és f elsőrendű parciális deriváltjai léteznek és folytonosak a T nyílt halmazon, aminek eleme (x_0, y_0) .

*Kritikus pont*nak nevezzük a T értelmezési tartomány azon pontjait, melyekben mindkét elsőrendű parciális derivált nulla.

*Nyeregpont*nak nevezzük a T értelmezési tartomány azon (x_0, y_0) pontjait, melyekben mindkét elsőrendű parciális derivált nulla és minden (x_0, y_0) középpontú nyílt körlapon van olyan pontja az értelmezési tartománynak, melynek függvényértéke kisebb az $f(x_0, y_0)$ értéknél, és van olyan is, melynek nagyobb.

Lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele: Ha (x_0, y_0) -ban lokális szélsőértéke van f -nek, akkor itt $f'_x(x_0, y_0) = 0$ és $f'_y(x_0, y_0) = 0$.

Lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele: Ha $f'_x(x_0, y_0) = 0$ és $f'_y(x_0, y_0) = 0$ és f második parciális deriváltjai léteznek és folytonosak az (x_0, y_0) -t tartalmazó nyílt T halmazon, akkor

1. Ha $\det \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix} > 0$ és $f''_{xx}(x_0, y_0) > 0$, akkor f -nek (x_0, y_0) -ban lokális minimuma van és ez a minimum érték $f(x_0, y_0)$.

2. Ha $\det \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix} > 0$ és $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, akkor f -nek (x_0, y_0) -ban lokális maximuma van és ez a maximum érték $f(x_0, y_0)$.
3. Ha $\det \begin{bmatrix} f''_{xx}(x_0, y_0) & f''_{xy}(x_0, y_0) \\ f''_{xy}(x_0, y_0) & f''_{yy}(x_0, y_0) \end{bmatrix} < 0$, akkor f -nek (x_0, y_0) -ban nyeregpontja van.

2. Feladatok

1. Határozza meg a következő függvények adott irány szerinti iránymenti deriváltját a megadott pontban!

(a) $f(x, y) = \frac{x^2 \ln y}{x^2 + 3y^2}$, $\underline{v} = (-3, 4)$, $P_0(-1, 1)$

(b) $f(x, y) = \frac{xy(1+y)}{x^2 + y^2}$, $\underline{v} = (-4, 3)$, $P_0(3, 1)$

(c) $f(x, y) = x^4[2 - \ln(1 + y^2)]$, $\underline{v} = (1, 3)$, $P_0(1, 0)$

(d) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $\underline{v} = (1, 3)$, $P_0(-3, -4)$

2. Határozza meg mely irány esetén lesz nulla az $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy + e^y$ függvény $P_0(2, 0)$ pontbeli iránymenti deriváltja! És mely irány esetén lesz maximális az iránymenti derivált?

3. Milyen irányban lesz az $f(x, y) = y^3 e^{-2x-1}$ függvény $(\frac{1}{2}, 1)$ pontbeli iránymenti deriváltja maximális, illetve minimális?

4. Vizsgálja meg, hogy az alábbi függvényeknek hol lehet lokális szélsőértéke, van-e, s ha létezik, akkor minimum vagy maximum!

(a) $f(x, y) = x^2 + y^2$

(b) $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + 3x - y + 5$

(c) $f(x, y) = (x^2 - 6x)(y^2 - 4y)$

(d) $f(x, y) = x^2 - 3xy + y^2 - 1$

(e) $f(x, y) = x^2 y^3 (6 - x - y)$

(f) $f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$

(g) $f(x, y) = (x^2 + 2y^2)e^{-(x^2+y^2)}$

(h) $f(x, y) = (x - y + 1)^2 - (x^2 - 2)^2$

(i) $f(x, y) = xy(x + 8)(y - 6)$

(j) $f(x, y) = (x^3 - 9)(y^2 + 4y)$

(k) $f(x, y) = x^3 y^2 (4 - x - y)$

(l) $f(x, y) = \frac{x^2}{2} + 3xy + \frac{y^3}{3} + \frac{5y^2}{2} - 5x - 12y + 2$

(*m) $f(x, y) = \cos x \cos y \cos(x + y)$ (*n) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + \frac{8}{x} + \frac{8}{y}$

5. Ossa fel a 12-t három részre úgy, hogy a három szám szorzata maximális legyen!

6. Egy derékszögű hasáb egy csúcsába összefutó éleinek összege 45 cm . Hogyan kell az éleket megválasztani, hogy a hasáb térfogata maximális legyen?
7. Téglatest alakú, felül nyitott 4 m^3 térfogatú tartályt akarunk készíteni a lehető legkevesebb anyag felhasználásával. Mekkora legyenek a téglatest élei?
8. Ossa fel a 18-at három részre úgy, hogy az első rész négyzetének, a második rész köbének és a harmadik résznek a szorzata maximális legyen!
9. Mikor a legnagyobb a 400 méter kerületű szimmetrikus trapéz alakú telek területe? (Mekkora a szárjai és a hosszabbik alapon fekvő szögei?)