

1. Mutassuk meg, hogy az alábbiak vektorterek! Hány dimenziósak? Adjunk meg bennük bázist!
- $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$
  - $\mathbb{C}_{\mathbb{C}}$
  - Az  $n \times n$ -es valós nulla nyomú mátrixok  $\mathbb{R}$  fölött. (Egy mátrix nyoma a diagonális elemeinek az összege.)
  - Az  $n \times n$ -es komplex nulla nyomú mátrixok  $\mathbb{R}$  fölött.
  - Az  $\mathbb{R}[x, y]$   $\mathbb{R}$ -vektortérben a legfőbb 3-adjokú polinomok.
  - Az  $\mathbb{R}[x, y]$   $\mathbb{R}$ -vektortérben a legfőbb 3-adjokú szimmetrikus polinomok
  - Adott  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  mátrixsal felcserélhető  $2 \times 2$ -es valós mátrixok.

Megoldás: a)  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$  bázisa  $\{1, i\}$ , dimenziója 2.

b)  $\mathbb{C}_{\mathbb{C}}$  bázisa  $\{1\}$ , dimenziója 1.

c) Bázisa  $\{E_{jk} \mid j \neq k\} \cup \{E_{11} - E_{kk} \mid k > 1\}$ , dimenziója  $n^2 - 1$ .

d) Bázisa  $\{E_{jk}, iE_{jk} \mid j \neq k\} \cup \{E_{11} - E_{kk}, iE_{11} - iE_{kk} \mid k > 1\}$ , dimenziója  $2n^2 - 2$ .

e) Bázisa  $\{1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3\}$ , dimenziója 10.

f) Bázisa  $\{1, x + y, x^2 + y^2, xy, x^3 + y^3, x^2y + xy^2\}$ , dimenziója 6.

g)  $X = \begin{bmatrix} x & y \\ z & u \end{bmatrix}$ -re

$$AX = XA \Leftrightarrow \begin{bmatrix} z & u \\ x - z & y - u \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y & x - y \\ u & z - u \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{matrix} z = y \\ u = x - y \end{matrix} \Leftrightarrow X = \begin{bmatrix} x & y \\ y & x - y \end{bmatrix}$$

Tehát a vektortér  $\left\{ x \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \mid x, y \in \mathbb{R} \right\}$ . Ebből látható, hogy  $\{I, A\}$  generátorrendszere ennek a vektortérnek, s mivel ezek nyilvánvalóan függetlenek, bázisa is. Következésképpen a vektortér dimenziója 2.

2. Bizonyítsuk be az axiómákból, hogy egy vektortérben  $\lambda \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda = 0$  vagy  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ .

Megoldás: Emlékeztetőlül a vektortér-axiómák:

$$(A1) \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \quad (S1) \lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v} \quad \forall \lambda \in K, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$$

$$(A2) (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V \quad (S2) (\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v} \quad \forall \lambda, \mu \in K, \mathbf{v} \in V$$

$$(A3) \exists \mathbf{0} : \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V \quad (S3) (\lambda\mu)\mathbf{v} = \lambda(\mu\mathbf{v}) \quad \forall \lambda, \mu \in K, \mathbf{v} \in V$$

$$(A4) \forall \mathbf{v} \in V \exists (-\mathbf{v}) : \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0} \quad (S4) 1\mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V$$

$\Leftarrow$ : Az előadáson bizonyítottuk, hogy (\*)  $0\mathbf{v} = \mathbf{0}$  minden  $\mathbf{v} \in V$ -re. Hasonlóan látható, hogy (\*\*)  $\lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$  minden  $\lambda \in K$ -ra, ugyanis

$$\mathbf{0} \stackrel{A4}{=} \lambda\mathbf{0} + (-\lambda\mathbf{0}) \stackrel{A3}{=} \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) + (-\lambda\mathbf{0}) \stackrel{S1}{=} (\lambda\mathbf{0} + \lambda\mathbf{0}) + (-\lambda\mathbf{0}) \stackrel{A2}{=} \lambda\mathbf{0} + (\lambda\mathbf{0} + (-\lambda\mathbf{0})) \stackrel{A4}{=} \lambda\mathbf{0} + \mathbf{0} \stackrel{A3}{=} \lambda\mathbf{0}.$$

$\Rightarrow$ : Tegyük fel, hogy  $\lambda \neq 0$ . Mivel  $K$  test,  $\exists \lambda^{-1}$ , és ezzel

$$\mathbf{0} \stackrel{**}{=} \lambda^{-1}\mathbf{0} = \lambda^{-1}(\lambda\mathbf{v}) \stackrel{S3}{=} (\lambda^{-1}\lambda)\mathbf{v} \stackrel{T}{=} 1\mathbf{v} \stackrel{S4}{=} \mathbf{v},$$

ahol  $T$  testtulajdonságot jelöl.

3. Tekintsük az  $X$  halmaz  $\mathcal{P}(X)$  hatványhalmazán értelmezett  $K = \mathbb{Z}_2$  fölötti  $V$  vektorteret, ahol az összeadás az  $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  szimmetrikus differencia.

a) Bizonyítsuk be, hogy  $V$  valóban vektortér!

b) Adjunk meg  $V$ -ben egy bázist, ha  $X$  véges halmaz!

c) Bizonyítsuk be, hogy (végtelen  $X$  halmaz esetén is) van olyan  $f : V_K \rightarrow K_K$  lineáris leképezés, amely  $X$  páros elemszámú véges részhalmazait 0-ba, a páratlanokat 1-be viszi!

*Megoldás:* a) A1 nyilvánvaló a definícióból. Az üreshalmaz megfelel  $\mathbf{0}$ -nak:  $A \triangle \emptyset = A$  minden  $A$ -ra, és minden elem önmaga additív inverze:  $A \triangle A = \emptyset$ . Tehát A3 és A4 is igaz.  $(A \triangle B) \triangle C$  elemei azok az  $x \in X$  elemek, amelyek vagy  $A$  és  $B$  egyikében vannak, és nincsenek  $C$ -ben, vagy  $A$  és  $B$  közül páros sokban vannak benne, és  $C$ -ben is benne vannak. Azaz azok az  $x$ -ek, amelyek  $A, B, C$  közül páratlan sokban vannak benne. Ez viszont  $A \triangle (B \triangle C) = (B \triangle C) \triangle A$ -ra is igaz, így A2 is teljesül.

Mivel a skalárok csak 0 és 1, a skalárral való szorzást a  $0 \cdot A = \emptyset$  és  $1 \cdot A = A$  képletekkel definiálhatjuk. Ezekre nyilván teljesül az S1, S2, S3, ha a szereplő skalárok egyike 0, és  $\lambda = \mu = 1$ -re az S1, S3, S4 nyilvánvaló, S2 pedig következik abból, hogy  $A \triangle A = \emptyset$ .

*Megj.:* Az, hogy  $V$  vektortér, abból is belátható, hogy  $V$ -ből  $\mathbb{Z}_2^X$ -be művelettartó bijekciót ad az, ha minden  $A$  halmaznak azt a függvényt feleltetjük meg  $X$ -ből  $\mathbb{Z}_2$ -be, amely az  $A$  elemein 1-et, a többin 0-t vesz föl.

b) Az egyelemű részhalmazok bázist alkotnak, ugyanis két diszjunkt halmaz szimmetrikus differenciája az uniójuk, így az egyelemű részhalmazok generátorrendszert alkotnak véges  $X$  esetén, és függetlenek is, mivel a nemtriviális lineáris kombináció itt néhány (legalább egy) különböző egyelemű halmaz unióját jelenti, és ez nem lehet az üreshalmaz.

c) Az egyelemű részhalmazok itt is függetlenek ugyanúgy, mint véges  $X$  esetén. Ezt a független rendszert az órán tanult tétel szerint kibővíthetjük  $V$  bázisává. Az előírhatósági tétel szerint van olyan lineáris leképezés  $V$ -ből  $K_K$ -ba, amely az egyelemű halmazokat 1-be, a többi báziselemet 0-ba viszi, és ez nyilvánvalóan kielégíti a feladat feltételét.

4. Adjuk meg az  $f : (x, y, z) \rightarrow (x + y - 2z, x + z, 2x + y - z, -x - z)$  lineáris leképezés mátrixát standard bázisban. Mennyi a rangja? Hány dimenziós  $f$  magtere és képtere? Adjuk meg a magtérnek és a képtérnek egy-egy bázisát!

*Megoldás:* A rangot, képteret és magteret is a mátrix (redukált) lépcsős alakjának a segítségével tudjuk meghatározni.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A rangja 2, mert a lépcsős alaknak két nemnulla sora van. Ebből következik, hogy a képtér 2-dimenziós, a magtér dimenziója pedig  $3 - 2 = 1$ . A képtér bázisa az  $A$  első két oszlopa,  $\{(1, 1, 2, -1), (1, 0, 1, 0)\}$ , mert a lépcsős alakban az első két oszlopban van vezérelem. A magtér bázisának meghatározásához az  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  homogén egyenletrendszer megoldását kell felírni:  $\mathbf{x} = (-t, 3t, t) = t(-1, 3, 1)$  ( $t \in \mathbb{R}$ ), tehát a magtér bázisa  $\{(-1, 3, 1)\}$ .

5. Legyen  $f : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$  az a leképezés, amelyre  $f : p(x) \mapsto (x - 1)p'(x^2 + 1)$ . Bizonyítsuk be, hogy  $f$  lineáris leképezés, és határozzuk meg a magját és a rangját! Írjuk fel a mátrixát a standard  $\{1, x, x^2, \dots\}$  bázisokból álló bázispárban, illetve keressünk egy olyan bázispárt, amelyben a mátrixa  $\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  alakú blokkmátrix!

*Megoldás:* Ha  $\deg p(x) \leq 2$ , akkor  $\deg p'(x) \leq 1 \Rightarrow \deg p'(x^2 + 1) \leq 2 \Rightarrow \deg (x - 1)p'(x^2 + 1) \leq 3$ , így  $f$  valóban  $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$ -ből  $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ -ba képez. Lineáris, mert  $p, q$  polinomokra  $(x - 1)(p + q)'(x^2 + 1) = (x - 1)(p' + q')(x^2 + 1) = (x - 1)(p'(x^2 + 1) + q'(x^2 + 1)) = (x - 1)p'(x^2 + 1) + (x - 1)q'(x^2 + 1)$  és  $c \in \mathbb{R}$ -re  $(x - 1)((cp)'(x^2 + 1)) = (x - 1)cp'(x^2 + 1) = c(x - 1)p'(x^2 + 1)$ .

A magja:  $f(p(x)) = 0 \Leftrightarrow (x-1)p'(x^2+1) = 0$  mint polinom  $\Leftrightarrow p'$  a 0 polinom  $\Leftrightarrow p(x)$  konstans. Tehát a mag a konstans polinomokból álló egydimenziós altér,  $\text{span}(1)$ , a rang pedig a dimenziótétel szerint  $3 - 1 = 2$ . A standard bázis elemeinek képe  $f(1) = 0$ ,  $f(x) = x - 1$  és  $f(x^2) = (x-1)2(x^2+1) = 2x^3 - 2x^2 + 2x - 2$ , ezért a leképezés standard mátrixa

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Az előírt alakú mátrixot úgy kapjuk meg, ha  $\text{Ker } f$  bázisát,  $\{1\}$ -et kiegészítjük  $\mathbb{R}[x]_{\leq 2}$  bázisává, és  $\mathcal{B}$ -ben a kiegészítő elemek kerülnek előre:  $\mathcal{B} = \{x, x^2, 1\}$ ,  $\mathcal{C}$  pedig a kiegészítő elemek képeivel kezdődik, és azt egészítjük ki  $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$  bázisává,

például  $\mathcal{C} = \{x-1, 2x^3 - 2x^2 + 2x - 2, 1, x^2\}$ . Ezzel a választással

$$[f]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

6. Adjuk meg a következő lineáris transzformációk és leképezések mátrixát a megadott bázisban (vagy bázispárban)!

Adjuk meg a képtér és a magtér egy-egy bázisát!

a)  $f(x, y, z) = (x + 2y - z, x - y + z)$  standard bázisban, illetve a  $(\mathcal{B}', \mathcal{C}')$  bázispárban, ahol  $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$  és  $\mathcal{C}' = \{(1, 1), (2, 3)\}$ .

b) az  $x = t, y = 2t, z = -t$  tengely körüli  $90^\circ$ -os forgatás a standard bázisban!

c) a  $3 \times 3$ -as valós mátrixokon az  $A \mapsto A + A^T$  leképezés a standard bázisban!

d) A  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$  vektortéren egy  $z = a + bi$  komplex számmal való szorzás mátrixát a  $\mathcal{B} = \{1, i\}$  és a  $\mathcal{B}' = \{1 + i, 1 - i\}$  bázisban.

Megoldás: a)  $A = [f]_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $P = [\text{id}]_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}'}$   $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,

$$Q = [\text{id}]_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{C}'} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\text{id}]_{\mathcal{C}' \leftarrow \mathcal{E}} = Q^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad [f]_{\mathcal{C}' \leftarrow \mathcal{B}'} = Q^{-1}AP =$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 3 & -4 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

A leképezés képtere és magtere az  $A$  mátrix oszloptere és nulltere, és ezek bázisa  $\{(1, 1), (2, -1)\}$  (vagy akár  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ , mivel a leképezés szürjektív), illetve  $\{(-1, 2, 3)\}$ .

b) Először egy kényelmes bázisban írjuk föl a mátrixot, aztán áttérünk a standard bázisra.

Álljon a  $\mathcal{B}$  bázis a tengely irányvektorából,  $\mathbf{b}_1 = (1, 2, -1)$ -ből, és két erre és egymásra merőleges vektorból: mondjuk, a  $\mathbf{b}_2 = (1, 0, 1)$  és a  $\mathbf{b}_1 \times \mathbf{b}_2$ -vel egyirányú  $\mathbf{b}_3 = (1, -1, -1)$ . Ekkor  $\mathbf{b}_1 \mapsto \mathbf{b}_1$ ,  $\mathbf{b}_2 \mapsto \sqrt{\frac{2}{3}}\mathbf{b}_3$  és  $\mathbf{b}_3 \mapsto -\sqrt{\frac{3}{2}}\mathbf{b}_2$ , így

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{\frac{3}{2}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

. Az áttérés  $P = T_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}$  mátrixa, és annak inverze:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix}.$$

Ebből a standard mátrix  $T_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}}[f]_{\mathcal{B}} T_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{E}} = P[f]_{\mathcal{B}} P^{-1} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 3 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} =$$

$$\frac{1}{6\sqrt{6}} \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 2\sqrt{6} + 6 & -\sqrt{6} + 12 \\ 2\sqrt{6} - 6 & 4\sqrt{6} & -2\sqrt{6} - 6 \\ -\sqrt{6} - 12 & -2\sqrt{6} + 6 & \sqrt{6} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 + \sqrt{6} & -1 + 2\sqrt{6} \\ 2 - \sqrt{6} & 4 & -2 - \sqrt{6} \\ -1 - 2\sqrt{6} & -2 + \sqrt{6} & 1 \end{bmatrix}.$$

A forgatás izomorfizmus, ezért a képtere az egész  $\mathbb{R}^3$ , amelynek bázisa  $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ , a magtere pedig  $\{\mathbf{0}\}$ , így annak a bázisa az üres halmaz,  $\emptyset$ .

c)

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_4 & x_5 & x_6 \\ x_7 & x_8 & x_9 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2x_1 & x_2 + x_4 & x_3 + x_7 \\ x_2 + x_4 & 2x_5 & x_6 + x_8 \\ x_3 + x_7 & x_6 + x_8 & 2x_9 \end{bmatrix}$$

Ebből leolvasható, a standard  $\{E_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq 3\}$  bázisban a koordinátavektorokon való hatás, és abból a transzformáció  $M$  mátrixa:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \\ x_9 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} 2x_1 \\ x_2 + x_4 \\ x_3 + x_7 \\ x_2 + x_4 \\ 2x_5 \\ x_6 + x_8 \\ x_3 + x_7 \\ x_6 + x_8 \\ 2x_9 \end{bmatrix} \Rightarrow M = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

A magtér azon mátrixokból áll, amelyekre  $A^T = -A$  (ferdén szimmetrikus mátrixok), azaz

$$\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$$

alakúak, és ennek bázisa  $\{E_{12} - E_{21}, E_{13} - E_{31}, E_{23} - E_{32}\}$ , a képtere pedig a szimmetrikus mátrixok ( $A^T = A$  tulajdonságúak) altère, ugyanis  $(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T$  miatt minden képvektor szimmetrikus mátrix, és minden szimmetrikus  $A$  mátrix előáll az  $\frac{1}{2}A$  képként. Tehát a képtér elemei a

$$\begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix}$$

alakú mátrixok, és így a képtér bázisa

$$\{E_{11}, E_{22}, E_{33}, E_{12} + E_{21}, E_{13} + E_{31}, E_{23} + E_{32}\}.$$

d)  $(x + yi)(a + bi) = (ax - by) + (bx + ay)i$ , tehát a standard mátrix az az  $A$  mátrix, amelyre  $A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax - by \\ bx + ay \end{bmatrix}$ , így  $A = [f]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$ . A  $P = T_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  áttérési mátrixot használva, a transzformáció mátrixa a  $\mathcal{B}'$  bázis szerint

$$P^{-1}AP = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$$

Ha  $a + bi \neq 0$ , akkor a transzformáció izomorfizmus (a mátrixból is látható, hogy invertálható, mert a determinánusa  $a^2 + b^2 \neq 0$ ), így a magtere 0, a képtere az egész  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ , vagyis a magtér bázisa  $\emptyset$ , a képtéré  $\{1, i\}$ . Ha  $a + bi = 0$ , akkor a magtér  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$  és a képtér 0.

7. Legyen  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  az a lineáris transzformáció, melyre  $f(1, 1, 0) = (1, 0, 1)$ ,  $f(1, 0, 1) = (0, 1, 1)$  és  $f(0, 1, 1) = (1, 1, 0)$ . Adjuk meg  $f$  mátrixát a  $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$  bázisban és a standard bázisban is! Milyen vektorokat hagy helyben ez a leképezés? Mi az  $f$  mint geometriai transzformáció?

Megoldás: Vegyük észre, hogy  $f$  hatása a  $\mathcal{B}$  bázison  $\mathbf{b}_1 \mapsto \mathbf{b}_2 \mapsto \mathbf{b}_3 \mapsto \mathbf{b}_1$ , így a  $\mathcal{B}$ -ben felírt  $B$  mátrixa, és abból a  $P$  áttérési mátrixszal kiszámított standard  $A = PBP^{-1}$  mátrixa:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ez a leképezés az  $(1, 1, 1)$  irányvektorú, origón átmenő tengely körüli  $120^\circ$ -os, az irányvektor csúcsa felől nézve negatív irányú, forgatás (a  $[0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$  egységkocka origóval szomszédos három csúcsát permutálja ciklikusan, tehát az origóból induló testátló körüli forgatás). Csak a forgatás tengelyébe eső vektorokat, azaz az  $(1, 1, 1)$  skalárszorosait hagyja helyben.