

1. Adjuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix Schur-felbontását!

Megoldás: Az A karakterisztikus polinomja $(x-1)(x^2-4x+4) = (x-1)(x-2)^2$. A $\lambda = 1$ sajátértékhez sajátvektor az \mathbf{e}_3 , és ezt könnyen kiegészíthetjük ortonormált bázissá: $\{\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1\}$, tehát először a $Q_1 = [\mathbf{e}_3 \ \mathbf{e}_2 \ \mathbf{e}_1]$ mátrixot használjuk:

$$Q_1^{-1}AQ_1 = Q_1^T AQ_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ -4 & 7 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -4 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A jobb alsó sarokban levő 2×2 -es mátrixnak sajátértéke a 2, amelyhez tartozó sajátvektor $(1, 1)$, így ennek a háromszög alakra hozásához az $\{\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)\}$ bázist használjuk, miközben az első koordinátán triviálisan hatunk.

$$Q_2^T Q_1^T A Q_1 Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 7 & -4 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3/\sqrt{2} & 11/\sqrt{2} \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

2. Az $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ mátrix önadjungált és unitér (így persze normális is). Keressünk egy olyan B mátrixot, amely hasonló A -hoz, és még csak nem is normális!

Megoldás: Bármely olyan nem normális 2×2 -es mátrix megfelel B -nek, amelynek a sajátértékei 1 és -1 , mert az diagonalizálható, és A a diagonális alakja. Legkönnyebb egy ilyen mátrixot a háromszögmátrixok között keresni, akkor csak az kell, hogy 1 és -1 legyenek az átlójában. Ráadásul egy olyan háromszögmátrix, amely nem diagonális semmiképpen sem lehet normális. Tehát például az $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ mátrix megfelel.

3. a) Mutassuk meg, hogy a következő mátrixok ortogonálisan hasonlóak.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b) Határozzuk meg a hasonlóság ortogonális mátrixát!

Megoldás: a) Mivel a mátrix szimmetrikus, a főtengety-tétel szerint ortogonálisan diagonalizálható.

Csak a sajátértékeket kell meghatározni. Látható, hogy $r(A) = 1$, így a 0-hoz tartozó sajátérték dimenziója $4 - 1 = 3$. Tehát a 0 legalább háromszoros sajátérték, s mivel a nyom 4, a negyedik sajátérték csak 4 lehet, vagyis A diagonális alakja valóban D . (Mellesleg, könnyen látható is, hogy minden sorösszeg 4, így az $(1, 1, 1, 1)$ vektor sajátvektor, $\lambda = 4$ sajátértékkel.)

b) A 0-hoz tartozó sajátérték az $(1, 1, 1, 1)^\perp =: W$, tehát merőleges a 4-hez tartozó sajátvektorra (ez a normalitásból is következik). Csak W -hez kell ortogonális bázist találni. Ezt megoldhatjuk a Gauss-eliminációból kapott $\{(-1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}$ bázis ortogonalizálásával, vagy eleve az $(1, 1, 1, 1)$ ortogonális kiegészítésével, de kereshetünk szép bázist: az $(1, 1, 1, 1)$ -re merőleges $(\pm 1, \pm 1, \pm 1, \pm 1)$ vektorok közül (tehát amelyekben két plusz és két mínusz van) könnyen kiválogathatunk egymásra merőlegeseket: $\{(1, 1, -1, -1), (1, -1, 1, -1), (1, -1, -1, 1)\}$. Az \mathbb{R}^4 így kapott bázisát lenormálva a következő ortogonális áttérési mátrixot kapjuk:

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

4. Bizonyítsuk be, hogy egy $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ mátrix pontosan akkor ferdén önadjungált, ha iA önadjungált.

Megoldás: $(iA)^* = \bar{i}A^* = -iA^*$, tehát

A ferdén öndajungált $\Leftrightarrow A^* = -A \Leftrightarrow -iA^* = iA \Leftrightarrow (iA)^* = iA \Leftrightarrow iA$ öndajungált.

5. Bizonyítsuk be, hogy normális mátrix különböző sajátértékeihez tartozó sajátalterei merőlegesek egymásra, pontosabban

a) $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ pontosan akkor normális, ha \mathbb{C}^n az A sajátaltereinek ortogonális direkt összege (azaz a komponensek páronként merőlegesek egymásra);

b) $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pontosan akkor szimmetrikus, ha \mathbb{R}^n az A sajátaltereinek ortogonális direkt összege

Megoldás: a) Tegyük fel, hogy A normális, és legyenek a különböző sajátértékei $\lambda_1, \dots, \lambda_k$. A spektráltétel miatt van A -hoz \mathbb{C}^n -nek ortonormált sajátbázisa. Legyen U_i az ezek közül a λ_i -hez tartozó sajátvektorok által kifeszített altér. Ekkor $V = \mathbb{C}^n$ az U_i -k ortogonális direkt összege. Másrészt $U_i \subseteq V_{\lambda_i}$ minden i -re, így $n = \sum \dim U_i \leq \sum \dim V_{\lambda_i} \leq n$, tehát $U_i = V_{\lambda_i} \forall i$, azaz \mathbb{C}^n a V_{λ_i} -k ortogonális direkt összege. Ebből következik, hogy a különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok merőlegesek egymásra.

Fordítva, ha $\mathbb{C}^n = \bigoplus V_{\lambda_i}$ ortogonális direkt összeg, akkor a sajátalterek egy-egy ortonormált bázisának (amelyek léteznek, mert V_{λ_i} -k is euklideszi terek) uniója V -ben ortonormált sajátbázis, így A normális.

b) Ugyanúgy, mint a komplex esetben, csak itt a valós főtengetyétel következményét kell használni: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ pontosan akkor szimmetrikus, ha \mathbb{R}^n -ben van A -hoz tartozó ortonormált sajátbázis.

6. Az alábbiak közül melyik mátrix hozható valós vagy komplex diagonális alakra? Lehet-e a diagonalizáló mátrix unitér/ortogonális?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 1-i \\ 1+i & 3 \end{bmatrix}$$

Megoldás: Az A mátrix diagonalizálható \mathbb{R} fölött is, mert van 3 különböző valós sajátértéke a 3×3 -as mátrixnak, de nem lehet unitéren diagonalizálható, mert akkor normális lenne, de háromszögmátrix csak akkor lehet normális, ha diagonális.

B unitér, tehát unitéren is diagonalizálható. Viszont a diagonális alak nem lehet valós, mert akkor a mátrix öndajungált (azaz valós lévén szimmetrikus) lenne.

C háromszögmátrix, ezért leolvasható róla, hogy csak az 1 a sajátértéke, háromszoros algebrai multiplicitással. Ha diagonalizálható lenne, akkor az I mátrixhoz lenne hasonló, de az I -nek minden konjugáltja önmaga. Tehát C egyáltalán nem diagonalizálható.

D öndajungált, ezért unitéren valós diagonális alakra hozható. Összefoglalva:

	A	B	C	D
diag. alak \mathbb{R} vagy \mathbb{C}	\mathbb{R}	\mathbb{C}	–	\mathbb{R}
unitéren diag.-ható?	n	i	n	i