

## Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika

minta ZH, 2020 őszi

Az egyetlen „ZH” 5 feladatból fog állni, a munkaidő 90 perc.

Minden feladat SZÁMOLÁSI feladat lesz: hasonló a gyakorló feladatsor feladataihoz.

Természetesen a feladatok NEM fognak megegyezni a gyakorló feladatokkal.

Mivel 5-nél jóval több feladattípus van, sorsolással dől el, hogy melyik típusok szerepelnek.

Egy lehetséges példa:

1. Móricka az egyetemi órák látogatásának egészségügyi kockázatairól ír egy kamu lánclevelet, és elküldi 10 ismerősének a nulladik napon. A levélben benne van, hogy a címzett küldje tovább újabb 10 embernek. A levelet a címzettek egymástól függetlenül 90% valószínűséggel olvasatlanul törlik, ám a maradék 10% valószínűséggel tényleg továbbküldik 10 embernek, a következő napon.
  - a.) Várhatóan hányan küldenek levelet a harmadik napon?
  - b.) Mennyi a valószínűsége annak, hogy előbb-utóbb senki nem küldi tovább a levelet?
  - c.) Mennyi a levelet továbbküldő emberek számának várható értéke?
2. Jancsi és Juliska házában a vezetékes telefon Poisson folyamat szerint csörög, két óránként átlagosan egyszer.
  - a.) Mennyi a valószínűsége, hogy az esti filmet, ami reklámokkal együtt két és fél óra hosszú, végignézhetik a nélkül, hogy csörögne a telefon?
  - b.) Mennyi a valószínűsége, hogy az első telefonhívásra a film kezdetétől számítva kevesebb, mint fél órát kell várni?
  - c.) Mivel filmnézés közben nem szeretnek telefonálni, minden csörgéskor érmedobással döntenek, hogy melyikük vegye fel. Mennyi a valószínűsége, hogy Jancsinak így is 1-nél többször kell a film alatt telefonálnia?
3. Egy kis telefonközpontba a hívások Poisson folyamat szerint érkeznek, percenként átlagosan 2. Adjunk nagy eltérés becslést annak valószínűségére, hogy reggel 8 órától számítva a 400-adik hívásra kevesebb, mint 2,5 órát kell várni.


(Segítség: a  $\lambda$  paraméterű exponenciális eloszlás Cramér féle rátafüggvénye

$$I(x) = \lambda x - \ln(\lambda x) - 1 \quad (\text{ha } x > 0).$$

A  $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlás Cramér féle rátafüggvénye

$$I(x) = x \ln(x/\lambda) - x + \lambda \quad (\text{ha } x > 0).$$

4. Móricka egy golyós ügyességi játékot játszik, ahol egy csapágygolyót kell végigvezetni egy akadálypályán. Az első pályát gyakorolja, ahol 3 nehéz akadályon kell átjutni. Móricka az első akadályon  $\frac{1}{4}$ , a másodikon  $\frac{1}{3}$ , a harmadikon  $\frac{1}{2}$  valószínűséggel *bukik el*, az előzményektől függetlenül. Ilyenkor a golyó „leesik”, és Móricka kezdheti az egészet előlről. Ellenkező esetben továbbjut a következő akadályhoz. Ha véletlenül mindhárom akadályon sikerül túljutnia, akkor szintén újakezdi a legelejéről. Jelölje  $X_n$  azt, hogy  $n$  lépés után Móricka éppen hány akadályon van túl – így  $X_n$  lehetséges értékei 0, 1, 2, 3.



- a.) Írjuk fel az  $X_n$  Markov lánc átmenetmátrixát.
- b.) Hosszú távon melyik állapotban lesz a Markov lánc legtöbbször, és a lépések mekkora hányadát tölti Móricka ezzel a leggyakoribb akadállyal?
- c.) Hosszú távon hanyadik akadályon *bukik el* legtöbbször Móricka, és a bukások mekkora hányada történik ezen az akadályon?
5. Pistike az ablakból az utca forgalmát nézi. Személyautók és teherautók mennek arra, mindkettő Poisson-folyamat szerint: személyautóból percenként átlagosan 3, teherautóból percenként átlagosan 1. Pistike csak a teherautókat szereti. Jókedve 5-ös skálán változik (1 és 5 között): ha teherautót lát, 1-gyel felfelé ugrik (hacsak nem már előtte is 5-ös volt), ha pedig személyautót, akkor 1-gyel lefelé (hacsak nem már előtte is 1-es volt). Legyen  $X(t)$  Pistike jókedve a  $t$  időpillanatban,  $t \geq 0$ .
- a.) Modellezzük a rendszert folytonos idejű Markov láncsal. Írjuk fel  $X(t)$  generátorát.
- b.) Határozzuk meg  $(X(t), t \geq 0)$  stacionárius eloszlását. (Szabad észrevenni, hogy  $X$  véges állapotterű születési-halálozási folyamat.)
- c.) Pistike a nézelődést teljes jókedvvel kezdte. Egy óra elteltével arra jár az apukája. Közelítőleg mennyi annak a valószínűsége, hogy Pistikét teljes rosszkedvben (vagyis 1-es állapotban) találja?
- d.) Hosszú távon az idő hány százalékában lesz Pistikének 5-ös jókedve?
- e.) Hosszú távon mennyi lesz Pistike jókedvének időátlaga?