

**Valószínűségszámítás 1. II. éves matematikus-hallgatóknak, illetve
Valószínűségszámítás (B4) II. éves mérnök-fizikus hallgatóknak
2005/2006. őszi félév, Szász Domokos**

6. feladatsor

**Diszkrét valószínűségi változók II:
várható érték, szórásnégyzet, függetlenség stb.**

- 6.1 Legyenek X_1 és X_2 független, $p(k; \lambda_1)$ ill. $p(k; \lambda_2)$ Poisson eloszlású valószínűségi változók.
 - (a) Bizonyítsuk be, hogy $X_1 + X_2$ eloszlása $p(k; \lambda_1 + \lambda_2)$ Poisson eloszlás.
 - (b) Bizonyítsuk be, hogy $X_1 + X_2$ ismeretében X_1 feltételes eloszlása binomiális, azaz:

$$\mathbf{P}(X_1 = k | X_1 + X_2 = n) = \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}.$$

- 6.2 Legyenek X , Y és Z független, azonos $g(k; p) = q^k p$, $k = 0, 1, 2, \dots$ geometriai eloszlású valószínűségi változók.
 - (a) Számítsuk ki a következő valószínűségeket:

$$\mathbf{P}(X = Y), \quad \mathbf{P}(X \geq 2Y), \quad \mathbf{P}(X + Y \leq Z).$$

(b) Legyen $U := \min\{X, Y\}$ és $V := X - Y$. Bizonyítsuk be, hogy U és V függetlenek.

- 6.3 Legyenek X és Y független, azonos $g(k; p) = q^k p$, $k = 0, 1, 2, \dots$ geometriai eloszlású valószínűségi változók. Lássuk be számolás nélkül, hogy $X + Y$ ismeretében X feltételes eloszlása egyenletes, azaz:

$$\mathbf{P}(X = k | X + Y = n) = \frac{1}{n+1}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

- 6.4 (a) Egy érmével dobunk. Ha az eredmény fej, akkor még kétszer dobunk, ha írás, akkor még egyszer. Mennyi az összes fej-dobások számának várható értéke?
 - (b) Érmével dobunk addig, amíg először fordul elő, hogy két egymás utáni dobás eredménye azonos. Mennyi a szükséges dobások számának várható értéke?
- 6.5 Egy embernek n kulcsa van, amelyek közül egyetlen egy nyit egy bizonyos ajtót. Emberünk véletlenszerűen próbálkozik a kulcsokkal, mindaddig, amíg rá nem talál a megfelelő kulcsra. Határozzuk meg a próbálkozások számának várható értékét, ha
 - (a) a sikertelen kulcsokat nem zárja ki a további próbálkozások során (visszatevéses húzások),
 - (b) a sikertelen kulcsokat kizárja a további próbálkozások során (visszatevés nélküli húzások).
- 6.6 Két kockával dobva, mennyi a dobott számok maximumának, illetve minimumának várható értéke?
- 6.7 (a) Határozzuk meg az ötös lottó találatok számának, várható értékét egy taláalomra kitöltött szelvény esetén.
 - (b) Számítsuk ki az ötös lottó sorsoláson kihúzott legnagyobb, illetve legkisebb szám várható értékét.
- 6.8 Legyen X nem-negatív egész értékű valószínűségi változó és tegyük fel, hogy $\mathbf{E}(X) < \infty$. Bizonyítsuk be, hogy

$$\mathbf{E}(X) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(X \geq i).$$

- 6.9 Kettőn céllövésben versenyeznek, a két versenyző p_1 , illetve p_2 valószínűséggel ér el találatot ($p_1 < p_2$). Az ügyetlenebb kezd, majd felváltva lönek. Aki először talál, az nyer. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az ügyesebb nyer? Mennyi a játék várható időtartama, ha percenként egy lövést végeznek?
- 6.10 Számítsuk ki az $(1 + X)^{-1}$ valószínűségi változó várható értékét a következő esetekben:

- (a) ha $X \sim b(k; p, n)$ binomiális eloszlású;
 (a) ha $X \sim p(k; \lambda)$ Poisson eloszlású.

- 6.11 (a) Legyenek X és Y független, nemnegatív egész értékű valószínűségi változók, melyekre $\mathbf{E}(X) < \infty$ és $\mathbf{E}(Y) < \infty$. Bizonyítsuk be, hogy

$$\mathbf{E}(\min\{X, Y\}) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(X \geq i) \mathbf{P}(Y \geq i).$$

- (b) Általánosítsuk az előbbi összefüggést tetszőleges k darab független, nemnegatív egész értékű X_1, X_2, \dots, X_k valószínűségi változóra, melyekről felteszszük, hogy véges a várható értékük:

$$\mathbf{E}(\min\{X_1, X_2, \dots, X_k\}) = \sum_{i=1}^{\infty} \prod_{j=1}^k \mathbf{P}(X_j \geq i).$$

- (c) Az (a) kérdés feltételei mellett bizonyítsuk be, hogy

$$\mathbf{E}(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - \mathbf{P}(X \leq i) \mathbf{P}(Y \leq i)].$$

- 6.12 Hamis érmével dobunk, melynél a *fej* valószínűsége p , az *írásé* pedig $q = 1 - p$. Jelöljük X -szel és Y -nal az első, ill. a második tiszta (fej vagy írás) sorozat hosszát. (Pl. ha dobássorozatunk $FFFIF \dots$, akkor $X = 3, Y = 2$; ha pedig dobássorozatunk $IFFI \dots$, akkor $X = 1, Y = 2 \dots$) Határozzuk meg a következő mennyiségeket: $\mathbf{E}(X)$, $\mathbf{E}(Y)$, $\mathbf{E}(X^2)$, $\mathbf{E}(Y^2)$, $\mathbf{D}^2(X)$, $\mathbf{D}^2(Y)$, $\mathbf{Cov}(XY)$.
- 6.13 Legyen X nemnegatív egész v értékű valószínűségi változó, melynek véges a második momentuma ($\mathbf{E}(X^2) < \infty$). Fejezzük ki az $S := \sum_{k=1}^{\infty} k \mathbf{P}(X \geq k)$ mennyiséget $\mathbf{E}(X)$ és $\mathbf{D}^2(X)$ segítségével.
- 6.14 Legyen X pozitív értékű valószínűségi változó. Bizonyítandó, hogy $(\mathbf{E}(X))^{-1} \leq \mathbf{E}(X^{-1})$. (Megjegyzés: ez a Jensen egyenlőtlenség legegyszerűbb sajátos esete.)