

**Valószínűesszámitás 1. II. éves matematikus-hallgatóknak, illetve
Valószínűesszámitás (B4) II. éves mérnök-fizikus hallgatóknak
2005/2006. őszi félév, Szász Domokos**

**12. feladatsor
DeMoivre-Laplace CHT**

Az alább következő 12.1-12.8 feladatokra numerikus választ kérek. Ehhez a φ és Φ függvények értéktáblázaikat is használni kell.

- 12.1 A bimomiális eloszlás normális approximációjának felhasználásával számoljuk ki a következő kifejezés numerikus közelítését:

$$\binom{3600}{2376} 0.64^{2376} 0.36^{1224}.$$

- 12.2 Mennyi annak a valószínűsége, hogy 10.000 véletlen számjegy között legfeljebb 968 darab 7-es fordul elő?
- 12.3 Mennyi annak a valószínűsége, hogy 12.000 kockadobás során előforduló hatosok száma 1900 és 2150 közé esik?
 - 12.4 Határozzuk meg azt a k egész számot, amelyre igaz, hogy annak a valószínűsége, hogy 1000 érmédobás során a FEJek száma 490 és k közé esik, kb. 0.5.
 - 12.5 10.000 érmédobás során 5.400-szor volt FEJ az eredmény. Indokolt-e gyanakodnunk arra, hogy a használt érme hamis?
 - 12.6 Hányszor kell egy érmével dobnunk ahhoz, hogy 0.99-nál nagyobb valószínűséggel a FEJ eredmények száma a dobások számának 49%-a és 51%-a közé essen?
 - 12.7 Dömötör ruletkez a kaszinóban. Minden egyes körben 10 petákat tesz 'piros'-ra. 100 játék után 300 peták a vesztesége. Jogos-e a gyanúja, hogy svindliz a croupier? (A rulett-körön összesen 37 mező van 0-tól 36-ig számozva. Ezek közül egy (a 0 jelű) zöld, a fennmaradó 36-ból pedig 18 piros és 18 fekete.)
 - 12.8 Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 100.000 poker leosztás során a fullok száma 128 és 158 közé essen.

Előzetes megjegyzés a 12.9 és 12.10 feladatokhoz: Ezekben a feladatokban a mintavétel "visszatevéses" módszerrel történik. Azaz: n -szer kérdeznak meg véletlenszerűen kiválasztott egyedet. Az is előfordulhat (elenyészően kis valószínűséggel), hogy egy egyedet véletlen folytán többször is megkérdeznak.

- 12.9 Egy nagyváros lakosságának *általunk ismeretlen* p hányada dohányzik. Ezt a p hányadot akarjuk közelítőleg meghatározni egy mintában megfigyelt relatív gyakorisággal, a következő módon: megkérdezzük n véletlenszerűen kiválasztott lakost és megállapítjuk, hogy ezek között k állítja, hogy dohányzik. A NSZT-ből tudjuk, hogy ha n elég nagy, akkor az empirikusan megfigyelt $p' := k/n$ relatív gyakoriság igen nagy valószínűséggel jól közelíti az igazi p hányadot. Milyen nagynak kell n -et választanunk, ha azt akarjuk elérni, hogy az empirikusan megfigyelt p' relatív gyakoriság legalább 0.95 valószínűséggel 0.005 hibahatáron belül közelítse a valódi (ismeretlen) p hányadot? Más szóval: határozzuk meg azt a legkisebb n_0 természetes számot, amelyre igaz, hogy bármely $p \in (0, 1)$ -re és $n \geq n_0$ -ra

$$\mathbf{P}(|p' - p| \leq 0.005) \geq 0.95.$$

- 12.10 Amerikai elnökválasztás előtt a Gallup közvéleménykutatató társaság meg akarja becsülni a Demokrata párti szavazók arányát New Hampshire és Texas államokban. Eleve tudják, hogy mindkét államban a Demokrata párti szavazók aránya 40% és 60% között van. Céljuk, hogy mindkét államban az arányokat 0.99-nél nagyobb valószínűséggel, 2% hibahatáron belül állapítsák meg. New Hampshire államban 1.2 millió polgár jogosult szavazni, míg Texas államban 12 millió. E számok alapján statisztikusuk azt állítja, hogy Texasban kb. tízszer akkora mintát kell megfigyelni, mint New Hampshire-ben. Jó-e ez az okoskodás, vagy rúgják ki a statisztikust? Az utóbbi esetben kb. hányszor nagyobb mintát kell Texasban megfigyelni, mint New Hampshireben?

- 12.11 (A Poisson eloszlás normális approximációja.)
Bizonyítsuk be, hogy $\lambda \rightarrow \infty$ -re

$$\sqrt{\lambda}p([\lambda + x\sqrt{\lambda}]; \lambda) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) + \mathcal{O}(\lambda^{-1/2}),$$

és a hibatag egyenletesen kicsi, ha x egy korlátos halmazban marad. Következésképpen lássuk be, hogy

$$\sum_{\lambda + \alpha\sqrt{\lambda} < k < \lambda + \beta\sqrt{\lambda}} p(k; \lambda) \rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(y) dy = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha)$$

amint $\lambda \rightarrow \infty$.

- 12.12 Legyen X_{λ} Poisson eloszlású valószínűségi változó, melynek várható értéke $\mathbf{E}(X_{\lambda}) = \lambda$. Számoljuk ki az $Y_{\lambda} := \sqrt{X_{\lambda}}$ valószínűségi változó szórásának határértékét, amint $\lambda \rightarrow \infty$.