

1. előadás

Logikai műveletek. Bizonyítási módszerek: direkt bizonyítás, indirekt bizonyítás, teljes indukció, skatulyaelv.

Logikai műveletek, kvantorok

Kijelentések

Az **állítás** vagy **kijelentés** olyan kijelentő mondat, amelyről egyértelműen eldönthető, hogy **igaz (i)** vagy **hamis (h)**, ezt a mondat **logikai értékének** nevezzük.

Kijelentésekből **logikai műveletek** segítségével újabb kijelentéseket állíthatunk össze, amelyeket értéktáblázatok segítségével is megadhatunk.

Logikai műveletek

1) "nem" (negáció, tagadás): az A állítás tagadása pontosan akkor igaz, ha A hamis. Jele: $\neg A$.

2) "és" (konjunkció): az " A és B " állítás pontosan akkor igaz, ha az A és a B állítás is igaz. Jele: $A \wedge B$.

3) "vagy" (diszjunkció): az " A vagy B " állítás pontosan akkor igaz, ha az A és a B állítás közül legalább az egyik igaz. Jele: $A \vee B$.

4) "ha akkor" (implikáció): a " A ha, akkor B " állítás pontosan akkor igaz, ha az A és a B állítás is igaz, illetve ha az A állítás hamis és a B állítás tetszőleges. Jele: $A \Rightarrow B$.

5) "akkor és csak akkor" (ekvivalencia): a " A ha, akkor és csak akkor B " állítás pontosan akkor igaz, ha az A és a B állítás közül egyszerre mindkettő igaz vagy mindkettő hamis. Jele: $A \Leftrightarrow B$.

A	$\neg A$
i	h
h	i

A	B	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
i	i	i	i	i	i
i	h	i	h	h	h
h	i	i	h	i	h
h	h	h	h	i	i

Néhány azonosság

Értéktáblázatok segítségével igazolható:

1. $\neg(\neg A) = A$

2. kommutativitás: $A \vee B = B \vee A$, $A \wedge B = B \wedge A$

3. asszociativitás: $(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C)$, $(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$

4. disztributivitás: $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$, $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$

Szükséges, illetve elégséges feltétel

1. Implikáció: Az $A \implies B$ állítás esetében, azaz ha az A teljesülése esetén biztosan teljesül B is, azt mondjuk, hogy **az A állítás a B állításnak elégséges feltétele**, illetve **a B állítás az A állításnak szükséges feltétele**.

Más szóhasználat: A -ból következik B ; az A csak akkor teljesül, ha B is teljesül; ahhoz, hogy A teljesüljön, szükséges, hogy B fennálljon; ahhoz, hogy B teljesüljön, elegendő, hogy A fennálljon; stb.

2. Ekvivalencia: Az $A \iff B$ állítás esetében (azaz ha $A \implies B$ és $B \implies A$ is teljesül) azt mondjuk, hogy **az A állítás a B állításnak szükséges és elégséges feltétele**.

Példa

Legyen A : esik az eső, B : felhős az ég.

Ekkor $A \implies B$: Ha esik az eső, akkor felhős az ég.

- A elégséges, de nem szükséges feltétele B -nek
- B szükséges, de nem elégséges feltétele A -nak

Feladat

Adjunk meg

- szükséges, de nem elégséges
- elégséges, de nem szükséges
- szükséges és elégséges

feltételt ahhoz, hogy az N egész szám osztható legyen 10-zel.

Megoldás:

a) szükséges, de nem elégséges; például:

- osztható 2-vel;
- osztható 5-tel;

b) elégséges, de nem szükséges; például:

- osztható 20-szal;
- osztható 100-zal;

c) szükséges és elégséges; például:

- osztható 2-vel és 5-tel;
- 0-ra végződik
- felírható $N = 10k$ alakban, ahol k egész szám.

De Morgan-azonosságok

Igazoljuk a következő azonosságokat:

$$1. \neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$$

$$2. \neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$$

Megoldás: Az 1. azonosság értéktáblázattal (a 2. hasonlóan igazolható):

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
i	i	i	h	h	h	h
i	h	h	i	h	i	i
h	i	h	i	i	h	i
h	h	h	i	i	i	i

Példa

a) Állítás: Ma moziba megyünk és fagyizunk.
 Tagadás: Ma nem megyünk moziba vagy nem fagyizunk.

b) Állítás: Esik a hó vagy hideg van.
 Tagadás: Nem esik a hó és nincs hideg.

Az implikáció és tagadása

Igazoljuk a következő azonosságokat:

- $A \implies B = \neg A \vee B$
- $A \implies B = \neg B \implies \neg A$
- $\neg(A \implies B) = A \wedge \neg B$

Megoldás: Értéktáblázatokkal:

1. $(A \implies B) = (\neg A \vee B)$

2. $(A \implies B) = (\neg B \implies \neg A)$

A	B	$\neg A$	$A \implies B$	$\neg A \vee B$
i	i	h	i	i
i	h	h	h	h
h	i	i	i	i
h	h	i	i	i

A	B	$A \implies B$	$\neg B$	$\neg A$	$\neg B \implies \neg A$
i	i	i	h	h	i
i	h	h	i	h	h
h	i	i	h	i	i
h	h	i	i	i	i

3. Az $A \implies B = \neg A \vee B$ implikáció tagadása igazolható értéktáblázattal, vagy a De Morgan-azonosságok felhasználásával is:

$$\neg(A \implies B) = \neg(\neg A \vee B) = \neg(\neg A) \wedge \neg B = A \wedge \neg B$$

Példa

Állítás: Ha süt a nap, akkor túrázni megyek.
 Formálisan: $A \implies B$, ahol A : süt a nap, B : túrázni megyek

Átfogalmazás ($A \implies B = \neg A \vee B$): Nem süt a nap vagy túrázni megyek.
 Tagadás ($A \wedge \neg B$): Süt a nap és nem megyek túrázni.

Az ekvivalencia és tagadása

Igazoljuk a következő azonosságokat:

$$1. (A \iff B) = (A \implies B) \wedge (B \implies A)$$

$$2. \neg(A \iff B) = (A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$$

Megoldás:

1. Értéktáblázattal (házi feladat).

2. Felhasználva az 1. állítást, a De Morgan-azonosságot és a $\neg(A \implies B) = A \wedge \neg B$ azonosságot:

$$\neg(A \iff B) = \neg((A \implies B) \wedge (B \implies A)) = \neg(A \implies B) \vee \neg(B \implies A) = (A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$$

Megjegyzés: Az értéktáblázat alapján is látható, hogy $A \iff B$ pontosan akkor igaz, ha A és B közül mindkettő igaz vagy mindkettő hamis. Így a tagadása pontosan akkor lesz igaz, ha A és B közül az egyik igaz és a másik hamis, vagy fordítva.

Példa

Állítás: Akkor és csak akkor megyek nyaralni, ha nyerek a lottón.

Formálisan: $A \iff B$, ahol A : nyaralni megyek, B : nyerek a lottón

Tagadás: $(A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg A)$, azaz:

Nyaralni megyek és nem nyerek a lottón vagy nyerek a lottón és nem megyek nyaralni.

Kvantorok és tagadásuk

1. Használatos a "**minden**" szóra a \forall , a "**létezik**" vagy "**van olyan**" kifejezésre a \exists jelölés is, ezeket **kvantoroknak** nevezzük.

2. Állítások tagadása:

a) Állítás: "Minden A -ra igaz B " ($\forall A : B$)

Tagadás: "Van olyan A , amelyre nem igaz B " ($\exists A : \neg B$).

b) Állítás: "Van olyan A , amelyre igaz B " ($\exists A : B$)

Tagadás: "Minden A -ra nem igaz B ", vagy "egyik A -ra sem igaz B " ($\forall A : \neg B$).

3. Az $A \implies B$ állítás "**ha akkor**" helyett a "**minden**" szóval is megfogalmazható.

Példák

1. Állítás: Minden nap esik az eső.

Tagadás: Van olyan nap, amikor nem esik az eső.

2. Állítás: Van olyan nap, amikor tévét nézek.

Tagadás: Egyik nap sem nézek tévét.

3. Állítás: Ha péntek van, akkor moziba megyek.

Ugyanezt jelenti: Minden pénteken moziba megyek.

Tagadás: Van olyan péntek, amikor nem megyek moziba.

Ugyanezt jelenti: Péntek van és nem megyek moziba.

Feladat

Tagadjuk a következő állításokat.

- Minden ablak nyitva van.
- Minden emeleten van olyan ablak, ami nyitva van.
- Minden épületben van olyan emelet, ahol minden ablak nyitva van.
- Minden pozitív ε számhoz van olyan δ pozitív szám, hogy bármely x valós számra, ha $|x - a| < \delta$, akkor $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Megoldás:

- Állítás: **Minden** ablak **nyitva van**.
Tagadás: **Van olyan** ablak, ami **csukva van**.
- Állítás: **Minden** emeleten **van olyan** ablak, ami **nyitva van**.
Tagadás: **Van olyan** emelet, ahol **minden** ablak **csukva van**.
- Állítás: **Minden** épületben **van olyan** emelet, ahol **minden** ablak **nyitva van**.
Tagadás: **Van olyan** épület, ahol **minden** emeleten **van olyan** ablak, ami **csukva van**.
- Állítás: **Minden** pozitív ε számhoz **van olyan** δ pozitív szám, hogy **bármely** x valós számra, **ha** $|x - a| < \delta$, **akkor** $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$.
Tagadás: **Létezik olyan** pozitív ε szám, hogy **bármely** δ pozitív számhoz **található olyan** x szám, hogy $|x - a| < \delta$, **de** $|f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$.

Állítások tagadása (összefoglalás)

Állítás	Tagadás
• A vagy B	• nem A és nem B
• A és B	• nem A vagy nem B
• ha A , akkor B	• A és nem B
• minden A -ra igaz B	• van olyan A , amelyre nem igaz B
• van olyan A , amelyre igaz B	• minden A -ra nem igaz B

Házi feladat

Adjunk meg

- szükséges, de nem elégséges
 - elégséges, de nem szükséges
 - szükséges és elégséges
- feltételt ahhoz, hogy egy négyszög téglalap legyen.

Megoldás:

a) szükséges, de nem elégséges; például:

1. van egy párhuzamos oldalpárja;
2. a szemközti oldalai párhuzamosak;
3. az átlói felezik egymást;
4. van derékszöge;
5. van két derékszöge;
6. a négyszög húrnégyszög;
7. a négyszög középpontosan szimmetrikus;
8. a négyszög tengelyesen szimmetrikus;
9. a négyszög paralelogramma.

b) elégséges, de nem szükséges; például:

1. a négyszög négyzet;
2. a négyszög átlói merőlegesek és felezik egymást.

c) szükséges és elégséges; például:

1. a négyszög minden szöge derékszög;
2. a négyszög húrnégyszög, melynek két szomszédos szöge derékszög;
3. a négyszög paralelogramma, melynek van derékszöge;
4. a négyszög szemközti oldalai egyenlők, és van derékszöge;
5. a négyszög szemközti oldalai párhuzamosak, és van derékszöge;
6. van két szimmetriatengelye, melyek az oldalakra merőlegesek.

Bizonyítási módszerek

Direkt bizonyítás

A direkt bizonyításnál **igaz** állításból kiindulva helyes matematikai lépéseken keresztül jutunk el a bizonyítandó állításhoz.

Példa

Számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség:

Bármely a_1, a_2, \dots, a_n nemnegatív valós számok esetén $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$,

és egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Bizonyítás $n = 2$ esetén: Ekvivalens átalakításokkal:

$$\frac{a_1 + a_2}{2} \geq \sqrt{a_1 a_2} \iff (a_1 + a_2)^2 \geq 4 a_1 a_2 \iff a_1^2 - 2 a_1 a_2 + a_2^2 \geq 0 \iff (a_1 - a_2)^2 \geq 0,$$

ami mindig teljesül, és egyenlőség pontosan akkor áll fenn, ha $a_1 = a_2$.

Indirekt bizonyítás

Az indirekt bizonyításnál feltesszük, hogy a bizonyítandó állítás tagadása igaz, ez az indirekt feltevés. Az indirekt feltevésből kiindulva helyes matematikai lépéseken keresztül ellentmondásra jutunk, ami azt jelenti, hogy az indirekt feltevés hamis, tehát az eredeti állítás igaz.

Feladatok

1. Bizonyítsuk be, hogy egy társaságban, ahol az ismeretségek kölcsönösek, mindig található két ember, akiknek ugyanannyi ismerőse van.

Bizonyítás:

1. Indirekt módon tegyük fel, hogy nincs két ilyen ember, azaz egy n tagú társaságban mindenkinek különböző számú ismerőse van.
2. Egy ember ismerőseinek száma $0, 1, 2, \dots, n - 1$ lehet, így ennek az n darab számnak mind elő kell fordulnia.
3. Ez azonban nem lehetséges, hiszen ha valaki $n - 1$ embert ismer, azaz mindenkit, akkor a kölcsönös ismeretségek miatt nem lehet olyan ember, akinek egyetlen ismerőse sincs.

2. Bizonyítsuk be, hogy a $\sqrt{3}$ szám irracionális.

Bizonyítás:

1. Indirekt módon tegyük fel, hogy a $\sqrt{3}$ racionális, ekkor felírható két egész szám hányadosaként, azaz $\sqrt{3} = \frac{a}{b}$ alakban, ahol a, b egészek és $b \neq 0$.
2. Négyzetre emelve és b^2 -tel szorozva azt kapjuk, hogy $3b^2 = a^2$. Vizsgáljuk meg a két oldalon álló szám prímtényező felbontásában a 3 kitevőjét.
3. Mivel egy négyzetszám prímtényező felbontásában minden kitevő páros, ezért a jobb oldalon a 3 páros kitevőjű hatványa áll, a bal oldalon pedig páratlan.
4. Ez azonban ellentmond a számelmélet alaptételének, tehát a $\sqrt{3}$ nem racionális.

3. Bizonyítsuk be, hogy végtelen sok prímszám van.

Bizonyítás:

1. Indirekt módon tegyük fel, hogy csak véges sok prímszám van, legyenek ezek p_1, p_2, \dots, p_k .
2. Szorozzuk össze ezeket a számokat, és a szorzatukhoz adjunk hozzá 1-et, azaz legyen

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1$$

3. Ekkor az n szám nem osztható a p_1, p_2, \dots, p_k prímszámok egyikével sem, hiszen az osztási maradék mindig 1 lesz.
4. Ezért az n vagy egy újabb prímszám, vagy olyan összetett szám, amelynek van a felsorolt k darab prímszámtól különböző prímtényezője.
5. Abból indultunk ki tehát, hogy pontosan k darab prímszám van, majd arra a következtetésre jutottunk, hogy kell lennie még legalább egy prímszámnak, ami ellentmondás. Így az indirekt bizonyítás alapján látható, hogy végtelen sok prímszám van.

Teljes indukció

Jelöljön a $P(n)$ olyan állítást, amely az n egész számtól függ. A bizonyítás két lépésből áll.

1. Először megmutatjuk, hogy van olyan n_0 egész szám, amelyre a $P(n_0)$ állítás igaz.
2. Azután feltesszük, hogy valamely n egész számra $P(n)$ igaz, s ennek alapján bebizonyítjuk, hogy $P(n+1)$ is igaz.

Ezekből már következik, hogy $P(n)$ igaz minden $n \geq n_0$ esetén.

Megjegyzés:

A teljes indukció elve hasonlít a dominóeffektusra:

Ha

- az első dominó elborul, és
- minden dominó elborítja a rákövetkezőt is,

akkor a teljes dominósor elborul.

Feladatok

1. Bizonyítsuk be, hogy a következő állítás minden n pozitív egész számra teljesül:

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2.$$

Megjegyzés: Jelölje $P(n)$ a fenti állítást. Ekkor

$$\begin{array}{ll} P(1): 1 = 1^2 & P(4): 1 + 3 + 5 + 7 = 4^2 \\ P(2): 1 + 3 = 2^2 & P(5): 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5^2 \\ P(3): 1 + 3 + 5 = 3^2 & P(6): 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 6^2 \text{ stb.} \end{array}$$

Megoldás:

1. Ellenőrizzük az állítást $n = 1$ -re. Ez teljesül, mivel $1 = 1^2$.

2. a) Indukciós feltevés: Tegyük fel, hogy az állítás igaz valamely $n = k$ esetén, azaz

$$P(k): 1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) = k^2 \text{ teljesül.}$$

2. b) Belátjuk, hogy az állítás $n = k + 1$ -re is igaz, azaz

$$P(k+1): 1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) + (2k+1) = (k+1)^2 \text{ is teljesül.}$$

Felhasználva a 2. a) indukciós feltevést:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k-1) + (2k+1) = k^2 + (2k+1) = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$

Tehát az állítás $n = k + 1$ -re is igaz. Így a teljes indukció elve alapján az állítás minden n pozitív egész esetén teljesül.

Megjegyzés: A fenti állítást Francesco Maurolico bizonyította 1575-ben:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Teljes_indukci%C3%B3

2. Bizonyítsuk be, hogy a következő állítás minden n pozitív egész számra teljesül:

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Megoldás:

1. Az állítás $n = 1$ esetén teljesül, mivel $1 = \frac{1 \cdot 2}{2}$.

2. a) Tegyük fel, hogy az állítás igaz valamely $n = k$ esetén, azaz

$$1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2} \text{ teljesül.}$$

2. b) Belátjuk, hogy az állítás $n = k + 1$ -re is igaz, azaz

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2} \text{ is teljesül.}$$

Felhasználva a 2. a) indukciós feltevést:

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k + 1) = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Tehát az állítás $n = k + 1$ -re is igaz. Így a teljes indukció elve alapján az állítás minden n pozitív egész esetén teljesül.

3. Bizonyítsuk be, hogy a következő állítás igaz, ha az n pozitív egész szám nagyobb vagy egyenlő valamely n_0 pozitív egész számnál (adjuk meg a legkisebb ilyen n_0 -t).

$$3^n > 2^n + 7n$$

Megoldás: Jelölje $P(n)$ a fenti állítást. Ekkor

$$P(1) \text{ hamis, mivel } 3^1 < 2^1 + 7 \cdot 1 \quad P(4) \text{ igaz: } 3^4 > 2^4 + 7 \cdot 4$$

$$P(2) \text{ hamis, mivel } 3^2 < 2^2 + 7 \cdot 2 \quad P(5) \text{ igaz: } 3^5 > 2^5 + 7 \cdot 5$$

$$P(3) \text{ hamis, mivel } 3^3 < 2^3 + 7 \cdot 3 \quad P(6) \text{ igaz: } 3^6 > 2^6 + 7 \cdot 6 \text{ stb.}$$

Teljes indukcióval belátjuk, hogy az állítás minden $n \geq 4 = n_0$ egész esetén igaz.

1. Az állítás $n = 4$ esetén teljesül, mivel $3^4 > 2^4 + 7 \cdot 4$.

2. a) Tegyük fel, hogy az állítás igaz valamely $n = k$ esetén, azaz $3^k > 2^k + 7k$.

2. b) Belátjuk, hogy az állítás $n = k + 1$ -re is igaz, azaz $3^{k+1} > 2^{k+1} + 7(k + 1)$.

Felhasználva a 2. a) indukciós feltevést:

$$\begin{aligned} 3^{k+1} &= 3 \cdot 3^k > 3 \cdot (2^k + 7k) = \\ &= 3 \cdot 2^k + 3 \cdot 7k = \\ &= (2+1) \cdot 2^k + (2+1) \cdot 7k = \\ &= 2 \cdot 2^k + 2^k + 2 \cdot 7k + 7k = \\ &= 2^{k+1} + 7k + 2^k + 2 \cdot 7k > 2^{k+1} + 7k + 0 + 7 = \\ &= 2^{k+1} + 7(k+1) \end{aligned}$$

Tehát az állítás $n = k + 1$ -re is igaz. Így a teljes indukció elve alapján az állítás minden $n \geq 4$ egész esetén teljesül.

Skatulyaelv

1. Ha n darab dobozban legalább $n + 1$ tárgyat akarunk elhelyezni, akkor legalább egy dobozba legalább két tárgyat kell tennünk.
2. Ha n darab dobozban legalább $n k + 1$ tárgyat akarunk elhelyezni, akkor legalább egy dobozba legalább k darab tárgyat kell tennünk.

Feladatok

1. Válasszunk ki 6 különböző egész számot 1-től 10-ig. Bizonyítsuk be, hogy van közöttük kettő, melyek összege 11.
2. Bizonyítsuk be, hogy három egész szám között mindig van kettő, amelyek összege osztható 2-vel.
3. Bizonyítsuk be, hogy négy egész szám között mindig van kettő, amelyek különbsége osztható 3-mal.
4. Bizonyítsuk be, hogy öt 10-nél nagyobb prímszám között mindig van kettő, amelyek különbsége osztható 10-zel.
5. Egy terem padlóját tetszőlegesen kifestettük kékre vagy sárgára. Mutassuk meg, hogy van legalább két ugyanolyan színű pont, amelyek távolsága 1 méter.
6. Bizonyítsuk be, hogy ha egy 2 egység oldalú négyzet belsejében vagy a határán kiválasztunk 5 tetszőleges pontot, akkor mindig lesz két olyan pont, amelyek távolsága legfeljebb $\sqrt{2}$.
7. Egy egységsugarú kör alakú céltáblát 7 találat ér. Bizonyítsuk be, hogy a találatok között van kettő, amelyek távolsága legfeljebb 1 egység.
8. Mutassuk meg, hogy egy 209 fős évfolyamon biztosan van 5 hallgató, akiknek ugyanazon a héten van a születésnapjuk.
9. Legalább hány hallgató jár egy tankörbe, ha biztosan vannak közöttük négyen, akiknek ugyanabban a hónapban van a születésnapjuk?

Megoldások

1. Tekintsük a következő 5 számpárt: (1, 10), (2, 9), (3, 8), (4, 7) és (5, 6). Minden számpár esetében a számok összege 11. A skatulyaelv szerint (ahol ezek a számpárok a "skatulyák"), 6 különböző egész számot választva 1-től 10-ig, lesz közöttük kettő, amely ugyanazon számpárhoz tartozik, tehát az összegük 11.
2. Három egész szám között biztosan van kettő, amelyek azonos paritásúak (azaz mindkettő páros

vagy mindkettő páratlan), így az összegük biztosan páros.

3. Az egész számok 3-mal való osztási maradéka 3-féle lehet: 0, 1, 2. Így a skatulyaelv miatt négy egész szám között biztosan lesz kettő, amelyek 3-mal osztva ugyanazt az m maradékot adják. Azaz vannak olyan k_1 és k_2 egészek, melyekre e két szám $a = 3k_1 + m$ és $b = 3k_2 + m$ alakú, így $a - b = 3(k_1 - k_2)$, tehát a különbségük osztható 3-mal.
4. A 10-nél nagyobb prímek végződése csak 1, 3, 7, 9 lehet, így az öt prímszám között van két azonos jegyre végződő. Ezek különbsége osztható 10-zel.
5. Vegyünk egy 1 m oldalú szabályos háromszöget. A skatulyaelv miatt a csúcsai között lesz két azonos színű.
6. A 2 egység oldalú négyzetet osszuk fel négy, egységnyi oldalú kis négyzetre úgy, hogy a szemközti oldalak felezőpontjait összekötjük. Ha a nagy négyzetben 5 tetszőleges pontot kiválasztunk, akkor a skatulyaelv miatt biztosan van közöttük kettő, amelyik ugyanabba a kis négyzetbe esik. Ezek távolsága legfeljebb annyi, mint a négyzet átlójának hossza, azaz $\sqrt{2}$.
7. Osszuk fel a körlapot hat darab 60° -os középponti szögű körcikkre. Ekkor a skatulyaelv miatt lesz közöttük olyan, amelybe két találát esik, így e két pont távolsága legfeljebb 1 egység.
8. Mivel egy év 52 hétből áll, ezért 208 hallgató esetén még előfordulhat az, hogy minden héten pontosan 4 hallgatónak van születésnapja. Így a skatulyaelv miatt 209 hallgató esetén már biztosan lesz olyan hét, amikor 5-en ünneplik a születésnapjukat.
9. Legalább 37-en, hiszen 36 hallgató esetén még előfordulhat, hogy minden hónapban 3-an születtek.