

**Félévi időbeosztás [házi feladat beadási határidőkkel]**

**Figyelem! Az időbeosztás az év során változhat, pld a HF beadási határidőket az oktatók esetleg módosíthatják!**

Valószínűségszámítás matematikusoknak és fizikusoknak, 2022 ősz

<b>-vel kezdődő hét</b>	<b>Előadás</b> H 12-14, KF81 Bálint Péter	<b>Fizgyak</b> K 12-14, H405A Ráth Balázs	<b>Matgyak</b> K 14-16, T601/2 Ráth Balázs
Szept. 5	E1	Gy1	Gy1
Szept. 12	E2	Gy2 [1. HF]	Gy2 [1. HF]
Szept. 19	E3	Gy3 [2. HF]	Gy3 [2. HF]
Szept. 26	E4	Gy4 [3. HF]	Gy4 [3. HF]
Okt. 3	E5	Gy5 [4. HF]	Gy5 [4. HF]
Okt. 10	E6 és E7 okt. 15-én, szombaton	Gy6 [5. HF]	Gy6 [5. HF]
Okt. 17	E8	Gy7	Gy7
Okt. 24	E9	Gy8 [6. HF]	Gy8 [6. HF]
Okt. 31	<b>Oktatási szünet</b>	<b>Oktatási szünet</b>	<b>Oktatási szünet</b>
Nov. 7	E10	Gy9 [7. HF]	Gy9 [7. HF]
Nov. 14	E11	Gy10 [8. HF]	Gy10 [8. HF]
Nov. 21	E12	Gy11 [9. HF]	Gy11 [9. HF]
Nov. 28	E13	Gy12 [10. HF]	Gy12 [10. HF]
Dec. 5	E14	Gy13 [11. HF]	Gy13 [11. HF]

**Előadás napló**

- 09.05 Bevezető példák. Eseménytér, mértékelmélet, egyszerű állítások. Szita formula.
- 09.12 Feltételes valószínűség, szorzási szabály, Bayes-tétel, függetlenség.
- 09.19 Független kísérletek. Feltételes függetlenség. Diszkrét valószínűségi változók. Binomiális és geometriai eloszlás. Várható érték.
- 09.26 Val. változó függvényének várható értéke. Szórásnégyzet. Várható érték és szórás viselkedése lineáris átskálázásra. Indikátor változó és binomiális eloszlás szórása. Bernoulli Nagy Számok Törvénye. Poisson eloszlás. Binomiális approximációja Poisson-nal. Példák Poisson eloszlásra.
- 10.03 Poisson eloszlás várható értéke, szórása. Poisson folyamat definíciója, példák. Geometriai eloszlás szórása, örökifjúsága. Negatív binomiális eloszlás.  $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$ . Független változókra  $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y$  és  $\mathbb{D}^2(X + Y) = \mathbb{D}^2X + \mathbb{D}^2Y$ . Alkalmazások.
- 10.10 Hipergeometrikus eloszlás. Eloszlásfüggvény és tulajdonságai, példák. Abszolút folytonos valószínűségi változók, sűrűségfüggvény. Folytonos várható érték, szórás. Egyenletes eloszlás.
- 10.15 Bertrand-féle paradoxon. Példa folytonos, de nem abszolút folytonos eloszlásra. Standard normális eloszlás és tulajdonságai. Standardizálás.  $\mu$  várható értékű és  $\sigma$  szórású normális eloszlás.
- 10.17 De Moivre-Laplace tétel lokális és globális alakja, Stirling formula. Alkalmazások. Exponenciális eloszlás; momentumok, örökifjúság, kapcsolat a Poisson folyamattal, geometriai eloszlással. Felezési idő, medián.
- 10.24 Eloszlástranszformációk. Standard Cauchy eloszlás. Együttes diszkrét és folytonos eloszlások. Marginális eloszlások. Független valváltozók. Példák.
- 11.07 Buffon-féle tűprobléma. Konvolúció. Független normális eloszlású változók összege, különbsége. Összegek várható értéke és szórása, indikátor valváltozók; alkalmazások. Feltételes eloszlások.
- 11.14 Két példa: háromszögön egyenletes eloszlás, illetve  $X \sim UNI[0, 1]$ ,  $Y|X \sim UNI[0, X]$ . Kovariancia és tulajdonságai, kovariancia-mátrix, összegek szórása. Cauchy-Schwartz egyenlőtlenség, korrelációs együttható és jelentése. Feltételes várható érték, toronyszabály és alkalmazásai.

- 11.21 Feltételes szórásnégyzet formula. Véletlen tagszámú összegek. Steiner tétel. Feltételes várható érték, mint becslés. Példa:  $S \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ ,  $R|S \sim \mathcal{N}(S, 1)$ ;  $\mathbb{E}(S|R)$  számítása. Többdimenziós eloszlástranszformációk. Példa:  $(X, Y)$  egyenletes az egységnyezeten,  $U = XY$ ,  $V = Y/X$ .
- 11.28 Többdimenziós normális eloszlás, mint független standard normálisok affin lineáris transzformáltja, kovarianciamátrix, feltételes eloszlások. Markov egyenlőtlenség, Csebisev egyenlőtlenség. Nagy Számok Gyenge Törvénye.
- 12.05 Momentumgeneráló függvény. Centrális Határeloszlás Tétel bizonyítása momentumgeneráló függvénnyel. CHT alkalmazások. Példa egy sorozatra, amely konvergál valószínűségben, de nem konvergál majdnem biztosan. Borel-Cantelli lemmák. Nagy Számok Erős Törvénye.

### Ajánlott irodalom

Az elsődleges forrás, amit az előadások beosztása is viszonylag pontosan követ, a Balázs Márton – Tóth Bálint jegyzet. Más könyvjavaslatokkal együtt a kurzus honlapján megtalálható:  
<http://www.math.bme.hu/~pet/valszam/Vsz2022.html>.

## HF feladatsor témák

Ez csak körülbelüli iránymutató. Az előadás menetétől függően a témák esetleg vándorolhatnak, régebbi témák mindig visszatérhetnek, a fő csapásiránytól eltérő érdekességek fölbukkanhatnak.

1. Alapvető kombinatorika, szita-formula, eseménytér, egyenlő valószínűségű események
2. Feltételes val., Bayes tétel, (feltételes) függetlenség
3. Diszkrét valószínűségi eloszlások 1. Binomiális, geometriai, negatív binom, hipergeom.
4. Diszkrét valószínűségi eloszlások 2. Várható érték és szórás, Poisson eloszlás
5. Poisson folyamat, eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, esetleg egyenletes eloszlás  
(ZH1 itt)
6. Egyenletes eloszlás, normális eloszlás, binomiális és Poisson eloszlás normális approximációja, deMoivre-Laplace
7. Exponenciális eloszlás, Poisson folyamat megint, Cauchy és lognormális eloszlás, eloszlástranszformációk
8. Diszkrét és folytonos együttes eloszlások, többdimenziós eloszlástranszformációk
9. Többdimenziós eloszlástranszformációk, függetlenség és konvolúció, feltételes eloszlások, feltételes várható érték
10. Összegek várható értéke, szórása, kovarianciák, korrelációk, indikátorok összege  
(ZH2 valószínűleg itt)
11. Többdimenziós normális és korrelációi (ez talán átcsúszhat az utolsó gyakra)
12. Utolsó gyakorlaton meglátjuk, lehet csak gyakorlás, vagy kitekintés más témákra, ízlés szerint.

## Házi feladatok

Valószínűségszámítás matematikusoknak és fizikusoknak, 2022 őszi

Minden feladatsoron megjelöljük a *beadandó házi feladatokat*, ezek 1 (•), 2 (••), 3 (•••) vagy 4 (••••) pontot érnek, összesen 10 pont értékben. Természetesen gyakorlásképpen javasoljuk a többi feladat beadás nélküli megoldását is. Egyes heteken szerepelnek bónuszfeladatok, ezek darabonként 3 pontot érnek. Függetlenül a többi feladattól, ezek az adott héten minden esetben beadhatók, és mindig kijavítjuk őket. A házi feladatok beadási határideje az első oldalon szerepel.

Részpontoszámokat adunk, de válaszokat csak indoklással fogadunk el. Az *igazi* csoportmunka hasznos, de ebben az esetben mindenki saját maga írja le a megoldást a saját szavaival (képleteivel). A passzív másolás viszont haszontalan: tapasztalatunk szerint az így szerzett házi feladat pontszámok többszörösen elvesznek ZH-kon és a vizsgán, amikor kiderül, hogy a másolt házi feladat nem hozta meg a kívánt fejlődést.

- 1. HF:**
- 1.1 Hányféle (esetleg értelmetlen, de különböző) szót lehet kirakni a MISSISSIPPI betűiből (mindegyik betűt pontosan egyszer felhasználva)? Hát az ABRAKADABRA szó betűiből? Mi annak a valószínűsége, hogy ha felírjuk a betűket egy-egy kártyára, akkor jól megkeverve a paklit, a két szó egymást követve értelmesen kiolvasható lesz (abrakadabramississippi vagy fordítva)?
  - 1.2 **a)** Hányféleképpen ülhet le egy sorban négy lány és három fiú?  
**b)** Hányféleképpen ülhet le egy sorban négy lány és három fiú, ha a lányok egymás mellett ülnek, és a fiúk is egymás mellett ülnek?  
**c)** És ha csak a fiúk kell, hogy egymás mellett üljenek?  
**d)** Hányféleképpen ülhetnek le, ha azonos neműek nem ülhetnek egymás mellé?
  - 1.3 Egy tánciskolába 12 hölgy és 13 úriember jár. Ha 6 hölgyet és 6 úriembert kell kiválasztanunk és párba rendeznünk, hányféle elrendezés lehetséges?
  - 1.4 Egy társaság 8 nőből és 7 férfiből áll. Belőlük kell egy 4 nőből és 3 férfiből álló bizottságot alakítanunk. Hányféle különböző bizottság lehetséges, ha

- a) van két férfi, akik nem hajlandóak egy bizottságban dolgozni,  
 b) van két nő, akik nem hajlandók egy bizottságban dolgozni,  
 c) van egy nő és egy férfi, akik nem hajlandóak egy bizottságban dolgozni?
- 1.5 Egy árverésen 4 műgyűjtő vásárolt összesen 5 Dalit, 6 van Goghot, és 7 Picassót. Ha egy tudósító csak annyit jegyez fel, hogy melyik gyűjtő hány Dalit, van Goghot, és Picassót vásárolt, akkor hányféle különböző feljegyzés születhet?
- 1.6 a) Tekintsük a következő kombinatorikus azonosságot:

$$\sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}.$$

Adjunk egy *részletes* kombinatorikai érvelést a fenti egyenlőség igaz voltára oly módon, hogy  $n$  emberből kiválasztunk egy tetszőleges létszámú bizottságot és annak elnökét, illetve az elnököt és hozzá a bizottságot.

- b) Ellenőrizzük a

$$\sum_{k=1}^n k^2 \binom{n}{k} = n(n+1) \cdot 2^{n-2}$$

azonosságot  $n = 1, 2, 3, 4$  esetén. Ismét adjunk *részletes* kombinatorikai érvelést az azonosságra:  $n$  emberből válasszunk egy tetszőleges méretű bizottságot, annak elnökét és titkárát (ez a kettő lehet egy személy is), illetve

- válasszunk egy elnököt, aki egyben a titkár is lesz, majd a bizottság többi tagját,
- válasszunk egy elnököt, egy tőle különböző titkárt, majd a bizottság többi tagját.

- c) A fentiekhez hasonlóan mutassuk meg, hogy

$$\sum_{k=1}^n k^3 \binom{n}{k} = n^2(n+3) \cdot 2^{n-3}.$$

- 1.7 Egy 100 000 lakosú városban három újság jelenik meg: I, II, és III. A városlakók következő aránya olvassa az egyes újságokat:

I: 26%	I és II: 6%	I és II és III: 2%
II: 18%	I és III: 9%	
III: 22%	II és III: 5%	

(Azaz például 6000 ember olvassa az I és II újságokat (közülük 2000 a III újságot is).)

- a) Határozzuk meg, hányan nem olvassák a fenti újságok egyikét sem.  
 b) Hányan olvasnak pontosan egy újságot?  
 c) Hányan olvasnak legalább kettő újságot?  
 d) Ha I és III reggeli újságok és II egy esti újság, akkor hányan olvasnak legalább egy reggeli újságot plusz egy esti újságot?  
 e) Hányan olvasnak pontosan egy reggeli újságot plusz egy esti újságot?
- 1.8 a) Legyen  $A$  és  $B$  két esemény. Bizonyítsuk be, hogy

$$\text{ha } \mathbf{P}\{A\} \geq 0.8 \text{ és } \mathbf{P}\{B\} \geq 0.6, \text{ akkor } \mathbf{P}\{A \cap B\} \geq 0.4.$$

- b) Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eseményekre fennáll a következő egyenlőtlenség:

$$\mathbf{P}\{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n\} \geq \mathbf{P}\{A_1\} + \mathbf{P}\{A_2\} + \dots + \mathbf{P}\{A_n\} - (n-1).$$

- 1.9 a)  $n$  golyót helyezünk véletlen módon  $k$  urnába. Mi a valószínűsége, hogy *pontosan* egy urna marad üres?  
 b)  $n$  befektetési egységet osztunk szét  $k$  részvény között. Befektetési stratégiáknak nevezzük a befektetési egységek lehetséges kiosztásait, vagyis amikor minden részvényre megadjuk, hogy abba hány egységet fektetünk be. Ha minden befektetési stratégia azonos valószínűségű, mi az esélye annak, hogy pontosan egy olyan részvény lesz, amelybe egyetlen egységet sem fektetünk be?

- 1.10 Egy régi vágású színházban a fogasra akasztják az érkező urak a kalapjaikat. Kifelé menet minden úr véletlenszerűen levesz egy kalapot a fogasról, és távozik. Mi annak a valószínűsége, hogy senki nem megy haza a saját kalapjában? Hogyan viselkedik ez a valószínűség aszimptotikusan amint  $n \rightarrow \infty$ ?
- 1.11 •• Egy sakktábla 64 mezőjére véletlenszerűen, egyenletes valószínűséggel elhelyezünk nyolc bástyát; egy mezőre csak egy bástya kerülhet. Mennyi a valószínűsége, hogy egyik bástya sem üti a másikat (azaz semelyik sor és semelyik oszlop nem tartalmaz egynél több bástyát)?
- 1.12 a) Hatszor feldobunk egy szabályos dobókockát. Mi a valószínűsége, hogy az 1, 2, ..., 6 eredmények mindegyike előfordul?  
 b) Tízszor feldobunk egy szabályos dobókockát. Mi a valószínűsége, hogy az 1, 2, ..., 6 eredmények mindegyike (legalább egyszer) előfordul?
- 1.13 •• András, Béla és Csaba ultiznak: ebben a játékban a 32 lapos magyar kártyából 10 lapot osztanak mindhárom játékosnak, a fennmaradó két lap a talonba kerül. Minden leosztást egyformán valószínűnek feltételezve, mi az esélye, hogy Andrásnak a nyolc figura egyikéből sem kerül mind a négy szín? (Azaz: Andrásnak nincs se négy hetese, se négy nyolcasa... se négy ásza)?
- 1.14 Egy közösségben 20 család van: 5 családban egy gyerek van, 7 családban kettő, 4 családban három, 3 családban négy, 1 családban öt.  
 a) Ha egy családot véletlenszerűen kiválasztunk, mi a valószínűsége, hogy abban a családban  $i$  gyerek van,  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ?  
 b) Ha egy gyereket véletlenszerűen kiválasztunk, mi a valószínűsége, hogy ő egy  $i$  gyerekes családból jött,  $i = 1, 2, 3, 4, 5$ ?
- 1.15 Egy erdőben 18 őz lakik, közülük 5 meg van jelölve. Ha véletlenszerűen 4-et befognak, mi a valószínűsége, hogy a befogottak közül pontosan 2 megjelölt lesz?
- 1.16 Számoljuk ki a poker különböző értékelhető konfigurációinak valószínűségeit. Azaz 52 lapos francia kártyából ( $\clubsuit, \diamond, \heartsuit, \spadesuit : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, D, K, A$ ) véletlenszerűen kiválasztunk ötöt. Mi annak a valószínűsége, hogy egy párunk, két párunk, drillünk, sorunk, flush-ünk, fullunk, pókerünk, színsorunk, royal flush-ünk van?
- 1.17 A bridzsben az 52 lapos francia kártyából minden játékos 13–13 lapot kap. Mi a valószínűsége annak, hogy Északnak és Délnek *együttesen*  $k$  db ásza van ( $k = 0, 1, 2, 3, 4$ )?
- 1.18 Egy kisvárosban pontosan négy TV-szerelő dolgozik. Egy napon négyen hívnak szerelőt. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $i$  szerelő kap hívást  $i = 1, 2, 3, 4$ ?
- 1.19 Egy kisvárosban  $n$  TV-szerelő dolgozik. Egy napon  $k$  helyre hívnak szerelőt. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $i$  szerelő kap hívást  $i = 1, 2, \dots, n$ ?
- Bónusz: Jelölje  $f_n$  azt a számot, ahány  $n$  hosszú fej-írás sorozat van úgy, hogy nincs bennük egymás utáni két fej. Jelölje  $P_n$  ennek az eseménynek a valószínűségét szabályos érmedobás esetén.  
 a) Mutassuk meg, hogy  $n \geq 2$ -re  $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ , ahol  $f_0 = 1, f_1 = 2$ . (Hány ilyen sorozat indul fejjel, és hány írással?)  
 b) Határozzuk meg  $P_n$ -t  $f_n$  segítségével, és ezek alapján számoljuk ki  $P_{10}$  értékét.  
 c) Mutassuk meg, hogy  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = 0$  és határozzuk meg a  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P_n}{P_{n-1}}$  határértéket.
- 1.20 Egy urnában van 6 piros, 6 fehér, és 7 kék golyó. Ötöt visszatevés nélkül húzva mi a valószínűsége, hogy mindhárom színű golyót húztunk?
- 1.21 Anna, Bori és Cili egyforma erejű pingpongjátékosok. A következő módon játszanak: Anna és Bori mérik először össze az erejüket. Ezután a vesztes kiáll, és a várakozó Cili áll be a helyére, hogy összemérje tudását az előző nyertessel... Minden egyes meccs után a vesztes átadja a helyét a várakozónak. Ezt mindaddig folytatják, amíg nem nyer valamelyikük kétszer egymás után, ő lesz a körmérkőzés győztese. Írjuk le a körmérkőzés eseményterét. Az  $n$  páros csata után véget érő sorozatok valószínűsége legyen  $2^{-n}$ . (Miért?) Mi a valószínűsége annak, hogy Anna, ill. Bori, ill. Cili nyeri a körmérkőzést?
- 1.22 •• Anna, Bori és Cili most érmét dobálnak, felváltva egymás után, Anna kezd, majd Bori dob, aztán Cili, majd megint Anna, és így tovább. Ezt mindaddig folytatják, míg valaki fejet nem dob.  
 a) Írjuk le az eseményteret!  
 b) Írjuk le az alábbi eseményeket az eseménytéren:  $A = \{ \text{Anna nyer} \}, B = \{ \text{Bori nyer} \}, (A \cup B)^c$  !

- 1.23 A lóversenyen 7 ló indul. Jelölje  $C$  azt az eseményt, hogy Csillag az első három hely valamelyikén ér be,  $R$  pedig azt, hogy Ráró a 2. helyen végez. Mennyi  $C \cup R$  valószínűsége? Hány elemi eseményt tartalmaz  $C \cup R$ ?
- 1.24 Kiosztunk egy pakli jól megkevert francia kártyát. Mi a valószínűsége, hogy
- a pikk ász a 14. kiosztott lap?
  - az első kiosztott ász a 14.-ként kiosztott lap?
  - az első négy lap különböző színű?
  - az első négy lap különböző figurájú?
- 1.25 Van két kockánk, amelyeket azonos módon színeztünk ki: két lapot pirosra, kettőt zöldre, egyet pedig sárgára, a maradék fehér. Ha feldobjuk őket egyszerre, mi a valószínűsége, hogy ugyanolyan színűre esnek? Mi a valószínűsége annak, hogy az első két feldobásra különböző színűek lesznek, majd harmadszorra ugyanolyanok?
- 1.26 •• A rulettkeréken 37 mező van, ezek közül 18 fekete, 18 piros és 1 zöld. Tekintsünk 13 rulettpörgetést, mi a valószínűsége, hogy ennek során mind a három szín (piros, fekete, zöld) legalább egyszer előfordul?
- 1.27 •• Van 10 mentolos és 10 citromos cukorkánk, ezt a 20 cukrot véletlenszerűen elosztjuk Anna és Bea között. Ha mindkét lány 10 cukrot kap, mi a valószínűsége, hogy
- mind a 10 mentolos cukrot Anna kapja?
  - mindkét lány pontosan 5 mentolos és pontosan 5 citromos cukrot kap?
- 1.28 Egy szekrényben  $n$  pár cipő van. Véletlenszerűen kiválasztunk  $2r$  cipőt ( $2r \leq n$ ). Mi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott cipők között
- nincsen teljes pár,
  - pontosan egy teljes pár van,
  - pontosan két teljes pár van?
- 1.29 6 férfit és 6 nőt véletlenszerűen két azonos létszámú csoportba osztunk. Mi a valószínűsége, hogy a két csoportban 3–3 nő, illetve férfi lesz?
- 1.30 A bridzs játékban a négy, égtájakkal azonosított játékos mindegyikének 13 lapot osztanak ki egy 52 lapos francia kártyából. Számoljuk ki annak valószínűségét, hogy egy bridzseosztásban Északnak semmilyen értékből se legyen meg mind a négy kártyája (azaz ne legyen se négy 2-e, se négy 3-a,....., se négy  $K$ -a, se négy  $A$ -a).

## 2. HF:

- 2.1 Feldobunk négy szabályos dobókockát .
- Mennyi a valószínűsége annak, hogy legalább az egyik kockán hatos van?
  - Feltéve, hogy a dobott számok között nincs két egyforma, mennyi a valószínűsége annak, hogy legalább az egyikén hatos van?
- 2.2 •• Egy piros, egy kék, és egy sárga szabályos kockával dobunk. Legyen az általuk mutatott három szám rendre  $P, K, S$ .
- Mi a valószínűsége, hogy mindhárom dobás különböző?
  - Feltéve, hogy mindhárom dobás különböző, mi a valószínűsége, hogy  $P < K < S$ ?
  - Mennyi  $\mathbf{P}\{P < K < S\}$ ?
- 2.3 A barátommal snapszerozom. Ebben a játékban 20 kártyalap van, minden színből 5. Kiosztunk 5 – 5 lapot.
- Még nem néztem meg a lapjaimat. Mi a valószínűsége, hogy a barátomnak van zöldje?
  - Megnéztem a lapjaimat: két pirosat és három zöldet kaptam. Mi a valószínűsége, hogy a barátomnak van zöldje?
- 2.4 Vigyázat! Ebben a feladatban attól függően, milyen kísérlettel modellezzük a „véletlenszerű én” és a „véletlenszerű király” kiválasztását, különböző eredményeket kaphatunk. A megoldás része pontosan leírni azt is, hogy milyen kísérletben gondolkodunk és milyen feltevésekkel élünk.
- Én kétgyerekes családból származom. Mi a valószínűsége, hogy a testvérem lány?

- b) A király kétgyerekes családból származik. Mi a valószínűsége, hogy a testvére lány?
- 2.5 Két golyó mindegyike egymástól függetlenül  $1/2$ - $1/2$  valószínűséggel feketére vagy aranszínűre lett festve, majd egy urnába helyezték őket.
- a) Tegyük fel, hogy tudomásunkra jut, hogy az aranszínű festéket használták, azaz legalább az egyik golyó aranszínű lett. Ekkor mi a feltételes valószínűsége, hogy mindkét golyó aranszínű?
- b) Most tegyük fel, hogy az urna megbillent, az egyik golyó kigurult belőle, és azt látjuk, hogy ez a golyó aranszínű. Ekkor mi a valószínűsége, hogy mindkét golyó aranszínű?
- Magyarázzuk meg a válaszunkat.
- 2.6 Egy internetes közösségi száj felhasználói körébe meghívásos alapon lehet bejutni. Eredetileg két tagja van a közösségnek, Ádám és Éva. Néha a közösség valamelyik (egyenletesen választott) tagja meghív egy új embert. Ádám köréhez tartozik valaki, ha ő maga Ádám, vagy egy Ádám köréhez tartozó tag hívta meg. Mi a valószínűsége, hogy Ádám köre 1, 2 illetve 3 főből áll akkor, amikor 4 fős a közösség?
- 2.7 •• Egy népszerű egyetemi szakra három fordulóban felvételiztetnek. Az első forduló egy alkalmassági vizsga, erről hazaküldik a jelentkezők 70%-át, a többiek továbbjutnak a következő fordulóba, ami egy írásbeli teszt. Az írásbeli teszten résztvevők 75%-át szórják ki, aki ezt az akadályt is sikerrel veszi, egy szóbeli elbeszélgetésen vehet részt, ahol a résztvevők ötödét válogatják be, őket veszik fel a szakra.
- a) A jelentkezők hányad részét veszik fel a szakra?
- b) Valakiről csak annyit tudunk, hogy túljutott az alkalmassági vizsgán. Mi a valószínűsége, hogy fel fogják venni?
- c) Tekintsük mindazokat a jelentkezőket, akiket végül nem vesznek fel a szakra. Hányad részüket szórták ki rendre az alkalmassági vizsgán, az írásbeli teszten és a szóbeli elbeszélgetésen?
- 2.8 Három szakács,  $A$ ,  $B$  és  $C$ , egy speciális süteményt sütnek, melyek azonban sajnos rendre 0.02, 0.03, 0.05 valószínűséggel nem kelnek meg rendesen a három szakács keze alatt. Az étteremben ahol dolgoznak,  $A$  süti a sütemények 50%-át,  $B$  a 30%-át,  $C$  pedig a 20%-át. A rossz sütemények hány százalékát sütötte  $A$ ?
- 2.9 •• A csavarokat 12 darabos csomagokban árusítják. Az üzletben kapható csomagok 80%-ában nincs hibás csavar, 15%-ában pontosan egy hibás csavar van, 5%-ában pontosan két hibás csavar van. A hibás csavarok helye a csomagban véletlenszerű. Veszek egy csomag csavart az üzletben és bosszankodva tapasztalom, hogy az első csavar, amit kivesszek a csomagból, hibás. Mi a valószínűsége, hogy a csomagban ott lapul még egy hibás csavar?
- 2.10 • Egy doboz édesség krémmel töltött csokoládés bonbonakat tartalmaz, ezek lehetnek ét- vagy tejsokisak, a töltelékük pedig kávé- vagyogyorókrém. A dobozban 6 kávékrémmel töltött étcsoki, 9ogyorókrémmel töltött étcsoki és 14 kávékrémmel töltött tejsoki van. Hányogyorókrémmel töltött tejsoki van a dobozban, ha tudjuk, hogy a csokoládé fajtája (ét- vagy tejsoki) és a töltelék egymástól függetlenek?
- 2.11 Egy genetikai rendellenesség a magzatok fél százalékát érinti. Egy „megbízhatónak számító” diagnosztikai eljárás a meglévő rendellenességet biztosan detektálja, míg rendellenesség hiányában 95% valószínűséggel a helyes negatív választ adja, 5% valószínűséggel pedig a hibás pozitív választ. Ha az eljárás eredménye pozitív, mi a valószínűsége, hogy magzatunknak tényleg megvan a rendellenessége?
- 2.12 Tegyük fel, hogy szabályos fej-írás dobást szeretnénk generálni, de csak egy cinkelt érme áll rendelkezésünkre, amely általunk ismeretlen  $p$  valószínűséggel mutat fejet. Tekintsük a következő eljárást.
- (a) Feldobjuk az érmét.
- (b) Megint feldobjuk az érmét.
- (c) Ha mindkét dobás eredménye fej, vagy mindkét dobás eredménye írás, akkor újakezdjük az első lépéssel.
- (d) Ha viszont a két dobás eredménye különböző, akkor az utolsó eredmény lesz az algoritmus kimenete.
- a) Mutassuk meg, hogy az algoritmus egyforma valószínűséggel szolgáltat fejet vagy írást.
- b) Lehetne-e úgy egyszerűsíteni az eljárást, hogy addig dobjuk az érmét, amíg két egymást követő dobás különböző lesz, és az utolsó dobást tekintjük?
- 2.13 Egy  $n$  elemű halmazból az  $A$  és  $B$  véletlen részhalmazokat egymástól függetlenül egyenletes eloszlással választjuk ki a  $2^n$  lehetséges részhalmaz közül.
- a) Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{A \subseteq B\} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ . (Tipp: tekintsük az eredeti halmaz minden egyes elemét.)

b) Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{A \cap B = \emptyset\} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$ .

2.14 ••• Vizsgáljuk meg az alábbi példákban, hogy a megadott  $A$ ,  $B$  és  $C$  események függetlenek-e (i) páronként; (ii) teljesen.

a) Egy szabályos érmét kétszer feldobunk. Legyen  $A$  az az esemény, hogy az első dobás eredménye fej,  $B$  az az esemény, hogy a második dobás eredménye fej, és  $C$  az az esemény, hogy a két dobás eredménye egyezik.

b) Feldobunk egy szabályos dobókockát, legyen  $A$  az az esemény, hogy a dobás eredménye 3-nál nem nagyobb,  $B$  az az esemény, hogy a dobás eredménye 3-nél nem kisebb, és  $C = A$ .

c) Egy urnában 1-től 42-ig számozott golyók vannak és ezekből húzunk egyet. Legyen  $A$  az az esemény, hogy a húzott golyó sorszáma páros,  $B$  az az esemény, hogy a húzott golyó sorszáma hárommal osztható, és  $C$  az az esemény, hogy a húzott golyó sorszáma héttel osztható.

2.15 Adott egy  $n$  fős társaság. Jelölje  $A_{i,j}$ ;  $1 \leq i < j \leq n$  azt az eseményt, hogy a társaság  $i$ -dik és  $j$ -dik tagjának ugyanaz a születésnapja.

a) Páronként független-e ez az  $\binom{n}{2}$  esemény?

b) Teljesen független-e ez az  $\binom{n}{2}$  esemény?

2.16 Az időjárás-előrejelzés egyszerű modelljeként tegyük fel, hogy az idő vagy esős, vagy napos, és  $p$  annak a valószínűsége, hogy holnap ugyanolyan lesz mint ma, a korábbi napoktól függetlenül. Ha az idő napos január elsején, legyen  $P_n$  annak valószínűsége, hogy  $n$  nap múlva szintén napos. Mutassuk meg, hogy  $P_n$  kielégíti a

$$P_n = (2p - 1)P_{n-1} + (1 - p), \quad n \geq 1; \quad P_0 = 1$$

rekurziót. Bizonyítsuk be, hogy  $P_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(2p - 1)^n$  minden  $n \geq 0$  esetén.

2.17 Móricka élete első valószínűségi számítás vizsgáján  $\frac{1}{2}$  eséllyel megy át. Ha ezen megbukik, a következőre már kevesebbet tanul, ezen csak  $\frac{1}{3}$  a siker valószínűsége. Minél többször bukik meg, annál kevesebbet tanul, így  $k - 1$  sikertelen vizsga után már csak  $\frac{1}{k+1}$  az esélye, hogy a  $k$ -dik vizsgán átmegy. Ám Móricka kitartó, és a szabályzat szerint akárhányszor vizsgázhat. Mennyi a valószínűsége, hogy előbb-utóbb átmegy?

Bónusz Egy vadász 40 méter távolságban felfedez egy rókát és rálő. Ha a róka ezt túléli, akkor 10 m/s sebességgel próbál menekülni. A vadász 2 másodpercenként újratölt és lő a rókára, mindaddig, amíg meg nem öli, vagy (szerencsés esetben) a róka el nem tűnik a látóhatáron. A vadász találati valószínűsége a távolság köbével fordítottan arányos, a következő képlet szerint:

$$\mathbf{P}\{\text{a vadász eltalálja az } x \text{ méter távolságban levő rókát}\} = 10000 \cdot x^{-3} \quad (x \geq 40).$$

Ha találat is éri a rókát, nem biztos, hogy fatális: az egyes találatokat (függetlenül azok számától) a róka  $1/5$  valószínűséggel túléli. Mi a valószínűsége annak, hogy a róka túléli ezt a kellemetlen kalandot?

Megjegyzés: A feladatot nyilván matematikusok találták ki matematikus diákoknak. Miért rossz modellje ez a rókavadászatnak?

2.18 Iszákos Iván a nap  $2/3$  részét kocsmában tölti. Mivel a faluban 5 kocsmában van, és Iván nem válogatós, azonos eséllyel tartózkodik bármelyikben. Egyszer elindulunk, hogy megkeressük. Négy kocsmát már végigjártunk, de nem találtuk. Mi a valószínűsége annak, hogy az ötödikben ott lesz?

2.19 Móricka és Pistike pingpongoznak. Minden játszmát a többitől függetlenül Móricka  $p$ , Pistike pedig  $q$  valószínűséggel nyer meg, ahol  $p > 0$ ,  $q > 0$  és  $p + q = 1$ . A játék akkor ér véget, ha valaki két egymás utáni játszmát megnyer.

a) Mi a valószínűsége, hogy Móricka nyeri az utolsó játszmát?

b) Mi a valószínűsége, hogy ugyanaz nyeri az első játszmát, mint az utolsót?

c) Ha tudjuk, hogy az utolsó játszmát Móricka nyerte, mennyi a valószínűsége, hogy az első is?


2.20 Egy televíziós vetélkedőben a játékosnak három ajtó közül kell választania, és a mögötte elrejtett nyereményt kapja jutalmul. Az egyik ajtó mögött egy luxusautó található, a másik kettő mögött pedig egy-egy kecske. Mikor a játékos kiválasztott egyet a háromból, a játékvezető a másik két ajtó közül kinyit egyet, ami mögött kecske van, és felajánlja, hogy a játékos még megváltoztathatja a döntését. Érdemes-e áttérni a másik ki nem nyitott ajtóra? Mekkora valószínűséggel nyerjük meg így az autót?



- 2.21  $n$  dobozban elhelyezünk  $N$  golyót úgy, hogy mind az  $n^N$  elhelyezés egyenlően valószínű. Feltéve, hogy egy adott dobozba esik golyó, mennyi a valószínűsége annak, hogy  $K$  golyó esik bele?
- 2.22 Aladár, Béla, Cili és Dömötör hazudósak: átlagosan az esetek  $2/3$ -ában hazudnak mind a négyen, egymástól függetlenül, véletlenszerűen.  
*Aladár azt állítja, hogy Béla tagadja, hogy Cili azt mondta, hogy Dömötör hazudott.*  
 Mi a valószínűsége annak, hogy Dömötör igazat mondott? (Feltételezzük, hogy Aladár tudja, hogy mit mondott Béla, Béla tudja, hogy mit mondott Cili, Cili tudja, hogy mit mondott Dömötör. Továbbá, hogy Cili azt is el tudja dönteni, hogy Dömötör hazudott-e vagy sem.)
- 2.23 Adott egy (végtelen térfogatú) urnánk és végtelen sok, az  $\mathbb{N}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$  elemeivel számozott, golyónk. Az urna eredetileg üres. Éjfél előtt egy perccel fogjuk az  $1, 2, \dots, 10$  számú golyókat, behelyezzük őket az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzunk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. Éjfél előtt fél perccel fogjuk a  $11, 12, \dots, 20$  számú golyókat, behelyezzük őket is az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzunk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. Éjfél előtt  $2^{-n}$  perccel fogjuk az  $10n + 1, 10n + 2, \dots, 10(n + 1)$  számú golyókat, behelyezzük őket is az urnába, az urnát jól összerázzuk, majd véletlenszerűen kihúzzunk az urnából egy golyót, amit elhajítunk. És ezt így folytatjuk éjfélig. Bizonyítandó, hogy éjfélkor az urna  $1$  valószínűséggel üres lesz.

### 3. HF:

- 3.1 Alább egy áramkör, ahol mindegyik kapcsoló egymástól függetlenül  $1/2 - 1/2$  valószínűséggel van nyitva vagy zárva.



Mi a valószínűsége, hogy  $A$ -tól  $B$ -ig áram folyhat ezen az áramkörön? (Ezért itt külön nem jár pont, de érdekes: válaszoljunk számolás nélkül is, szimmetriák segítségével! (Persze ha valaki így pontosan leírja, az is teljes értékű megoldás.))

- 3.2 50 százalék az esélye, hogy a királynő hordozza a hemofiliáért felelős gént. Ha hordozó, akkor mindegyik hercegnek 50-50 százalék az esélye arra, hogy hemofiliás legyen. Ha a királynő három fia nem hemofiliás, mekkora az esélye annak, hogy a királynő hordozó? Ha születik egy negyedik herceg is, mekkora az esélye annak, hogy hemofiliás lesz?
- 3.3 4 férfit és 6 nőt rangsorolnak egy vizsgán. Tegyük fel, hogy nincs két egyforma pontszám, és mind a 10! elrendezés egyformán valószínű. Legyen  $X$  a legjobb nő helyezése (például  $X = 1$  azt jelenti, hogy a legjobb vizsgázó egy nő). Határozzuk meg  $X$  eloszlását és várható értékét.
- 3.4 Öt játékos,  $A, B, C, D, E$  között véletlenszerűen szétosztjuk a számokat 1-től 5-ig, ismétlődés nélkül. Először  $A$  és  $B$  mérkőzik: akinek magasabb a száma, továbbjut. Az így továbbjutó most  $C$ -vel mérkőzik, azután a közülük továbbjutó  $D$ -vel, majd az itt nyertes  $E$ -vel. Legyen  $X$  az a szám, ahány mérkőzést  $A$  nyer. Határozzuk meg  $X$  eloszlását és várható értékét.
- 3.5 Szindbádnak egyszer megadatott, hogy  $N$  háremhölgy közül kiválassza a legszebbet a következő játékszabály szerint: az  $N$  háremhölgy egyenként vonult el előtte, azok valamelyikét kellett kiválasztania. A már elvonultak nem hívhatók vissza és azokról, akik még nem vonultak el, semmit sem tudott. Feltételezzük, hogy a háremhölgyeknek jól definiált szépségfokozatuk van: van egy legszebb, egy második legszebb, egy harmadik legszebb, és végül a legkevésbé szép közöttük. Továbbá azt is feltételezzük, hogy véletlen sorrendben vonulnak el Szindbád előtt: mind az  $N!$  lehetséges sorrendjük egyformán valószínű.  
 Szindbád a következő stratégiát választotta:  $k$  hölgyet hagyott elvonulni, majd ezután kiválasztotta azt, amelyik szebb volt az összes előtte már elvonultnál (és ha ilyen hölgy nem akad, akkor Szindbád magányosan távozik). Mi a valószínűsége annak, hogy ezzel a módszerrel valóban a legszebb háremhölgyet választotta? Határozzuk meg azt a  $k$ -t, amely mellett a fenti stratégia optimális  $N \rightarrow \infty$  határesetben, és a stratégiához tartozó valószínűséget is. (Tipp: használjunk teljes valószínűség tételt aszerint, hogy a legszebb hölgy hanyadikként jön(ne) el Szindbád előtt.)

- 3.6 Egy családban  $n \geq 1$  gyermek  $\alpha p^n$  valószínűséggel van, ahol  $\alpha \leq (1 - p)/p$ .
- A családok hányadrésében nincs gyermek?
  - Ha a gyermekek egymástól függetlenül egyforma eséllyel fiúk és lányok, akkor a családok hányadrésében lesz pontosan  $k$  fiú (és tetszőleges számú lány)?
- 3.7 Van két ránézésre megkülönböztethetetlen érménk, egy igazságos és egy cinkelt. A cinkelt érme  $\frac{3}{4}$  valószínűséggel ad fejet. Előveszem az egyik érmét a zsebemből,  $\frac{1}{2}$  eséllyel az igazságosat,  $\frac{1}{2}$  eséllyel a cinkeltet, és feldobom 30-szor, ebből  $k$  alkalommal esett a Fej oldalára. Ez alapján kell eldöntennem, hogy melyik érmét választottam. Milyen  $k$  értéknél húznánk meg a határt?
- 3.8 Az  $\alpha$  kockának 4 piros és 2 fehér, míg a  $\beta$  kockának 2 piros és 4 fehér lapja van. Feldobunk egy érmét. Ha fej a dobás eredménye, akkor a továbbiakban az  $\alpha$  kockát használjuk, ha pedig írás akkor a  $\beta$ -t. Az így kiválasztott kockával egymásután  $n$ -szer dobunk.
- Mi annak a valószínűsége, hogy a  $k$ -adik dobásnál az eredmény piros? ( $k = 1, 2, \dots, n$ )
  - Feltéve, hogy mind az első  $k - 1$  kockadobás eredménye piros, mi annak a valószínűsége, hogy a  $k$ -adik dobás eredménye is piros lesz? ( $k = 1, 2, \dots, n$ )
- 3.9 Adott  $m + 1$  urna és mindegyikben  $m$  golyó; az  $i$ -dik urnában  $i - 1$  golyó piros, míg a fennmaradó  $m - i + 1$  golyó kék ( $i = 1, \dots, m + 1$ ). Először választunk egy urnát egyenletes eloszlással, majd onnantól kezdve ebből az urnából húzunk *viszatevéssel*  $n$  alkalommal.
- Mi a valószínűsége, hogy az  $n$  húzás mindegyike piros golyót ad?
  - Föltéve, hogy az első  $n$  húzás mind piros golyót adott, mi a valószínűsége, hogy az  $(n + 1)$ -dik húzás is piros lesz?
  - Számoljuk ki a (b) részben kapott valószínűség határértékét, rögzített  $n$ -re, amint  $m \rightarrow \infty$ .
- 3.10 Egy ketyere két különböző okból romolhatott el. Az első ok ellenőrzése  $E_1$  forintba kerülne, és ha valóban az a probléma, akkor a javítása  $J_1$  forint. Hasonlóan, a második ok ellenőrzése  $E_2$  forintba kerül, és ha az a probléma, akkor a javítás  $J_2$  forint. (Ha viszont az először ellenőrzött oknál nincs probléma, akkor a másik lehetséges okot először ellenőriznünk kell, majd javítanunk.) Legyen  $p$  és  $1 - p$  annak valószínűségei, hogy a ketyere az első illetve a második okból romlott el. Határozzuk meg, mely  $E_1, E_2, J_1, J_2, p$  értékek mellett érdemesebb várhatóan az első okkal kezdeni az ellenőrzést, és melyeknél a második okkal.
- 3.11 •• A Magyar Etikett Intézet felmérése szerint Magyarországon a fiúk két kategóriába oszthatóak: 2/3-uk udvarias, 1/3-uk udvariatlan. Az udvarias fiúk az esetek 90%-ában engedik előre a lányokat az ajtóban, az udvariatlanok viszont csak az esetek 20%-ában. Láttam, hogy Jancsi előre engedte Juliskát, Jutkát viszont nem.
- Mennyi annak a valószínűsége, hogy Jancsi az udvariatlan kategóriába tartozik?
  - Mennyi annak a valószínűsége, hogy ezek után Jancsi Erzsit is előre fogja engedni?
- 3.12 Sárkányföldön az  $n$  fejű sárkány
- $$p_n = \binom{6}{n-1} \cdot 0.7^{n-1} \cdot 0.3^{7-n}$$
- valószínűséggel fordul elő ( $n = 1, 2, \dots, 7$ ). Egy sárkány fejének levágása veszélyes művelet: az ember minden fejét egymástól függetlenül 90% eséllyel tudja levágni, és ha ez nem sikerül, akkor a sárkány megeszi az embert.
- Elém kerül egy sárkány, de a nagy ködben nem látom, hogy hányfejű. Mi az esélye, hogy túlélem a találkozást?
  - Tegyük fel, hogy épp most vágtam le a hatodik fejét, de még mindig nem látom, hogy maradt-e feje. Ilyen helyzetből mekkora valószínűséggel élem túl a harcot?
  - Csata után találkozom a cimborámmal, aki szintén legyőzött egy sárkányt. Ezt figyelembe véve mi a valószínűsége, hogy hétfejűvel volt dolga?
- 3.13 Két dobókockát dobálunk, és mindig az összeget tekintjük. Addig dobunk, míg a két kockán lévő pöttyök összege 7 vagy 11 nem lesz.
- Mi a valószínűsége, hogy amikor megállunk, 7 az összeg?

- b) Lássuk be, hogy a dobások száma és az, hogy mennyi az összeg megálláskor, függetlenek. Azaz, tekintjük a következő eseményeket:

$$A_k = \{k\text{-szor dobunk}\}, k = 1, 2, \dots \quad \text{illetve } B = \{\text{Megálláskor az összeg } 7\};$$

és mutassuk meg, hogy minden  $k \geq 1$  esetén  $A_k$  és  $B$  független események.

- 3.14 Annának és Borinak van két szabályos dobókockája, egy fehér és egy sárga kocka, és a következő szabályok szerint játszanak. Először Anna dob a két kockával, és ha a két kockán ugyanaz a szám áll, ő nyer. Ha Anna dobásakor a két kockán különböző számok állnak, Bori megkapja a kockákat és most ő dob: ha sikerül legalább egy hatost dobnia, ő nyer. Ha nem, akkor az első fordulóban nincs győztes, és megismétlik az eljárást, tehát felváltva dobnak addig, amíg valamelyikük nem nyer.
- a) Jelölje  $X$ , hogy összesen hány fordulóra kerül sor. Adjuk meg  $X$  valószínűség-eloszlását és várható értékét!
- b) Mi a valószínűsége, hogy a teljes játék Anna győzelmével ér véget?
- 3.15 •• Anna és Bori a következőképp játszanak. Először feldobnak egy cinkelt érmét, ami  $p$  valószínűséggel esik a Fej oldalára. Ha a dobás Fej, Anna nyer, Bori fizet neki 100 forintot, és véget ér a játék. Ha Írás, egy szabályos érmét dobnak fel. Ha ez a második dobás Fej, Bori nyer és kap Annától 100 forintot. Ha Írás, megismétlik egyeztet a kísérletet (cinkelt, majd Írás esetén egy szabályos érme feldobása). Ezt folytatják addig, amíg valaki nem nyer.
- a) Hogyan válasszuk  $p$ -t, ha azt szeretnénk, hogy igazságos legyen a játék?
- b) Jelölje  $X$ , hogy hányadik kísérlet alkalmával ér véget a játék (tehát pl. az  $IIIII$  sorozat esetén  $X = 3$ ). Számoljuk ki  $X$  várható értékét.
- 3.16 •• Xavér és Yvett a következő játékot játsszák. Egy urnában van 5 piros és 5 kék golyó. Két golyót húznak, ha a golyók azonos színűek, Xavér fizet Yvetnek 100 forintot, ha a golyók különböző színűek, Yvett fizet Xavérnak  $x$  forintot. Hogyan válasszák  $x$ -t, ha azt szeretnék, hogy igazságos legyen a játék?
- 3.17 Pisti nem tanult semmit a vizsgára, ahol 10 eldöntendő kérdésre kell válaszolnia. Az anyagból valami kevés dereng, így minden kérdésre a többitől függetlenül 60% eséllyel ad helyes választ. A ketteshöz legalább 8 helyes választ kell adnia.
- a) Milyen valószínűséggel megy át Pisti a vizsgán?
- b) Ha Pisti megbukik, a következő vizsgán ismét tanulás nélkül próbálkozik addig, amíg egyszer nem sikerül. Határozzuk meg a próbálkozások számának várható értékét.
- 3.18 •• Amerikában egy esküdtszék elítéli a vádlottat, ha a 12 esküdtből legalább 8 bűnösnek szavazza. Ha minden esküdt  $\theta = 0,9$  valószínűséggel dönt helyesen, akkor mi a valószínűsége a helyes döntésnek? Tegyük fel, hogy a vádlott  $p = 0,65$  valószínűséggel bűnös valójában.
- 3.19 Kaszinóban az alábbi játékot játsszuk: Minden lépésben fogadunk előre az  $i = 1, 2, \dots, 6$  számok valamelyikére, majd feldobnak 3 kockát. Ahányszor kijött a fogadott számunk, annyi petákot kapunk, ellenben fizetnünk kell 1 petákot, ha egyszer sem jött ki a fogadott szám. Fair-e a játék?
- 3.20 Egy  $n$  komponensű rendszer alkatrészei egymástól és a múltjuktól is függetlenül minden nap  $p$  valószínűséggel meghibásodnak, de ezeket esténként kijavítjuk. A rendszer leáll, ha legalább  $k$  alkatrész meghibásodott. Mi annak a valószínűsége, hogy először a  $t$ . napon áll le a rendszer?
- Bónusz Pólya urna: Egy urnában kezdetben  $a$  piros és  $b$  kék golyó van. Minden egyes lépésben kihúzzuk egy golyót, megnézzük, milyen színű, majd őt és egy vele megegyező színű golyót visszateszünk. (Vagyis a golyók száma az urnában minden lépésben eggyel nő). Legyen  $a = 1$  és  $b = 2$ . Mi a valószínűsége, hogy a  $t$ . lépés után  $k$  kék golyó van az urnában? ( $k = 1 \dots (t + 1)$ )
- 3.21 Egy vetélkedőn egy házaspár alkot egy csapatot. Amikor a műsorvezetőtől egy eldöntendő kérdést kapnak, mindketten egymástól függetlenül  $p$  valószínűséggel adnának helyes választ. Mi a jobb stratégia:
- a) egyiküket kijelölik, aki a másikra nem hallgatva válaszol a kérdésre, vagy
- b) mindketten gondolkodnak a kérdésen, ha egyetértenek, ezt a választ adják, ha pedig különböző a véleményük, egy szabályos pénzérme feldobásával döntenek el, hogy mit válaszoljanak.
- 3.22 •• Véletlenszerűen elhelyezünk egy királyt egy üres sakktáblára. Mennyi a lehetséges lépései számának a várható értéke?

- 3.23 Egy gép véletlenszerűen választ 1 és 10 közötti számot, amit nekünk kell kitalálni, úgy, hogy kérdéseket teszünk fel, amire a gép igennel vagy nemmel válaszol. Számoljuk ki, várhatóan hány kérdést kell a gépnek feltennünk,
- a) ha csak rákérdezhetünk, azaz azt kérdezzük, hogy „A gondolt szám  $i$ ?”  $i = 1, 2, \dots, 10$ , illetve
  - b) ha kérdéseinkkel mindig megpróbáljuk megfelelni a fennmaradó lehetséges számok körét.
- 3.24 **(Szentpétervári paradoxon)** Egy érmevel addig dobunk, míg a fej oldalára nem esik. Ha az  $n$ -edik feldobás eredménye fej, akkor a játékos  $2^n$  forintot nyer. Mutassuk meg, hogy a nyeremény várható értéke végtelen!
- a) Megéri-e egy játékért 1 millió forintot fizetni?
  - b) Megéri-e játékonként 1 millió forintot fizetni, ha annyiszor játszunk, ahányszor csak akarunk, és csak az összes játék befejezése után van elszámolás?
- 3.25 Egy embernek  $n$  kulcsa van, amelyek közül egyetlen egy nyit egy bizonyos ajtót. Emberünk véletlenszerűen próbálkozik a kulcsokkal mindaddig, amíg rá nem talál a megfelelő kulcsra. Határozzuk meg a próbálkozások számának várható értékét, ha
- a) a sikertelen kulcsokat nem zárja ki a további próbálkozások során (visszatevéses húzások),
  - b) a sikertelen kulcsokat kizárja a további próbálkozások során (visszatevés nélküli húzások).

#### 4. HF:

- 4.1 •• Legyen  $K \geq 1$  rögzített.  $K$  dobozba helyezünk el  $(K^2 + K)/2$  golyót úgy, hogy az egyes dobozokba rendre  $1, 2, \dots, K$  golyó kerül. Válasszunk ki véletlenszerűen egy golyót; ekkor jelölje  $X$  azt, hogy összesen hány golyó van abban a dobozban, amelyben a kiválasztott golyó is található. Válasszunk véletlenszerűen egy dobozt, és jelölje  $Y$ , hogy ebben a dobozban hány golyó van.
- a) Mit gondolunk,  $X$  vagy  $Y$  várható értéke nagyobb? Miért?
  - b) Számoljuk ki  $\mathbf{E}(X)$ -et és  $\mathbf{E}(Y)$ -t!
  - c) Számoljuk ki  $\mathbf{D}^2(X)$ -et és  $\mathbf{D}^2(Y)$ -t is!

- 4.2  $A$  és  $B$  a következő játékot játssza:  $A$  gondol 1-re vagy 2-re, ezt leírja, majd  $B$ -nek ki kell találnia, melyik számra gondolt  $A$ . Ha az  $A$  által leírt szám  $i$  és  $B$  jól tippelt, akkor  $B$   $i$  egységet kap  $A$ -tól. Ha  $B$  melléfog, akkor ő fizet  $A$ -nak  $\frac{3}{4}$ -t. Ha  $B$  randomizálja tippjét, azaz  $p$  valószínűséggel tippel 1-re és  $1-p$  valószínűséggel 2-re, határozzuk meg nyereménye várható értékét, amennyiben

- a) az  $A$  által leírt szám az 1,
- b) az  $A$  által leírt szám a 2.

Milyen  $p$  érték maximalizálja  $B$  minimális várható nyereményét, és mi ez a maximin érték? (Figyeljük meg, hogy  $B$  várható nyereménye nem csak  $p$ -től függ, hanem attól is, hogy mit csinál  $A$ .)

Tekintsük most az  $A$  játékost. Tegyük fel, hogy ő is randomizálja a döntését, és  $q$  valószínűséggel gondol 1-re. Mennyi  $A$  várható vesztesége,

- a) ha  $B$  1-re tippel, ill.
- b) ha  $B$  2-re tippel?

Mely  $q$  értékkel tudja  $A$  minimalizálni a maximális várható veszteségét? Mutassuk meg, hogy  $A$  maximális várható veszteségének minimuma egyenlő  $B$  minimális várható nyereségének maximumával! Ezt az eredményt hívják minimax tételnek, ami a játékelmélet egyik alapvető eredménye, és általánosan először Neumann János fogalmazta meg. A közös értéket a játék értékének hívják ( $B$  számára).

- 4.3 Minden este több különböző meteorológus jóslja meg, mekkora valószínűséggel fog holnap esni az eső. Hogy megítéljük, mennyire jók a meteorológusok, a következőképpen pontozzuk őket: ha egy meteorológus  $p$  valószínűséggel jóslt esőt, akkor

$$\begin{array}{ll} 1 - (1 - p)^2 & \text{pontot kap, ha valóban esik másnap,} \\ 1 - p^2 & \text{pontot kap, ha nem esik.} \end{array}$$

Ezek után egy rögzített időszakban mérjük az egyes meteorológusok átlagpontszámát, és a legjobb előrejelző a legmagasabb pontszámot kapott meteorológus lesz. Tegyük fel, hogy az egyik meteorológus tudja ezt, és maximalizálni szeretné átlagát. Ha azt gondolja, hogy  $p^*$  valószínűséggel fog esni holnap, mekkora  $p$  értéket érdemes jelentenie?

- 4.4 Egymás után tízszer dobunk egy szabályos érmével. Legyen  $X$  az egymás utáni egyforma kimenetelekből álló sorozatok száma, vagyis pl. csupa fej esetén  $X = 1$ , a  $FFIIIFIFFF$  sorozatnál pedig  $X = 5$ . Határozzuk meg  $X$  eloszlását.
- 4.5 Egy csütörtöki buliba az  $n$  meghívott mindegyike a többiekétől függetlenül  $1/2$  valószínűséggel jön el. Mennyi a valószínűsége, hogy a meghívottak legalább fele eljön? És, ha a hónap négy csütörtökjén szervezek bulit, mennyi annak a valószínűsége, hogy lesz legalább kettő, amin elegenden leszünk (azaz a meghívottak legalább fele eljön)?
- 4.6 Két kockával (egyik piros, másik zöld) dobva, mennyi a dobott számok maximumának ill. minimumának várható értéke? Dobtam a két kockával, háromszor: az egyik kockát, a pirosat mindig meglestem, hihetetlen, de mindháromszor 3-as szerepelt rajta. Mi a valószínűsége, hogy legalább egyszer nagyobb volt, mint a zöldön lévő, éppen akkor dobott szám?
- 4.7  $n$  darab  $k$ -lapú „kockával” dobva mennyi a dobott számok maximumának ill. minimumának várható értéke? Vizsgáljuk a várható értékekre kapott kifejezések asszimptotikáját rögzített  $n$  mellett, amint  $k \rightarrow \infty$ .
- 4.8 ••

- a) Háromszor dobunk egy hamis érmével, amin a fej valószínűsége  $4/5$ . Jelölje  $U$  azt a számot, ahányszor sikerül az előző dobást megismételni. (Így  $U$  értéke 0, 1 vagy 2 lehet.) Számoljuk ki  $U$  várható értékét és szórását!
- b) Tizenkétszer dobunk egy hamis érmével, amin a fej valószínűsége  $5/6$ . Minden Írás eredmény után fizetnünk kell 800 Ft-t, viszont minden Fej eredmény után kapunk 500 Ft-t. Számoljuk ki a nyereségünk várható értékét és szórását!

4.9 Legyen  $\mathbf{E}(X) = 1$  és  $\mathbf{D}^2(X) = 5$ , számoljuk ki

- a)  $\mathbf{E}(2 + X)^2$ -t és  
b)  $\mathbf{D}^2(4 + 3X)$ -t.

4.10  $N$  egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó, melyre  $\mathbf{E}(N) < \infty$ . Mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{E}(N) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(N \geq i).$$

(Tipp:  $\sum_{i=1}^{\infty} \mathbf{P}(N \geq i) = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=i}^{\infty} \mathbf{P}(N = k)$ . És most szummacsere!)

4.11 ••  $N$  egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó, melyre  $\mathbf{E}(N^2) < \infty$ . Mutassuk meg, hogy

$$\sum_{i=1}^{\infty} i \mathbf{P}(N > i) = \frac{1}{2} (\mathbf{E}(N^2) - \mathbf{E}(N)).$$

4.12  $N$  egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó, melyre  $\mathbf{E}(N^3) < \infty$ . Mutassuk meg, hogy

$$\sum_{i=1}^{\infty} i^2 \mathbf{P}(N \geq i) = \frac{\mathbf{E}(N^3)}{3} + \frac{\mathbf{E}(N^2)}{2} + \frac{\mathbf{E}(N)}{6}.$$

4.13 Egy  $m$  családból álló közösségben  $n_i$  családban van  $i$  gyerek ( $\sum_{i=1}^r n_i = m$ ). Legyen  $X$  egy véletlenszerűen választott családban a gyerekek száma. Válasszunk ki véletlenszerűen a  $\sum_{i=1}^r i n_i$  gyerek közül egyet; jelölje  $Y$  azt, hogy a kiválasztott gyerek családjában hány gyerek van. Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{E}(Y) \geq \mathbf{E}(X)$ .

- 4.14 6-szor feldobunk egy hamis pénzérmét, ami 70% valószínűséggel ad fejet. Ha tudjuk, hogy összesen 3-szor lett fej az eredmény, mi a valószínűsége, hogy
- a) az első dobás fej;  
b) az első 3 eredmény rendre  $F, I, I$  (azaz az első fej, a második és a harmadik írás);  
c) az első 3 eredmény rendre  $I, F, I$ ;  
d) az első 3 eredmény rendre  $I, I, I$  volt?

- 4.15 Egy bulvárlapban oldalanként várhatóan 0.2 nyomtatási hiba van. Mi a valószínűsége annak, hogy a következő oldalon
- 0,
  - 2 vagy több hiba van?

Indokoljuk a választ!

- 4.16 Egy havonta megrendezett népszerű nyereményjátékban a legnagyobb nyeremény egy okostelefon. Ennek azonban kicsi a valószínűsége: 100 000 szelvény közül átlagosan 1 nyer telefont. Havonta 300 000 szelvényt vásárolnak.

- Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott hónapban legalább 7 szelvény is okostelefont ér?
- Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott évben legalább 2 hónapban lesz legalább 7 okostelefont érő szelvény?
- Legyen a mostani hónap az  $i$ , mi a valószínűsége annak, hogy először az  $i$ . hónapban lesz legalább 7 okostelefont érő szelvény? ( $i \geq 1$ )

- 4.17 Átlagosan hány mazsolának kell egy sütiben lennie, ha azt kívánjuk elérni, hogy egy véletlenszerűen választott sütiben legalább 0.99 valószínűséggel legyen (legalább egy szem) mazsola?

- 4.18 •• Lovas gátversenyen a lovasok körpályán versenyeznek, és a ló a pályán elhelyezett sok akadály mindegyikét egymástól függetlenül azonos valószínűséggel veri le. Ha 8% annak valószínűsége, hogy a lovas hibátlanul teljesít egy kört, mennyi az esélye, hogy egy körben legalább három akadályt lever?

- 4.19 London központi kerületében bekövetkező autóbalesetek száma száraz napos időben  $\lambda = 10$  paraméterű Poisson-eloszlású, míg nedves esős időben  $\mu = 20$  paraméterű Poisson-eloszlású. Kora novemberben Londonban  $p = 0.6$  valószínűséggel van ronda esős idő (egész nap),  $q = 0.4$  a valószínűsége annak, hogy verőfényes napsütés van (szintén egész nap). Azt olvastam a *Times*-ban, hogy múlt csütörtökön 17 autóbaleset történt London központjában. Mennyi a valószínűsége annak, hogy esett az eső?

- 4.20 Egy nagy virágágyásba sok virágmagot szórunk egyenletesen. Később a virágágyást sok kis egyenlő méretű darabra osztjuk. Azt tapasztaljuk, hogy a kis darabok 10%-ába nem került egyetlen mag sem.

- Hány magot szórtunk ki földdarabonként átlagosan?
- A földdarabok hány százalékában lesz egynél több mag?

- 4.21 •• A falunapon igen rossz minőségű meggyes pitét osztogatnak. A falunapra kilátogatók közül 100 fő pontosan egy szem meggyet, további 40 fő pedig pontosan két szem meggyet talált a sütijében. Ezek alapján becsüljük meg, összesen hány ember kapott meggyes pitét a falunapon.

- 4.22 A "Kocogj velünk!" mozgalom keretében tavaly futóversenyt rendeztek a Duna-kanyarban. A pályát sajnos kullancsal fertőzött területen át vezették. Kiderült, hogy a versenyzők közül 300-an találtak magukban egy, 75-en pedig két kullancsot. Ennek alapján becsüljük meg, hogy körülbelül hányan indultak a versenyen!

Bónusz: Az árokugró versenyfutás szabályai a következők: A futópálya egyenes, és van rajta végtelen sok egyforma árok. Két egyforma képességű versenyző méri össze az erejét árokfutásból, akik fej fej mellett futnak. Egy versenyző egymás után át próbálja ugrani az árkokat, végül egyszer túl kicsit ugrik és beleesik valamelyikbe. Tegyük fel, hogy egy versenyző sohasem fárad el, és az árkokat egymástól függetlenül, egyenként  $2^{-L}$  valószínűséggel tudja átugorni, ahol  $L$  az árok hossza. Ha az egyikük beleesett egy árokba, akkor véget ért a verseny.

- Mutassuk meg, hogy a döntetlen valószínűsége pontosan akkor kisebb  $\varepsilon$ -nál, ha

$$L < \log_2 \left( \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} \right)$$

teljesül.

- Ha döntetlen, akkor visszaküldjük őket a startvonalhoz és újra kezdődik a verseny. Ezt ismétljük egészen addig, amíg győztest nem hirdethetünk. Mekkora legyen  $L$ , ha a versenyzők ugrásainak számának várható értékét akarjuk minimalizálni?

## 5. HF:

- 5.1 Kétten céllövésben versenyeznek, a két versenyző  $p_1$ , illetve  $p_2$  valószínűséggel ér el találatot ( $p_1 < p_2$ ). Az ügyetlenebb kezd, majd felváltva lőnek. Aki először talál, az nyer.

- a) Mennyi a valószínűsége annak, hogy az ügyesebb nyer?
- b) Mennyi a játék várható időtartama, ha percenként egy lövést végeznek?
- c) A várható időtartam azonnal adódik, ha  $p_1 = p_2$  (miért?). Ellenőrizzük le, hogy az előző kérdésre adott válaszuk ebben az esetben az, ami azonnal adódik.

5.2 Legyen  $X$  Binom( $n, p$ ) eloszlású valószínűségi változó. Milyen  $p$  értékre lesz maximális  $\mathbf{P}\{X = k\}$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$ ? Ez arra példa, hogy a statisztikában hogyan becsülik meg  $p$  értékét, ha egy Binom( $n, p$ ) eloszlású valószínűségi változó megfigyelt értéke  $k$ . Ha feltesszük, hogy  $n$  ismert, akkor  $p$ -t azzal a  $\hat{p}$  értékkel becsüljük, amire  $\mathbf{P}\{X = k\}$  maximális. Ezt a módszert hívják **maximum likelihood** becslésnek.

5.3 ••

- a) Jelölje  $X$  egy szabályos kockadobás eredményét. Számoljuk ki  $X$  várható értékét és szórását.
- b) András és Béla a következő játékot játsszák: feldobnak négy szabályos dobókockát; a négy dobás eredményét jelölje rendre  $X_1, X_2, X_3$  és  $X_4$ . András fizet Bélanak  $(X_1 + X_2 - X_3 - X_4)^2$  forintot, Béla pedig Andrásnak  $X_1 + X_2 + X_3 + X_4$  forintot. Melyiküknek kedvez a játék?

5.4 Anna és Bori egyforma erejű teniszjátékosok, minden játszmát, a többi játszmától függetlenül,  $\frac{1}{2}$  valószínűséggel nyerhet meg bármelyikük. A tenisz mérkőzést az a játékos nyeri meg, amelyik előbb elér három játszmagyőzelmet. Jelölje  $X$ , hogy hány játszmából áll a mérkőzés.  $\mathbb{E}X = ?$

5.5 Legyen  $X$   $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{P}\{X = i\}$   $i$  növekedésével először nő, majd monoton csökken, a maximumát a  $i = \lfloor \lambda \rfloor$ -nél veszi fel. (Tipp: tekintsük  $\mathbf{P}\{X = i\}/\mathbf{P}\{X = i - 1\}$ -et.)

5.6 Móricka, ha túrázni megy, minden lépésnél – az előzményektől függetlenül – valamekkora (kicsi) valószínűséggel hasraesik és megüti a térdét, illetve valamekkora (kicsi) valószínűséggel hanyatt esik és megüti a könyökét. Egy 10 kilométeres túrán átlagosan 3-szor szokta megütni a térdét és 2-szer a könyökét. Legfeljebb milyen hosszú túrára engedheti el az anyukája, ha azt akarja, hogy  $\frac{2}{3}$  valószínűséggel térd- és könyöksérülés nélkül járja meg?

5.7 •• Egy forgamas országútszakaszon gyakran szoktak radarozni. Tapasztalatok szerint annak valószínűsége, hogy 10 percen belül lesz olyan autó, amelyik átlépi a sebességhatárt, épp ugyanannyi, mint annak, hogy nem lesz ilyen autó.

- a) Mi a valószínűsége, hogy 25 perc radarozás során (i) pontosan három; (ii) legalább három gyorshajtót mérnek?
- b) Milyen hosszú időre tervezzék a rendőrök a radarozást ahhoz, hogy 98% valószínűséggel fogjanak legalább egy gyorshajtót?

5.8 Egy tábla mogyorós-mazsolás Boci csokiban átlagosan 30 mazsola van. Egy tábla csoki 15 kockából áll. Egy kocka csokiban  $1/2$  valószínűséggel nincsen mogyoródarab.

- (a) Milyen eloszlású lesz az egy tábla csokiban levő mogyoródarabok száma?
- (b) Letörünk 2 kockát és megesszük. Mennyi a valószínűsége, hogy az elfogyasztott csokiban levő mogyoró- és mazsoladarabok együttes száma legalább 2? Adjon minél egyszerűbb formulát válaszként.

5.9 Tegyük fel, hogy egy adott időben történt események száma  $\lambda$  paraméterű Poisson valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy ha minden eseményt  $p$  valószínűséggel számolunk, függetlenül a többi eseménytől, akkor a megszámlolt események száma  $\lambda p$  paraméterű Poisson valószínűségi változó! Emellett adjunk intuitív érvelést arra, hogy miért kell ennek így lennie.

Az előzőek alkalmazására példa: Tegyük fel, hogy egy adott terület uránlelőhelyeinek száma Poi(10) eloszlású véletlen változó. Minden lelőhelyet a többitől függetlenül  $\frac{1}{50}$  valószínűséggel fedeznek fel. Számoljuk ki annak a valószínűségét, hogy (a) pontosan 1, (b) legalább 1 és (c) legfeljebb 1 lelőhelyet fedeznek fel az adott idő alatt.

Bónusz a) Legyen  $X$   $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{P}\{X \text{ páros}\} = \frac{1}{2}(1 + e^{-2\lambda}).$$

- b) Adott egy hamis érménk, mely  $p$  valószínűséggel mutat fejet. Ezt az érmét 0 időpontban feldobjuk, és azt látjuk, hogy fejre esik. Egy  $\lambda$  paraméterű Poisson folyamat által megadott időpillanatokban az érmét újra és újra feldobjuk, míg egyéb időpontokban nem nyúlunk az érméhez. Mi a valószínűsége, hogy  $t$ -kor az érme fejet mutat?

- c) Tegyük fel ismét, hogy az érme 0 időpontban *fej*-et mutat. A Poisson folyamat időpillanataiban ezúttal determinisztikus módon átforgatjuk (ha a fej oldalon áll, akkor az írás oldalra, ha az írás oldalon, a fej oldalra). Mi a valószínűsége, hogy  $t$ -kor az érme fejet mutat?
- 5.10 Egy erdő átlagos sűrűsége: 16 fa 100 m<sup>2</sup>-enként. A fák törzse teljesen szabályos, 20 cm átmérőjű kör alapú henger. Egy puskagolyót lövünk ki célzás nélkül, az erdő szélétől 120 m-re, kifelé az erdőből. Mennyi annak a valószínűsége, hogy eltalálunk egy fatörzset?  
(Tekintsünk el attól az apró zavaró tényezőtől, hogy a fák alapkörének középpontjai min. 20 cm távolságban vannak.)
- 5.11 •• Az önkormányzat Randomvárosban ingyen wifi szolgáltatást biztosít. A wifi hotspot-ok elhelyezése véletlenszerű, sűrűségük 3 hotspot négyzetkilométerenként, hatótávolságuk 50 méter. Épp abban a pillanatban, amikor Móricka elindul otthonról az egyetemre, email-en tájékoztatják a hallgatóságot, hogy ma bombairadó miatt elmarad az oktatás. Móricka nyílegyenes úton megy az egyetemre, útközben 70% valószínűséggel értesül az ingyen wifin keresztül erről a hírről. Milyen messze lakik Móricka az egyetemtől?
- 5.12 Bulgáriában történt, hogy egymás utáni két héten kihúzták pontosan ugyanazokat a nyerőszámokat a lottón. Maradjunk hazai vizeken: a hazai, 90-ből 5-öt húzós lottón
- mi annak a valószínűsége, hogy jövő héten ugyanazokat a számokat húzzák, mint ezen a héten?
  - kicsit enyhítsük a kérdést: mi annak a valószínűsége, hogy a lottó 50 éves történetében (minden héten egy húzást feltételezve, szünet nélkül, évi 52 héttel számolva) valaha előfordul az, hogy két egymás utáni héten ugyanazt az öt számot húzzák?
  - még egy kicsit enyhítsük a kérdést: mi annak a valószínűsége, hogy a lottó 50 éves történetében (minden héten egy húzást feltételezve, szünet nélkül, évi 52 héttel számolva) valaha előfordul az, hogy olyan 5-öst húznak ki, ami már egyszer volt?
- Adjunk numerikus értéket is.
- 5.13 (**Stefan Banach gyufásdoboz-problémája**) Egy szórakozott matematikus vesz két doboz gyufát. Mindkét doboz  $n$  szál gyufát tartalmaz. Egyik dobozt a bal, másikat a jobb zsebébe teszi. Valahányszor pipára akar gyújtani, véletlenszerűen kivesszi az egyik dobozt és abból elhasznál egy szál gyufát. Egyik alkalommal azt veszi észre, hogy az elővett gyufásdoboz már üres. Mi annak a valószínűsége, hogy ekkor a másik dobozban pontosan  $k$  elhasználatlan gyufaszál van még?
- 5.14 András és Béla következő játékot játsszák. András egy szabályos dobókockával dobál. Bélának nem árulja el, hogy hányadik dobásra sikerült először hatost dobnia, de azt elárulja, hogy hányadik dobásra adódott másodszer hatos. Ezek után Béla megtippeli, hogy András hányadik dobásra kapott először hatost. Hogyan érdemes Bélának tippelnie? Ha Béla okosan tippel, milyen valószínűséggel találja el az első hatos sorszámát?
- 5.15 •• Annának és Borinak van egy cinkelt érméje, amely  $\frac{1}{3}$  valószínűséggel esik a Fej oldalára. Ezt felváltva dobálják, Anna kezd. Az nyer, aki a második fejet dobja, tehát pl. Anna: Fej, Bori: Fej esetén Bori nyert.
- Várhatóan hány érmedobás után fejeződik be a játék?
  - Feltéve, hogy Anna nyer, mi a valószínűsége, hogy az első fejet Bori dobta?
- Bónusz • Mekkora valószínűséggel nyer Anna?
- 5.16 Dobókockával addig dobálunk, amíg 1-től 6-ig minden szám legalább egyszer elő nem fordul. Mennyi a szükséges dobások számának várható értéke?
- 5.17 Egy urnában 4 piros és 4 kék golyó van. Véletlenszerűen kiválasztunk 4 golyót. Ha 2 közülük piros és 2 kék, akkor megállunk. Különben visszarakjuk a golyókat az urnába és újra választunk 4 golyót. Az egészet mindaddig folytatjuk, amíg 4 húzott golyóból pontosan 2 piros lesz. Mi a valószínűsége, hogy pontosan  $n$ -szer húzunk?
- 5.18 •• Az országban évente 100 ezer végzős gimnazistának kell pályát választania. Egy gimnazista 0.0001 valószínűséggel próbálkozik azzal, hogy úrhajósnak menjen. Az úrhajós felvételi vizsga kétfordulós, az első a jelentkező fizikai, a második a szellemi rátermettséget méri. Tegyük fel, hogy ezek független tulajdonságok. Az első vizsgán egy jelentkező 20% eséllyel megy át, a másodikon 50% eséllyel.
- Mekkora a valószínűsége, hogy jövőre legfeljebb egy ember megy át az úrhajós felvételi vizsgán?
  - Idén 10 ember ment át a felvételi első fordulóján. Mekkora a valószínűsége, hogy legalább kettőt felvesznek közülük?
  - Tavaly 3 jelentkezőt vettek fel úrhajósnak. Mekkora valószínűsége, hogy 2 ember bukott meg a felvételin?



5.19 Számítsuk ki az  $(1 + X)^{-1}$  valószínűségi változó várható értékét a következő esetekben:

- a) ha  $X$  Binom( $n, p$ ) eloszlású;
- b) ha  $X$  Poi( $\lambda$ ) eloszlású.

(Tipp: integráljunk valami szépet.)

5.20 Legyenek  $p \in (0, 1)$ ,  $n \in \mathbb{N}$  és  $\lambda = pn \in (0, \infty)$  rögzítve. Továbbá:  $a_k := p_{\text{Binom}(n,p)}(k)/p_{\text{Poi}(\lambda)}(k)$ . Bizonyítsuk be, hogy amint  $k = 0, 1, 2, \dots$  növekszik

- a)  $a_k$  először növekszik, majd csökken, és a maximális értékét  $\lfloor \lambda + 1 \rfloor$ -nál éri el.
- b)  $a_k$  először kisebb, mint 1, majd 1 fölé nő, majd újból 1 alá csökken.

5.21 Egy újságkihordó 100 forintért veszi és 150 forintért adja el az újságokat. Az el nem adott lapokat nem vásárolják tőle vissza. Ha az újságokra a napi igény binomiális eloszlású véletlen változó,  $n = 10$   $p = \frac{1}{3}$  értékekkel, körülbelül hány lapot vegyen, ha várható profitját szeretné maximalizálni?

5.22 Egy országban a házaspárok az első fiúig vállalnak gyereket. Mi a nemek aránya ebben az országban? Igaz-e, hogy az egy családban született gyerekek neme független egymástól?

5.23 *Hipergeometriai eloszlás tart a Binomiálshoz*

Madarat gyűrűzünk:  $N$  madárból  $m$  gyűrűzött van. Képzeld el, hogy a madárgyűrűzést évek óta csináljuk, a madárpopuláció is nő, és átlagosan a madarak egy bizonyos hányadát vagyunk képesek befogni. Pontosabban, legyen most  $N \rightarrow \infty$ ,  $\frac{m}{N} \rightarrow p$ ! Bizonyítsuk be, hogy ekkor, ha (fix)  $n$  elemű mintát veszünk a populációból, és  $X$  jelöli a gyűrűzött madarak számát az  $n$  elemű mintában, akkor  $X$  eloszlása binomiálshoz tart, azaz

$$\lim_{N \rightarrow \infty, m/N \rightarrow p} \mathbf{P}(X = i) \rightarrow \mathbf{P}(\text{Bin}(n, p) = i)!$$

5.24 a) Tekintsünk egy 30 fős, véletlenszerűen választott emberekből álló csoportot. Mi a valószínűsége, hogy van a köztük legalább két ember, akiknek ugyanakkor van a születésnapja?

- b) Tekintsünk 200 véletlenszerűen választott embert. Mi a valószínűsége, hogy van köztük legalább egy, akinek ugyanakkor van a születésnapja, mint Mórckának?

Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy a vizsgált emberek közül senki sem született február 29-én.

## 6. HF:

6.1 Tegyük fel, hogy  $X$  eloszlásfüggvénye,  $F$  a következőképpen adott:

$$F(b) = \begin{cases} 0 & \text{ha } b < 0 \\ \frac{b}{4} & \text{ha } 0 \leq b \leq 1 \\ \frac{1}{2} + \frac{b-1}{4} & \text{ha } 1 < b \leq 2 \\ \frac{11}{12} & \text{ha } 2 < b \leq 3 \\ 1 & \text{ha } 3 < b \end{cases}$$

- a) Számoljuk ki  $\mathbf{P}\{X = i\}$ -t,  $i = 1, 2, 3$ .
- b) Mennyi  $\mathbf{P}\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\}$ ?

6.2 Egy rendszer a bekapcsolástól számítva  $X$  hónapig működik. Határozzuk meg  $X$  várható értékét, és annak valószínűségét, hogy a rendszer legalább 5 hónapig működik, ha  $X$  sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \begin{cases} Cxe^{-x/2} & \text{ha } x > 0, \\ 0 & \text{ha } x \leq 0. \end{cases}$$

6.3 Legyen

$$f(x) = \begin{cases} C(3x - x^3) & \text{ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & \text{különben,} \end{cases}$$

és

$$g(x) = \begin{cases} C(3x - x^2) & \text{ha } 0 < x < \frac{5}{2}, \\ 0 & \text{különben.} \end{cases}$$

Lehet-e  $f$  ill.  $g$  sűrűségfüggvény? Ha igen, határozzuk meg  $C$ -t és az  $f$  ill.  $g$  által meghatározott eloszlások várható értékét!

6.4 Az  $A$  és  $B$  konstansok milyen értéke mellett lehetnek eloszlásfüggvények a következő függvények?

a)

$$F(x) = \exp(-Ae^{-Bx});$$

b) •

$$F(x) = A + B \tanh x;$$

c) •

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } -\infty < x \leq 0, \\ \frac{1 + Ax}{B + x} & \text{ha } 0 < x < +\infty. \end{cases}$$

6.5 A  $C$  konstans milyen értéke mellett lehetnek sűrűségfüggvények a következő függvények? Ezekben az esetekben állapítsuk meg a várható értéket, valamint annak valószínűségét, hogy a megfelelő val. változó értéke  $\frac{1}{2}$  és 2 közé esik.

a) •

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot \sin(2\pi x) & \text{ha } 0 \leq x \leq \frac{3}{2}, \\ 0 & \text{különben;} \end{cases}$$

b) •

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot (-x \ln x) & \text{ha } 0 < x \leq 1, \\ 0 & \text{különben;} \end{cases}$$

c)

$$f(x) = \begin{cases} C \cdot x^{-5} & \text{ha } 1 \leq x, \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$$

6.6 Egy benzinkút hetente egyszer kap benzint. Hogyha a heti eladás (ezer literben mérve) egy valószínűségi változó

$$f(x) = \begin{cases} 5(1-x)^4, & \text{ha } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{egyébként} \end{cases}$$

sűrűségfüggvénnyel, akkor mekkora méretű tartály szükséges ahhoz, hogy egy adott héten a benzinkút 0.01-nél kisebb valószínűséggel fogyjon ki a benzintől?

6.7 Tudjuk, hogy minden  $Y$  nemnegatív valószínűségi változóra

$$\mathbf{E}(Y) = \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{Y > t\} dt.$$

Mutassuk meg, hogy egy  $X$  nemnegatív valószínűségi változóra

$$\mathbf{E}(X^n) = \int_0^{\infty} nx^{n-1} \mathbf{P}\{X > x\} dx$$

teljesül. (Tipp: kezdjük azzal, hogy

$$\mathbf{E}(X^n) = \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{X^n > t\} dt,$$

majd cseréljük változót ( $t := x^n$ .)

- 6.8 a) Legyen  $X$  valószínűségi változó várható értéke  $\mu$ , szórásnégyzete  $\sigma^2$ , és a harmadik momentuma is véges. Továbbá legyen  $g$  egy háromszor differenciálható függvény. Ha tudjuk, hogy  $X$  centrált harmadik momentuma elhanyagolható, akkor mutassuk meg, hogy

$$\mathbf{E}(g(X)) \approx g(\mu) + \frac{g''(\mu)}{2}\sigma^2.$$

(Tipp: fejtsük  $g$ -t  $\mu$  körül 3 tagig Taylor sorba, és hanyagoljuk el a megmaradó részt!)

- b) Legyen  $X$  egy  $\lambda$  várható értékű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Mutassuk meg, hogy ha  $\lambda$  tart végtelenhez, akkor

$$\mathbf{D}^2(\sqrt{X}) \approx 0.25.$$

Lepődjünk meg. (Tipp: használjuk fel az előző feladatot  $\mathbf{E}(\sqrt{X})$  közelítésére!)

- 6.9 Legyen  $F(x)$  folytonos eloszlásfüggvény, és  $F(0) = 0$ . Mutassuk meg, hogy

$$G(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } -\infty < x \leq 1, \\ F(x) - F(x^{-1}), & \text{ha } 1 < x < \infty \end{cases}$$

is eloszlásfüggvény. Adjunk valószínűség számítási értelmet a fenti formulának.

- 6.10 Egyenletesen választunk egy pontot a  $(0, 1)$  intervallumból, jelölje ezt  $X$ . Mi annak a valószínűsége, hogy  $X$ ,  $1 - X$  és  $1/2$  háromszöget alkot?

- 6.11 Konstruálható-e olyan folytonos  $g : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$  függvény, amelyre  $\int_0^1 g(x) dx = 1$ ,  $\int_0^1 x \cdot g(x) dx = a$ ,  $\int_0^1 x^2 \cdot g(x) dx = a^2$ ?

Bónusz Ha egy találkozóra  $s \in \mathbb{R}$  perccel korábban érkezem a megbeszéltnél,  $a \cdot s$  petátot fizetek, ha  $s$  percet kések,  $b \cdot s$ -t fizetek. Az utazás a mai kaotikus közlekedési feltételek miatt meglehetősen véletlen ideig tart, melynek sűrűségfüggvénye  $f(x)$ . Mikor induljak, ha a várható költséget szeretném minimalizálni? (Tipp: Írjuk fel a várható költséget integrálalakban és deriváljuk.)

- 6.12 A buszok rendre minden óra egészkor, 15-kor, 30-kor és 45-kor indulnak a megállóból. Ha véletlenszerűen érkezem 7:00 és 7:30 közt, mi annak a valószínűsége, hogy

- 5 percnél kevesebbet várok?
- 8 percnél többet várok?
- Ugyanez a két kérdés, ha 7:08 és 7:38 közt érkezem egyenletesen.
- És ha 7:00 és 7:25 közt érkezem egyenletesen?

- 6.13 A felé a vonatok 15 percnként indulnak 7:00-tól kezdve, míg B felé 15 percnként indulnak 7:05-től kezdve.

- Ha egy utas 7:00 és 8:00 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra, majd felszáll arra a vonatra amelyik hamarabb indul, az esetek hányadrészeben megy A felé, és hányadrészeben B felé?
- És ha az utas 7:10 és 8:10 közötti egyenletes eloszlású időben érkezik az állomásra?
- Mi a helyzet akkor, ha B felé gyakrabban, vagyis 7:05-től kezdve 10 percnként indulnak a buszok? Számoljuk ki az előző két kérdés valószínűségét erre az esetre is!

- 6.14 Egy busz A és B városok között jár, mely városok 100 kilométerre vannak egymástól. Ha a busz lerobban, akkor azt egyenletes eloszlású helyen teszi a két város közötti úton; ilyenkor a legközelebbi szervízről kijönnek a szerelők és megjavítják a buszt a helyszínen. Pillanatnyilag egy buszszerviz található az A városban, egy a B városban, és egy a két város között félúton. Egy javaslat szerint ehelyett gazdaságosabb lenne a három szervizt az A várostól 25, 50, és 75 kilométerre elhelyezni. Egyetértünk-e a javaslattal? Miért? Mi lenne a szervizek legjobb elhelyezése? Milyen értelemben?

- 6.15 •• Egy egység hosszú ropin van egy sódarab az  $s$  helyen. Mire hazaérünk a boltból, a táskánkban véletlenszerűen (egyenletes eloszlással) kettétörjük a ropi a csomagban. Mi a sódarabot tartalmazó ropidarab hosszának várható értéke?

- 6.16 •• Válasszunk egy pontot egyenletes eloszlással egy szabályos háromszög belsejében, mely háromszögnek minden oldala 1 hosszúságú. Jelölje  $\xi$  e pontnak a távolságát a háromszög legközelebbi oldalától. Határozzuk meg a  $\xi$  valószínűségi változó eloszlás- és sűrűségfüggvényét.

- 6.17 •• Pistike randevút beszélt meg Juliskával este 6-ra. Pistike két úton is eljuthat a megbeszélt randevú helyszínére, a két út között érmedobással dönt. Az utakon való végigjutás ideje két valószínűségi változót határoz meg:  $A$ -t és  $B$ -t.

a) Az  $A$  sűrűségfüggvénye (percekben számolva):

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x < 5 \text{ vagy } x > 20, \\ \frac{2}{75}(x-5) & \text{ha } 5 \leq x < 10, \\ \frac{4}{75}(20-x) & \text{ha } 10 \leq x \leq 20. \end{cases}$$

b) A  $B$  sűrűségfüggvénye pedig:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq 5, \\ \frac{1}{10} \exp\left(-\frac{x-5}{10}\right) & \text{ha } x > 5. \end{cases}$$

Pistike 6-kor indul útnak, mert elfelejtette nézni az órát. Mi a valószínűsége, hogy találkoznak, ha Juliska nem egy türelmes természet, és maximum tíz percet hajlandó várni?

- 6.18 Egy  $l$  hosszúságú ropit találmra választott pontban kettétörünk. Mi az így keletkezett darabok közül a rövidebb eloszlásfüggvénye?
- 6.19 Válasszunk két pontot függetlenül és egyenletesen az egységkör kerületén. Határozzuk meg a távolságuk eloszlásfüggvényét.
- 6.20 Válasszunk a háromdimenziós egységgömb belsejében egy pontot egyenletes eloszlással, és jelölje  $\xi$  ennek a pontnak távolságát a gömb középpontjától. Határozzuk meg  $\xi$  eloszlásfüggvényét és várható értékét.
- 6.21 Válasszunk az egységnégyzetben véletlenszerűen (egyenletes eloszlással) egy pontot. Jelölje  $\xi$  e pontnak a négyzet legközelebbi csúcsától való távolságát. Határozzuk meg a  $\xi$  valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvényét.

## 7. HF:

- 7.1 Sok intelligencia teszt normális eloszlást követ, 100 pont várható értékkel és 15 pont szórással. Ha ezeknek a teszteknek és értékelésüknek hihetünk, akkor az emberiség hány százalékának van 95 és 110 pont között az IQ-ja? A 100 pont körüli mekkora intervallumban van az emberiség 50%-ának az IQ-ja? Egy 2500 fős településen várhatóan hány embernek lesz 125 pont fölött az IQ-ja?
- 7.2 Az IQ teszteknek még mindig hiszünk és tegyük fel, hogy az eredmény 100 pont várható értékű és 15 szórású normális eloszlást követ. A teszteket megírt és kiértékelt alanyokat általában 3 csoportba szokták sorolni: alacsony-, átlagos-, illetve magas intelligenciahányadosúak. A résztvevőknek rendre 20, 65 illetve 15%-a került a megfelelő csoportokba. Hol húzták meg a határokat, azaz melyek azok a pontszámok melyek megkülönböztetik az egyes csoportokat?
- 7.3 Tegyük fel, hogy  $X$  normális eloszlású 5 várható értékkel. Ha  $\mathbf{P}\{X > 9\} = 0.2$ , közelítőleg mennyi  $X$  szórásnégyzete?
- 7.4 •• Tegyük fel, hogy a 25 éves fiatalok magassága centiméterben mérve normális eloszlású,  $\mu = 180$  és  $\sigma^2 = 169$  paraméterekkel. A 25 éves fiatalok hány százaléka magasabb 2 méternél? A két méteres klub tagjainak hány százaléka magasabb 2 méter 10 cm-nél?
- 7.5 Mutassuk meg, hogy  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ . (Tipp:  $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty e^{-x} x^{-\frac{1}{2}} dx$ . Helyettesítsünk  $y = \sqrt{2x}$ -et és hasonlítsuk össze az így kapott kifejezést a normális eloszlással!)

Bónusz: Számoljuk ki a normális eloszlás alább definiált „abszolút momentumait” ( $\varphi$  a standard normális sűrűség):

$$A_k := \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y) |y|^k dy, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

(Tipp: páros  $k = 2\ell$ -re számoljuk ki és használjuk a következő kifejezést:

$$\frac{d^\ell}{d\lambda^\ell} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda y^2/2} dy \Big|_{\lambda=1}.$$

Páratlan  $k = 2\ell + 1$ -re hajtsuk végre a  $z = y^2$  változócsere az  $A_k$ -t definiáló integrálban.)

- 7.6 Legyen az  $X$  valószínűségi változó normális eloszlású  $\mu$  várható értékkel és  $\sigma$  szórással. Számoljuk ki  $t \in \mathbb{R}$ -re az  $\mathbf{E}(e^{tX})$  várható értéket! (Tipp: ez egy egyszerű integrálhelyettesítéssel visszavezethető a normális sűrűségfüggvény integráljára.)
- 7.7 Bizonyítsuk be, hogy az előző feladatban kapott képlet akkor is érvényes marad, ha  $t$  tetszőleges komplex szám! (Vigyázat: a normális sűrűségfüggvény integrálját csak a *valós* számegyenesen tanultuk, hogy mennyi. A bizonyításhoz kell valami komoly az analízisből.)
- 7.8 Legyen  $X$  nulla várható értékű és  $\sigma$  szórással, normális eloszlású valószínűségi változó. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges  $x > 0$  esetén fennállnak a következő egyenlőtlenségek:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x^2/2\sigma^2)} \left( \frac{\sigma}{x} - \frac{\sigma^3}{x^3} \right) < \mathbf{P}\{X > x\} < \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x^2/2\sigma^2)} \frac{\sigma}{x}.$$

(Tipp: differenciáljuk az egyenlőtlenség lánc mindhárom tagját, és hasonlítsuk össze a deriváltakat.)

- 7.9 Becsüljük meg annak a valószínűségét, hogy 100.000 pókerleosztás során a fullok száma 128 és 158 közé essen.
- 7.10 •• Egy gyár kétfajta érmét gyárt: egy igazságot és egy hamisat, ami 55% eséllyel mutat fejet. Van egy ilyen érménk, de nem tudjuk, igazságos-e vagy pedig hamis. Ennek eldöntésére a következő statisztikai tesztet hajtjuk végre: feldobjuk az érmét 1000-szer, ha legalább 525-ször fejet mutat, akkor hamisnak nyilvánítjuk, ha 525-nél kevesebb fej lesz a dobások között, akkor az érmét igazságosnak tekintjük. Mi a valószínűsége, hogy a tesztünk téved abban az esetben, ha az érme igazságos volt? És ha hamis volt?
- 7.11 Egy nagyváros lakosságának *általunk ismeretlen*  $p$  hányada dohányzik. Ezt a  $p$  hányadot akarjuk közelítőleg meghatározni egy mintában megfigyelt relatív gyakorisággal a következő módon: megkérdezzük  $n$  véletlenszerűen kiválasztott lakost, és megállapítjuk, hogy ezek között  $k$  állítja, hogy dohányzik. A NSZT-ből tudjuk, hogy ha  $n$  elég nagy, akkor az empirikusan megfigyelt  $p' := k/n$  relatív gyakoriság igen nagy valószínűséggel jól közelíti az igazi  $p$  hányadot. Milyen nagynak kell  $n$ -et választanunk, ha azt akarjuk elérni, hogy az empirikusan megfigyelt  $p'$  relatív gyakoriság legalább 0.93 valószínűséggel 0.02 hibahatáron belül közelítse a valódi (ismeretlen)  $p$  hányadot? Más szóval: határozzuk meg azt a legkisebb  $n_0$  természetes számot, amelyre igaz, hogy bármely  $p \in (0, 1)$ -re és  $n \geq n_0$ -ra

$$\mathbf{P}\{|p' - p| \leq 0.02\} \geq 0.93.$$

- 7.12 Az előző feladat kicsit máshogy ☺

Budapest utcáin az emberek 42%-a támogatná, hogy közterületen ne lehessen dohányozni. Közelítsük azt a valószínűséget, hogy  $n$  megkérdezett ember közül legalább 40% a betiltás mellett nyilatkozik, ha

- a)  $n = 11$ ,  
 b)  $n = 101$ ,  
 c)  $n = 1001$ .  
 d) Hány embert kellene megkérdeznünk, hogy legalább 95% eséllyel 40% felett legyenek a betiltást támogatók?
- 7.13 •• Az ún. Monte Carlo-integrálás lényege a következő: legyen az egyszerűség kedvéért  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  folytonos függvény, és az

$$I = \int_0^1 f(x) dx$$

integrál értékét becsüljük. Ha  $U$  és  $V$  két független  $[0, 1]$  intervallumon egyenletes eloszlású valószínűségi változó, akkor az  $(U, V)$  pár a  $[0, 1]^2$  egységnégyzet egy véletlen pontját adja. Függetlenül generálva  $n$  véletlen pontot az egységnégyzetben, jelölje  $X_n$  azon pontok számát, amelyek az  $f$  függvény grafikonja alá estek, vagyis amelyekre  $V < f(U)$ . Ekkor  $I$  becslését az  $X_n/n$  hányados adja. Mekkora annak válasszuk  $n$  értékét, ha azt szeretnénk, hogy legfeljebb 0.03 valószínűséggel kapjunk 0.05-nál nagyobb hibát, ha a Monte Carlo-integrálás módszerét

- a) az  $f(x) = \sqrt{x}$  függvényre alkalmazzuk?  
 b) egy ismeretlen  $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$  folytonos függvényre alkalmazzuk?

7.14 Van két egyforma biztosítótársaság egyenként tízezer ügyféllel. A 2007-es év elején minden ügyfél befizet a biztosítójának ötvenezer forintot, és az év folyamán minden ügyfél egymástól függetlenül  $\frac{1}{3}$  valószínűséggel nyújt be kárigényt, amely minden esetben 150 ezer forintos. Mindkét biztosítótársaságnak van ezen felül 5 millió forint félretett pénze az előző évről. Egy biztosítótársaság csődbe megy, ha nem tudja kifizetni a beérkező kárigényeket. Érdemes-e egyesülnie a két biztosítótársaságnak? Legyen  $p_1$  annak a valószínűsége, hogy a két biztosítótársaság közül legalább egy tönkremegy, és  $p_2$  annak a valószínűsége, hogy az egyesült biztosítótársaság tönkremegy. Határozzuk meg  $p_1$  és  $p_2$  (közelítő) értékét, és vonjuk le a következtetést!

7.15 (A Poisson eloszlás normális approximációja.) Bizonyítsuk be, hogy  $\lambda \rightarrow \infty$ -re

$$\sqrt{\lambda} \cdot p_{\text{Poi}(\lambda)}(\lfloor \lambda + x\sqrt{\lambda} \rfloor) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp(-x^2/2) + \mathcal{O}(\lambda^{-1/2}),$$

és a hibatag egyenletesen kicsi, ha  $x$  egy korlátos halmazban marad. Következésként lássuk be, hogy

$$\sum_{\lambda + \alpha\sqrt{\lambda} < k < \lambda + \beta\sqrt{\lambda}} p_{\text{Poi}(\lambda)}(k) \rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(y) dy = \Phi(\beta) - \Phi(\alpha)$$

amint  $\lambda \rightarrow \infty$ .

7.16 •• A menzai poharak kirakásuktól számított törési ideje exponenciális eloszlást követ 24 hónap várható értékkel. Számítsuk ki annak valószínűségét, hogy

- a) 6 kirakott pohárból legfeljebb 4 törik el egy év alatt;
- b) 400 kirakott pohárból legfeljebb 165 törik el egy év alatt! (Adjuk meg a numerikus értéket is!)

7.17 A valszámium radioaktív bomló részecske átlagos élettartama 1 év. Mennyi ennek a részecskefajtának a felezési ideje?

7.18 A „Fény az éjszakában” típusú villanykörte élettartama exponenciális eloszlású. A gyártó mérései szerint a körték 90 százaléka bírja legalább egy évig. Mennyi időre vállalhat a gyártó garanciát a körték működésére, ha azt akarja, hogy a vevőknek legfeljebb 1 százaléka reklamáljon?

7.19 Reggel a földalatti szerelvények követési ideje exponenciális eloszlású valószínűségi változó 2 perc várható értékkel. Az egyik szerelvényt pont lekéstem.

- a) Mennyi a valószínűsége, hogy legalább 5 percet várnom kell a következőre?
- b) Már 3 perce várok hiába. Mennyi a valószínűsége, hogy még további 5 percig várnom kell?

7.20 (Veszélyráta.) Egy pozitív abszolút folytonos valószínűségi változó kockázati rátafüggvényének a  $\lambda(t) = \frac{f(t)}{1-F(t)}$  függvényt nevezzük.

- a) Mi a kockázati rátafüggvény szemléletes jelentése?
- b) Lássuk be, hogy ekkor

$$F(t) = 1 - \exp \left\{ - \int_0^t \lambda(s) ds \right\}!$$

- c) Mi a  $\lambda$  paraméterű exponenciális eloszlás rátafüggvénye?
- d) És egy  $[0, a]$  intervallumon egyenletes eloszlásé?

7.21 Gyakran hallani, hogy a dohányosok halálozási rátája (azaz a kockázati rátája a halál időpontjára vonatkozólag) minden életkorban kétszerakkora, mint az azonos korú nemdohányzóké. Igaza van-e annak a nemdohányzóknak, aki erre azzal jön, hogy ő akkor kétszer akkora valószínűséggel fog még  $x$  évig élni, mint a dohányos osztálytársa? Ha nem, mi a két valószínűség viszonya? (Tipp: előző feladat.)

7.22 Egy nagyon gyors számítógépen futó program, miután elindult, minden órajel hatására (vagyis nagyon gyakran) megpróbál lefagyni – feltéve, hogy ez korábban nem sikerült neki – és valamilyen nagyon kicsi valószínűséggel le is fagy. A tapasztalat szerint ez a program az indítás után átlagosan 1 órával fagy le. Mi a lefagyásig eltelt (órában mért) idő eloszlása?

7.23 Pistike nyári estéken csillaghullást néz. Egy-egy nyári estén nagyon sok meteor éri el a Földet, ezek mind egyikének egymástól függetlenül, nagyon kis valószínűséggel sikerül Pistike szemé elé kerülni – vagyis pont akkor és ott esni le, amikor és ahol Pistike látja. Így ő fél óra alatt átlagosan hármát lát lehullani. Augusztus 19-én este 22:00-kor kezdi nézni az eget.

- a) Mi a valószínűsége, hogy 22:00 és 22:25 között egyetlen hullócsillagot sem lát?
- b) Mi a valószínűsége, hogy  $T$  perc alatt egyetlen hullócsillagot sem lát, ahol  $T \in \mathbb{R}^+$ ?
- c) Az  $X$  valószínűségi változó legyen az az idő (percben mérve), amennyit Pistikének az első hullócsillag megpillantására várnia kell. Számoljuk ki  $X$  eloszlásfüggvényét és sűrűségfüggvényét!
- d) Fogalmazzuk meg szépen a tanulságot!
- 7.24 •• A HOMÁLY cég kétféle kompakt fénycsövet forgalmaz, az A és B típusok várható élettartama rendre 7000, illetve 12000 óra, mindkét esetben exponenciális eloszlással.
- a) Egy egyetemi előadóterem két lámpájában egyszerre cserélik a fénycsöveket, tehát ha az egyik fénycső kiég, mindkettőt lecserélik. A legutóbbi csere alkalmával az egyik lámpába A, a másikba B típusú fénycső került. Mi a valószínűsége, hogy a következő cserére kevesebb, mint 4000 óra elteltével lesz szükség? És ha tudjuk, hogy a legutóbbi csere óta 3000 óra telt el, mi a valószínűsége, hogy további 4000 óráig nem lesz szükség cserére? (Az egyes fénycsövek élettartama függetlennek tekinthető.)
- b) A takarékoság jegyében a doktorandusz szobába egy olcsó boltból szerzik be a fénycsövet, ahol azokat csomagolás nélkül, a rendetlenség miatt jól összekeveredve tárolják. A kupac 20%-a "selejtes", be se kapcsol, a maradék egyenlő arányban A, illetve B típusú. Vaktában választva, mi lesz a doktorandusz szobába kerülő fénycső élettartamának eloszlásfüggvénye?
- c) Mi a valószínűsége, hogy a doktorandusz szobába kerülő fénycső több, mint 4000 óráig bírja? És ha ez a fénycső már kibírt 3000 órát, mi a valószínűsége, hogy még további 4000 óráig bírni fogja?

## 8. HF:

- 8.1 A következő feladatokban adott a  $\xi$  valószínűségi változó eloszlásfüggvénye ill. sűrűségfüggvénye. Meg kell határozni az  $\xi$  függvényeként értelmezett  $X, Y, Z, \dots$  valószínűségi változók sűrűségfüggvényét.
- (a)  $\xi$  egyenletes eloszlású a  $[-1, 1]$  intervallumban;  $X := \xi^2, Y := \xi^3, Z := \tan(\frac{\pi}{2}\xi), U := \sin(\pi\xi)$ .
- (b) •  $\xi$  exponenciális eloszlású  $\lambda$  paraméterrel;  $X := 2\xi - 1, Z := \sqrt{\xi}$ .
- (c)  $\xi$  standard normális eloszlású;  $X := \xi^2, Y := \xi^{-2}$ .
- (d) •  $\xi$  egyenletes eloszlású a  $[-3, 2]$  intervallumban;  $X := \xi^2$ .
- (e)  $\xi$  exponenciális eloszlású  $\lambda$  paraméterrel;  $X := -3\xi + 2, Y := e^\xi$ .
- (f)  $\xi$  sűrűségfüggvénye  $2x$  a  $[0, 1]$  intervallumon, egyébként 0,  $Y := \xi^{-2}$ .
- 8.2 Legyen  $X$  egyenletes eloszlású a  $[-3, 4]$  intervallumon, és legyen  $\Psi(x) = |x - 1| + |x + 1|$ . Határozzuk meg az  $Y = \Psi(X)$  valószínűségi változó  $G(y)$  eloszlásfüggvényét. Abszolút folytonos eloszlás-e  $Y$ ? Adjuk meg a  $G$  eloszlásfüggvény Lebesgue-féle felbontását diszkrét, abszolút folytonos és folytonos de szinguláris nem csökkenő függvények összegére.
- 8.3 Határozzuk meg  $R = A \sin(\Theta)$  eloszlását, ahol  $A$  egy rögzített konstans, és  $\Theta$  egyenletes eloszlású  $(-\pi/2, \pi/2)$ -n. (Az ilyen valószínűségi változók ballisztikánál jönnek elő: a  $v$  sebességgel  $\alpha$  szögben kilőtt lövedék  $R = \frac{v^2}{g} \cdot \sin(2\alpha)$  távolságban ér földet.)
- 8.4 (a) Legyen  $X$  standard Cauchy-eloszlású valószínűségi változó. Bizonyítsuk be, hogy ekkor  $X$  és  $1/X$  azonos eloszlásúak. (Emlékeztető: Egy standard Cauchy eloszlású valószínűségi változó sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)} \quad -\infty < x < \infty.)$$

- (b) Mutassuk meg, hogy a fenti tulajdonság az

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1/4 & \text{ha } |y| \leq 1 \\ 1/(4y^2) & \text{ha } |y| > 1 \end{cases}$$

sűrűségfüggvényű  $Y$  valószínűségi változóra is igaz, vagyis  $1/Y$  eloszlása megegyezik  $Y$  eloszlásával.

- 8.5 a) Legyen  $X$   $\lambda$  paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó, és  $c > 0$ . Mutassuk meg, hogy  $cX$  szintén exponenciális eloszlású,  $\lambda/c$  paraméterrel.
- b) Most legyen  $X$  sűrűségfüggvénye  $f(x)$ . Mi az  $Y = aX + b$  valószínűségi változó sűrűségfüggvénye?
- c)  $Z$  eloszlása megegyezik  $2Z$ -jével. Mi ez a  $Z$ ?

Bónusz Legyen  $X$  sűrűségfüggvénye  $\frac{1}{\ln 2} \frac{1}{1+x}$  a  $[0, 1]$  intervallumon és 0 egyébként. Mi lesz  $\frac{1}{X}$  törtrészének sűrűségfüggvénye?

8.6 •

- a) Legyen  $X$  normális eloszlású  $\mu$  várható értékkel és  $\sigma$  szórással. Határozzuk meg  $Y = e^X$  sűrűségfüggvényét. ( $Y$  eloszlását lognormálisnak nevezik.)
- b) Mutassuk meg, lehetőleg számolás nélkül, hogy ekkor  $CY^\alpha$  eloszlása szintén lognormális  $\mu' = \alpha\mu + \log C$  és  $\sigma'^2 = \alpha^2\sigma^2$  paraméterekkel. (Tipp: tudjuk, hogy  $Y = e^X$ , ahol  $X$  normális. Írjuk fel  $CY^\alpha = e^Z$  alakban, találjuk meg a kapcsolatot  $X$  és  $Z$  között, és használjuk tudásunkat a normális valószínűségi változó lineáris transzformáltjairól.)

8.7 Legyen  $X$  folytonos eloszlású valószínűségi változó,  $F$  eloszlásfüggvénnyel. Legyen  $Y = F(X)$ . Mutassuk meg, hogy  $Y$  valószínűségi változó egyenletes eloszlású a  $(0, 1)$  intervallumon.

8.8 Legyen  $X$  egy valószínűségi változó, amelyre  $\mathbf{P}\{X = 0\} = 0$ , és  $Y := X^{-1}$ . Mi a feltétele annak, hogy  $X$  és  $Y$  azonos eloszlásúak legyenek?

8.9 Bizonyítsuk be, hogy ha  $\xi$  Cauchy eloszlású valószínűségi változó, melynek sűrűségfüggvénye  $f(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$ , és  $X := 1/\xi$ ,  $Y := 2\xi/(1-\xi^2)$ ,  $Z := (3\xi - \xi^3)/(1-3\xi^2)$ , akkor  $X$ ,  $Y$  és  $Z$  szintén Cauchy eloszlású. (Tipp: Használjuk a következő trigonometriai azonosságokat: ha  $\xi = \operatorname{tg}(\alpha)$ , akkor  $1/\xi = \operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha)$ ,  $2\xi/(1-\xi^2) = \operatorname{tg}(2\alpha)$  és  $(3\xi - \xi^3)/(1-3\xi^2) = \operatorname{tg}(3\alpha)$ .)

8.10 Egy  $l$  hosszú ropit találomra (egyenletes eloszlással választott pontban) kettétörünk.

- (a) •• Jelöljük  $X$ -szel az így kapott két rész hosszainak négyzetösszegét. Határozzuk meg az  $X$  valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvényét.
- (b) Jelöljük  $Y$ -nal a két részből képezett téglalap területét. Határozzuk meg az  $Y$  valószínűségi változó eloszlásának sűrűségfüggvényét.

8.11 Legyen  $\xi$  az  $X$  pont távolsága a sík  $(1, 1)$  koordinátájú pontjától, ha

- a)  $X$ -et az  $x$ -tengely  $[0, 1]$  intervallumán véletlenszerűen választjuk;
- b)  $X$ -et az  $x$ -tengely  $[0, 2]$  intervallumán véletlenszerűen választjuk.

A két esetben határozzuk meg a  $\xi$  valószínűségi változó sűrűségfüggvényét.

8.12 Egy  $l$  hosszú ropit két egymástól függetlenül és egyenletes eloszlással kiválasztott pontban eltörünk.

- a) Mi az így nyert három darab közül a legrövidebb hosszának a várható értéke?
- b) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a három darabból háromszöget alkothatunk?

8.13 •• Egy téglalap oldalainak hossza legyen 3 ill 4. A két szemközti 3 hosszú oldalon egymástól függetlenül és egyenletes eloszlással kijelölünk egy-egy véletlen pontot. Jelölje  $X$  e pontok távolságát. Meghatározandó  $X$  sűrűségfüggvénye.

8.14 Két szabályos kockával dobunk. Határozzuk meg  $X$  és  $Y$  együttes súlyfüggvényét, ha

- a)  $X$  a dobott számok maximuma,  $Y$  a két dobott érték összege;
- b)  $X$  az első kocka eredménye,  $Y$  a dobott számok maximuma;
- c) • rendre  $X$ ,  $Y$  a dobott számok minimuma, ill. maximuma.

8.15 Legyenek  $X$  és  $Y$  független,  $p$  paraméterű geometriai eloszlású valószínűségi változók. (Azaz:  $\mathbf{P}\{X = i, Y = j\} = (1-p)^{i-1} \cdot p \cdot (1-p)^{j-1} \cdot p$ ,  $i, j > 0$ .)

- a) Sejtsük meg  $\mathbf{P}\{X = i | X + Y = n\}$  értékét. (Tipp: tegyük fel, hogy egy cinkelt érmét dobunk fel, egymás után sokszor. Az érme  $p$  valószínűséggel ad fejet. Ha a második fej az  $n$ -edik feldobásnál jön, mi az első fej bekövetkezése idejének eloszlása?)
- b) Igazoljuk (a)-beli eredményünket számolással. (Tipp: ugye még emlékszünk mi független geometriai várakozási idők összegének az eloszlása?)

8.16 Együttes eloszlásfüggvény-e a következő két függvény  $(x, y \in \mathbb{R})$ ?

$$F(x, y) = \exp(-e^{-(x+y)}), \quad G(x, y) = \exp(-e^{-x} - e^{-y}).$$

8.17 Legyen  $(X, Y)$  az  $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$  egységkörben véletlenszerűen (egyenletes eloszlással) választott pont koordináta-párja. Határozzuk meg a peremeloszlások sűrűségfüggvényét.



8.18 •• Határozzuk meg a peremsűrűség-függvényeket! Független-e  $X$  és  $Y$ ?

a) Legyen az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttes eloszlásának sűrűségfüggvénye:

$$h(x, y) = \begin{cases} A \cdot (x^4 + y^4) & \text{ha } 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0 & \text{egyébként.} \end{cases};$$

ahol az  $A$  pozitív konstans értéke meghatározandó.

b) Az  $(X, Y)$  pont eloszlása egyenletes a  $D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + \frac{|y|}{3} \leq 1 \right\}$  tartományon.

8.19 Egy férfi és egy nő találkoztól beszélt meg 12:30-ra. Ha a férfi 12:15 és 12:45 között egyenletes eloszlású időben érkezik, és tőle függetlenül a nő 12:00 és 13:00 között egyenletes eloszlású időben érkezik,

a) határozzuk meg annak valószínűségét, hogy aki először érkezik, 5 percnél kevesebbet vár.

b) Mi a valószínűsége, hogy a férfi érkezik elsőnek?

8.20  $n$  pontot függetlenül egyenletesen elosztunk egy kör kerületén, és szeretnénk meghatározni annak valószínűségét, hogy mind egy félkörbe esnek (vagyis annak valószínűségét, hogy van egy olyan, a kör középpontján átmenő egyenes, melynek az összes pont az egyik oldalán van). Jelölje  $P_1, P_2, \dots, P_n$  a pontokat. Legyen  $A$  az az esemény, hogy az összes pont egy félkörbe esik, és  $A_i$  az az esemény, hogy az összes pont abba a félkörbe esik, amely  $P_i$ -től indul az óramutató járásával egyező irányban,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

a) Fejezzük ki  $A$ -t az  $A_i$ -k segítségével.

b) Igaz-e, hogy az  $A_i$ -k kölcsönösen kizáróak?

c) Határozzuk meg  $\mathbf{P}\{A\}$ -t.

d) Most válaszoljunk meg a következő kérdést: ha egy *kör*lapon egymástól függetlenül  $n$  pontot egyenletes eloszlással elhelyezünk, mi a valószínűsége, hogy a kör középpontja benne lesz a pontok konvex kombi-nációiként előálló halmazban?

8.21 Az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók közös sűrűségfüggvénye

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & \text{ha } x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

Független-e  $X$  és  $Y$ ? És ha a közös sűrűség

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & \text{ha } 0 < y < 1, 0 < x < y, \\ 0, & \text{egyébként?} \end{cases}$$

8.22 Legyenek  $X, Y$  független,  $[0, 1]$ -en egyenletes valószínűségi változók. Mi a távolságuk sűrűségfüggvénye?

8.23 **Rendezett minták.** Leszórunk a  $[0, 1]$ -re egyenletesen  $n$  pontot. Mi a  $k$ . pont sűrűségfüggvénye? Rávezetők kicsit egyszerűbb kérdések: Mi a maximum eloszlása? Mi a sűrűségfüggvény? És a 2. legnagyobb? (Hogyan kapjuk meg deriválás nélkül, közvetlenül?)

## 9. HF:

9.1 Legyenek  $X_1 \sim \text{Exp}(\lambda_1)$ , és  $X_2 \sim \text{Exp}(\lambda_2)$  függetlenek, ahol  $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ . Határozzuk meg  $X_1 + X_2$  eloszlását.

9.2 Mutassuk meg *számolással*, hogy ha  $X_i, i = 1, \dots, n$  független azonos eloszlású geometriai valószínűségi változók, akkor  $X_1 + \dots + X_n$  negatív binomiális eloszlású. Használjunk indukciót. (A valószínűség-számítási érvelést már láttuk előadáson.)

9.3  $X$  úr vonattal és távolsági autóbusszal utazik a munkahelyére. *Menetrend szerint* a vonat 7:30-kor érkezik, a busz pedig 7:37-kor indul. Az átszállás két percet vesz igénybe. Ám a vonat valódi érkezési ideje *normális eloszlású* valószínűségi változó melynek várható értéke 7:30-kor van és szórása 3 perc. Az autóbusz valódi indulási ideje a vonat érkezésétől független, szintén normális eloszlású valószínűségi változó, melynek várható értéke 7:37-kor van, szórása pedig 4 perc.

a) Mennyi annak a valószínűsége, hogy  $X$  úr a hét öt munkanapja közül legfeljebb egy alkalommal kesse le a buszcsatlakozást?

- b) X úr hazafelé a menetrend szerint 17:40-kor érkező buszról leszállva szeretné elérni a menetrend szerint 17:49-kor induló vonatot. A járművek érkezési, illetve indulási idejének szórása ismét 4, illetve 3 perc, és az átszállás visszafelé is két percet igényel. Egy évben 220 munkanappal számolva, mi a valószínűsége, hogy X úr hazafelé több alkalommal kési le a csatlakozást, mint munkába menet?
- 9.4 •• Egy nagy nemzetközi üzletlánc minden alvállalkozójához, így B úrhoz is, 9 üzlet tartozik. Az egyes üzletek havi bevétele egymástól független, normális eloszlású, 2.000.000 Ft várható értékkel és 100.000 Ft szórással. B úr havi összköltsége az üzletek fenntartására a bevételektől független, szintén normális eloszlású 16.500.000 Ft várható értékkel és 400.000 Ft szórással.
- a) Mi a valószínűsége, hogy B úr 2022 novemberében elér legalább 1.000.000 Ft hasznót?
- b) A nagyvállalatnak 400 hasonló alvállalkozója van. Mindegyikhez 9 üzlet tartozik, továbbá az egyes alvállalkozók havi összköltsége, valamint az üzleteik havi bevétele mind egymástól független, és ugyanolyan eloszlású, mint B úr esetében. Jelölje  $X$ , hogy a vállalatnak hány alvállalkozója tesz szert legalább 1.000.000 Ft haszonra 2022 novemberében. Keressük meg azt a legkisebb  $k$  számot, melyre igaz, hogy  $\mathbb{P}(X < k) \geq 0,7$ .
- 9.5 •• Egy alma tömegének várható értéke 110g, szórása 8g, egy körte tömegének várható értéke 90g, szórása 6g. Az eloszlások normálisak és függetlenek tekinthetők.
- a) Veszek egy almát és egy körtét, mi a valószínűsége, hogy az alma nehezebb lesz a körténél?
- b) Egy nagyobb társaságot szeretnének vendégül látni, ezért veszünk 64 körtét és 64 almát. Gyümölcssalátá készítéséhez kiválogatjuk a 80g-nál könnyebb körtéket és a 100g-nál könnyebb almákat. Mi a valószínűsége, hogy a gyümölcssalátába több körte kerül, mint alma?
- 9.6 Legyenek  $X$ ,  $Y$  és  $Z$  független, azonos  $\text{Geom}(p)$  eloszlású valószínűségi változók.
- a) Számítsuk ki a következő valószínűségeket:

$$\mathbf{P}\{X = Y\}, \quad \mathbf{P}\{X \geq 2Y\}, \quad \mathbf{P}\{X + Y \leq Z\}.$$

- b) Legyen  $U := \min\{X, Y\}$  és  $V := X - Y$ . Bizonyítsuk be, hogy  $U$  és  $V$  függetlenek.
- 9.7 **A függetlenség szimmetriája.** Legyenek  $X_1, X_2, \dots$  független, azonos eloszlású valószínűségi változók az  $F$  folytonos eloszlásból. (Próbaként, lehet egyenletes.) Jelölje  $A_n$  azt az eseményt, hogy az  $X_n$  rekord, azaz nagyobb, mint az összes addigi. Mennyi  $\mathbf{P}\{A_n\}$ ? Független-e  $A_{n+1}$   $A_n$ -től? Számítsuk ki a  $\mathbf{P}\{A_n | A_{n+1}\}$  és  $\mathbf{P}\{A_{n+1} | A_n\}$  feltételes valószínűségeket.
- 9.8 A patikába egy óra alatt betérő emberek száma Poisson eloszlású  $\lambda = 10$  paraméterrel. Számoljuk ki annak feltételes valószínűségét, hogy legfeljebb 3 férfi tért be, feltéve, hogy 10 nő tért be a patikába abban az órában. Milyen feltevésekkel éltünk?
- 9.9 Legyenek  $X \sim \text{Poi}(\lambda)$ ,  $Y \sim \text{Poi}(\mu)$  eloszlású független valószínűségi változók. Mi lesz  $X$  feltételes eloszlása  $X + Y$  ismeretében? Számoljuk ki, majd ismerjük fel az eloszlást és vonjuk le a tapasztalatot a Poisson folyamatra gondolva.
- 9.10 Legyenek  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  független azonos eloszlású, folytonos valószínűségi változók, közös eloszlásfüggvényük legyen  $F$ , sűrűségfüggvényük legyen  $f$ , továbbá legyen

$$I = \mathbf{P}\{X_1 < X_2 < X_3 < X_4 < X_5\}.$$

- a) Mutassuk meg, hogy  $I$  nem függ  $F$ -től. (Tipp: Írjuk át  $I$ -t ötös integrállá, és alkalmazzuk az  $u_i = F(x_i)$ ,  $i = 1, \dots, 5$  változócsereket.)
- b) Számoljuk ki  $I$  értékét!
- c) Adjunk szemléletes magyarázatot az előző pontban kapott eredményre!
- 9.11 Számoljuk ki a következő együttes eloszlásokra  $X$  feltételes sűrűségfüggvényét az  $Y = y_0$  feltétel, valamint  $Y$  feltételes sűrűségfüggvényét az  $X = x_0$  feltétel mellett:
- a) Legyen az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttes eloszlásának sűrűségfüggvénye:

$$h(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{5}(x + xy + y) & \text{ha } 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0 & \text{egyébként.} \end{cases}$$

b)  $(X, Y)$  együttes eloszlása egyenletes az  $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$  körlapon.

9.12 •••

a) Két dobókockával dobunk, legyen  $X$  a dobott számok összege,  $Y$  a dobott számok különbsége. Számoljuk ki  $Y$  feltételes sűrűségfüggvényét, az  $X = i$ ,  $i = 2, 3, \dots, 12$  feltétel mellett. Független egymástól  $X$  és  $Y$ ? Miért?

b)  $X$  és  $Y$  együttes sűrűségfüggvénye

$$f(x, y) = c(x^6 - y^6)e^{-5x} \quad 0 \leq x < \infty, |y| \leq x.$$

Mi  $Y$  feltételes eloszlása,  $X = x$  feltétel mellett?

c)  $X$  és  $Y$  együttes eloszlása egyenletes azon a hatszög alakú tartományon, melynek csúcsai

$$A_k = \left( \cos\left(k\frac{\pi}{3}\right), \sin\left(k\frac{\pi}{3}\right) \right); \quad k = 0, 1, \dots, 5.$$

Határozzuk meg  $X$  feltételes eloszlását az  $Y = y_0$ , valamint  $Y$  feltételes eloszlását az  $X = x_0$  feltétel mellett, minden szóba jövő  $x_0$  és  $y_0$  értékre.

9.13 Legyenek  $X, Y$  és  $Z$  független valószínűségi változók. Legyen  $X$  ill.  $Y$  eloszlásfüggvénye  $F(x)$ , ill.  $G(x)$ , és legyen  $\mathbf{P}\{Z = 1\} = p = 1 - \mathbf{P}\{Z = 0\}$ . Határozzuk meg a következő valószínűségi változók eloszlásfüggvényeit:

$$T := ZX + (1 - Z)Y, \quad U := ZX + (1 - Z)\max\{X, Y\}, \quad V := ZX + (1 - Z)\min\{X, Y\}.$$

9.14 Pistike egy nagy doboz rossz minőségű villanykörtét vásárolt, amiknek az élettartama független exponenciális eloszlású mindössze 10 perc várható értékkel. Este 10-kor leül valószínűségszámítást tanulni, becsavarja az asztali lámpájába az első körtét, és felkapcsolja. Ezután amikor egy körte kiég, rögtön kicseréli, és a következő mellett tanul tovább. Jelölje  $\tau_1, \tau_2, \dots$  az egyes villanykörték élettartamát.

a) Jelölje  $T_2$  azt az időpontot (este 10-től számítva, percben), amikor a második körte kiég, vagyis  $T_2 = \tau_1 + \tau_2$ . Mi  $T_2$  sűrűségfüggvénye? Számoljuk ki közvetlenül.

b) Milyen lesz  $T_1$  feltételes eloszlása a  $T_2 = t$  feltétel mellett?

c) "Kiteintő": Mi annak a valószínűsége egy POI(1/10) folyamatban, hogy még nem érkezett meg  $t$ -kor a második pont? És hogy már megérkezett? Deriváljuk és hasonlítsuk össze az első pontbeli eredménnyel.

d) Jelölje  $T_n$  azt az időpontot (este 10-től számítva, percben), amikor az  $n$ -edik körte kiég, vagyis  $T_n = \tau_1 + \tau_2 + \dots + \tau_n$ . Mi  $T_n$  sűrűségfüggvénye?

e) Minden  $n$ -re írjuk fel annak valószínűségét, hogy  $n$  darab körtével nem tudja kihúzni fél óráig – vagyis hogy  $T_n < 30$ . (A kapott közepesen csúnya integrál kiszámolása nélkül is továbbléphetünk.)

f) Jelölje  $X$  a Pistike által az első 30 perc alatt elhasznált körték számát. Mi  $X$  eloszlása?

g) Emlékezzünk a 7.23. feladatra!

9.15 Egymástól függetlenül  $N$  ember érkezik egy üzleti vacsorára. Amikor megérkezik, minden ember körülnéz, hogy van-e a már megjelentek között barátja, majd vagy odaül az egyik barátjának az asztalához, vagy egy üres asztalhoz ül, ha nem érkezett meg még egy barátja sem. Ha bármely két ember mindentől függetlenül  $p$  valószínűséggel barátja egymásnak, számoljuk ki az elfoglalt asztalok várható számát! (Tipp: legyen  $X_i$  annak az indikátora, hogy az  $i$ -edik megérkező üres asztalhoz ül. (Azaz  $X_i = 1$ , ha üres asztalhoz ül, és  $X_i = 0$ , ha nem.))

9.16 Adott egy 90 emberből álló csoport.

a) Mennyi azon napok várható száma, amikor legalább 2 embernek van közülük születésnapja?

b) • Várhatóan hány olyan nap van egy évben, amikor közülük valakinek születésnapja van?

Bónusz (hasonló, mint az előző, csak picit máshogy) Egy urnában van  $n$  golyónk, ebből húzunk  $a_n$  darabot ismétléssel.

a) Mi annak a valószínűsége, hogy az  $i$ -edik golyót legalább kétszer húzom ki?

b) Milyen  $a_n$  értékre lesz a legalább kétszer húzott golyók számának várható értéke  $Cn^\alpha$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$  nagyságrendű? Spec  $\alpha = 0$ -ra mekkora az  $a_n$ ?

c) Mik a szóba jöhető  $\alpha$  kitevők?

- 9.17 Véletlenszerűen sorban áll  $n$  férfi és  $n$  nő.
- Mennyi azon férfiak várható száma, akik mellett (azaz előtt vagy mögött) nő áll a sorban?
  - Mennyi lenne a válasz, ha nem sorban állnának, hanem egy kerek asztal köré ülnének le?
- 9.18 10 házaspár ül le véletlen elhelyezéssel egy kerekasztalhoz. Számítsuk ki
- a várhatóértékét,
  - a szórásnégyzetét
- annak, hogy hány férj ült a felesége mellé.
- 9.19 •• Egy hibátlan kockával dobunk tízszer. Jelölje  $X$  azt a számot, ahányszor páros dobást páratlan követ. Mennyi  $X$  várható értéke és szórása?
- 9.20 Dobókockával addig dobálunk, amíg 1-től 6-ig minden szám legalább egyszer elő nem fordul. Mennyi a szükséges dobások számának várható értéke és szórása?
- 9.21 Egy palack tej mennyiségének várható értéke 1 liter, szórása 4 centiliter. Egy négytagú családban minden reggel kibontanak egy palack tejet. Először a kisebbik gyerek tölt magának egy kis pohárral, majd a nagyobb gyerek és az anyuka egy-egy nagy pohárral, a maradékot az apuka ihatja meg. A kis pohárba várhatóan 2 deciliter, a nagyobb poharakba 3-3 deciliter tej kerül, a tej mennyiségének szórása 1 centiliter a kis pohár és 2 centiliter a nagy pohár esetén. Az egyes folyadékmennyiségek függetlenek és normális eloszlásúnak tekinthetők.
- Mi a valószínűsége, hogy az apukának kevesebb, mint másfél deciliter tej marad?
  - Mi a valószínűsége, hogy 2020-ban legalább 70 reggel kell az apukának másfél deciliternél kevesebb tejjel beérnie?
  - Estéknként a közeli éjjel-nappali boltban vásárolják a tejet, az ott kapható palackban a mennyiség várható értéke 1 liter, szórása 5 centiliter. Vacsoránál a tejet a reggelihez hasonló eljárással osztják el egymás között a család tagjai. Mi a valószínűsége, hogy 400 egymást követő napon több olyan reggeli lesz, mint ahány vacsora, amikor az apukának másfél deciliternél kevesebb tejjel kell beérnie?
- 9.22 A kóbor kutyák átlagos testsúlya 40 kg, a testsúlyuk szórása pedig 20 kg. A sintérek által a kutyák elfogására használt háló elszakad, ha a kutya 60 kilósnál nehezebb, a 20 kilósnál kisebb kutyák pedig ki tudnak bújni belőle. Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy a kutya testsúlya az átlagtól nem tér el 20 kg-mal többel, és így biztonsággal el lehet kapni a hálóval, ha
- a testsúly  $\mathcal{N}(40, 400)$  normális eloszlású;
  - a testsúly lognormális eloszlású, melynek 40 kg a várható értéke és 20 kg a szórása.
- A két modell közül melyik valószínűbb?

## 10. HF:

- 10.1 Legyen  $X_1, X_2, \dots$  független azonos eloszlású folytonos valószínűségi változók sorozata, legyen  $N \geq 2$  olyan, hogy

$$X_1 \geq X_2 \geq \dots \geq X_{N-1}, \quad X_{N-1} < X_N.$$

Azaz az  $N$ -edik az első tagja a sorozatnak, ahol a sorozat növekvővé válik. Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{E}(N) = e$ .  
(Tipp: érdemes először kiszámolni  $\mathbf{P}\{N \geq n\}$ -t.)

- 10.2 a) Legyenek  $X$  és  $Y$  független, nemnegatív értékű folytonos valószínűségi változók, melyekre  $\mathbf{E}X < \infty$  és  $\mathbf{E}Y < \infty$ . Bizonyítsuk be, hogy

$$\mathbf{E} \min\{X, Y\} = \int_0^{\infty} \mathbf{P}\{X \geq t\} \cdot \mathbf{P}\{Y \geq t\} dt.$$

- b) Általánosítsuk az előbbi összefüggést tetszőleges  $k$  darab független, nemnegatív értékű folytonos  $X_1, X_2, \dots, X_k$  valószínűségi változóra, melyekről feltesszük, hogy véges a várható értékük:

$$\mathbf{E} \min\{X_1, X_2, \dots, X_k\} = \int_0^{\infty} \prod_{j=1}^k \mathbf{P}\{X_j \geq t\} dt.$$

c) Az a) kérdés feltételei mellett bizonyítsuk be, hogy

$$\mathbf{E} \max\{X, Y\} = \int_0^{\infty} [1 - \mathbf{P}\{X \leq t\} \cdot \mathbf{P}\{Y \leq t\}] dt.$$

d) Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_k$  független,  $(0, 1)$ -en egyenletes eloszlású valószínűségi változók. Határozzuk meg az

$$\mathbf{E} \min\{X_1, X_2, \dots, X_k\}, \quad \mathbf{E} \max\{X_1, X_2, \dots, X_k\}$$

várható értékeket.

10.3  $n$ -szer feldobunk egy  $p$  valószínűséggel fejet adó érmét. Számoljuk ki az  $1, 2, \dots, k$  hosszú csupa fej részsorozatok várható számát! ( $1 \leq k \leq n$ )

10.4 Tízszer feldobunk egy hamis érmét, amin a fej valószínűsége  $p$ . Jelölje  $X$  a tiszta sorozatok számát (mint a 4.4 feladatban). Mennyi  $X$  várható értéke? (Vigyázat: az érme ezúttal hamis.)

Bónusz Tekintsük az  $n$  hosszú  $0-1$  kódokat, ahol minden koordináta független,  $p$  valószínűséggel  $0, 1-p$  valószínűséggel  $1$ . Gondoljunk ezekre úgy, mint egy gráf csúcsaira. Két csúcs közt menjen pontosan akkor él, ha csak a kódjuk legvégén lévő tiszta blokkban térnek el, vagyis valamely közös kezdeti rész után az egyik kód csupa  $0$ -val, a másik csupa  $1$ -gyel folytatódik. (Tehát pl.  $1110011000$  szomszédjai:  $1110011001, 1110011011$  és  $1110011111$ .) Sorsolok egy  $0$ -val illetve egy  $1$ -gyel kezdődő kódot a fenti eloszlással, vagyis a többi koordinátát már függetlenül  $p$  valószínűséggel  $0$ -nak,  $1-p$ -vel  $1$ -nek. Mennyi az így kapott két kód közt húzott legrövidebb út várható értéke? Mi a válasz, ha  $p = 1/2$ ? *Segítség: írjunk fel két ilyen kódot, és találjuk ki, hogyan jutunk el egyiktől a másikig a legrövidebb módon! Hogy kapcsolódik ez vajon a tiszta blokkok számához? És: vigyázzunk, hogy az egyik kód  $0$ -val kezdődik a másik pedig  $1$ -gyel!*

10.5 •• Egy urnában van  $M$  piros és  $N$  kék golyó. A golyókat visszatérés nélkül kihúzzuk egymás után az urnából. Tiszta sorozat alatt azokat a maximális hosszú húzásorozatokat értjük, melyek során a kihúzott golyók azonos színűek. Jelölje  $X$ , hogy az  $N + M$  hosszú húzásorozatunk hány tiszta sorozatból áll.  $\mathbf{E}X = ?$

10.6 Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n$  független és azonos eloszlású folytonos valószínűségi változók. Azt mondjuk, hogy egy rekordérték tűnik fel  $j$ -kor ( $j \leq n$ ), ha  $X_j \geq X_i$  minden  $1 \leq i \leq j$  esetén. Mutassuk meg, hogy

a)  $\mathbf{E}[\text{rekordértékek száma}] = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}.$

b)  $\mathbf{D}^2[\text{rekordértékek száma}] = \sum_{j=1}^n \frac{j-1}{j^2}.$

10.7 Legyenek  $X$  és  $Y$  független azonos eloszlású nemnegatív valószínűségi változók.  $\mathbf{E} \frac{X}{X+Y} = ?$

10.8 Három próbálkozási lehetőségünk van, mindegyik próbálkozás azonos valószínűséggel sikeres. Jelölje  $X$  a sikeres próbálkozások számát. Ha tudjuk, hogy  $\mathbf{E}(X) = 1.8$ ,

a) mennyi  $\mathbf{P}\{X = 3\}$  lehetséges legnagyobb értéke?

b) mennyi  $\mathbf{P}\{X = 3\}$  lehetséges legkisebb értéke?

Mindkét esetben találjunk ki egy valószínűségi forgatókönyvet, aminek eredménye  $\mathbf{P}\{X = 3\}$ , és ez az érték a lehető legnagyobb/legkisebb. (Tipp: a b) rész megoldását kezdhethük úgy is, hogy legyen  $U$  a  $(0, 1)$ -en egyenletes valószínűségi változó, majd definiáljuk a próbálkozásokat  $U$ -val kifejezve.)

10.9 Lacika addig dobál egy dobókockát, amíg nem sikerül neki kétszer egymás után hatost dobni. Mennyi a szükséges dobások számának várható értéke? (Segítség: nézzünk feltételes várható értékeket!)

10.10 a) Ha  $\mathbf{E}(X) = 1$  és  $\mathbf{D}^2(X) = 5$ , határozzuk meg  $\mathbf{E}[(2 + X)^2]$  és  $\mathbf{D}^2(4 + 3X)$  értékét.

b) Legyenek  $X$  és  $Y$  független azonos eloszlású valószínűségi változók  $\mu$  várható értékkel és  $\sigma$  szórással. Számoljuk ki  $\mathbf{E}[(X - Y)^2]$  értékét.

10.11 Legyenek  $X$  és  $Y$  független valószínűségi változók közös  $\mu$  várható értékkel, de különböző  $\sigma_X$  és  $\sigma_Y$  szórással.  $\mu$  értékét nem tudjuk, és egy mintavétel alapján az  $X$  és  $Y$  súlyozott átlagával szeretnénk becsülni. Azaz:  $\mu$  értékére a  $\lambda X + (1 - \lambda)Y$  becslést fogjuk adni, valamilyen  $\lambda$  paraméterrel. Hogyan válasszuk  $\lambda$ -t, hogy a becslésünk szórása minimális legyen? Miért érdemes ezt a  $\lambda$ -t használnunk?

10.12 Legyen az  $(X, Y)$  pont egyenletes eloszlású a  $(0, 0), (2, 0), (0, 1)$  pontok által meghatározott háromszögben.

- a) • Mi lesz az  $(X, Y)$  kétdimenziós eloszlás kovarianciamátrixa?  
 b) Legyen  $Z = 7X + 2Y$ . Mi lesz az  $(X, Z)$  kétdimenziós eloszlás kovarianciamátrixa?
- 10.13 a) Legyen  $X$  az a szám, ahányszor 1-est látunk,  $Y$  az a szám, ahányszor 2-est látunk ha  $n$ -szer dobunk egy szabályos kockával. Számoljuk ki e két valószínűségi változó korrelációs együtthatóját.  
 b) • Egy dobókockát kétszer feldobunk. Legyen  $X$  a dobások összege, és  $Y$  az első dobás mínusz a második dobás. Számoljuk ki  $\text{Cov}(X, Y)$ -t. Függetlenek-e  $X$  és  $Y$ ?
- 10.14 A ruletkeréken 37 mező van, 0-tól 36-ig számozva. Xavér mindig arra fogad, hogy az eredmény 19 vagy annál nagyobb szám, Yvett mindig arra, hogy az eredmény 3-mal való osztás szerinti maradéka 1 (tehát az  $\{1; 4; 7; \dots; 34\}$  számok valamelyike). Tekintsünk 20 független pörgetést; jelölje  $X$ , illetve  $Y$ , hogy ennek során hányszor nyer Xavér, illetve Yvett. (Az is lehet, hogy egy pörgetésnél mindketten nyernek, és az is, hogy egyikük sem.) Számoljuk ki  $X$  és  $Y$  korrelációs együtthatóját.
- 10.15 ••  $X$  és  $Y$  együttes sűrűségfüggvénye

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y} e^{-(y+x/y)}, & \text{ha } x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{egyébként.} \end{cases}$$

- a) Határozzuk meg  $\mathbf{E}(X)$  és  $\mathbf{E}(Y)$  értékét, valamint mutassuk meg, hogy  $\text{Cov}(X, Y) = 1$ .  
 b) Számoljuk ki  $\mathbf{E}(X^2|Y = y)$ -t is.
- 10.16 Az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttesen abszolút folytonos eloszlásúak,  $X$  peremsűrűség-függvénye  $f_X(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x}$  ha  $x \geq 0$ , és 0 ha  $x < 0$  (legyen  $\lambda = 1/2$ );  $Y$  feltételes eloszlása  $X$  rögzítése mellett pedig egyenletes a  $[0, X]$  intervallumon. Határozzuk meg
- a) az együttes sűrűségfüggvényt (ügyeljünk a tartományokra),  
 b)  $Y$  peremsűrűség-függvényét és  $\mathbf{E}(Y)$ -t,  
 c)  $\mathbf{E}(Y|X = x)$ -t és  $\mathbf{E}(X|Y = y)$ -t,  
 d)  $\mathbf{E}(X)$ -t (itt egyszerűbb, ha használjuk az előző részfeladatot), illetve  
 e)  $\text{Cov}(X, Y)$ -t.  
 f) Emlékezzünk vissza a 9.14 feladatra.
- 10.17 •• A 2 egység hosszúságú  $PQ$  szakaszt kettétörjük az egyenletes eloszlással választott  $R$  pontban. Jelölje a  $PR$  szakasz hosszát  $X$ . Ezek után a megmaradó,  $2 - X$  egység hosszú  $RQ$  szakasz mentén választunk egyenletes eloszlással egy  $S$  töréspontot. Jelölje az  $RS$  szakasz hosszát  $Y$ .
- (a) Írjuk fel az  $(X, Y)$  pár közös sűrűségfüggvényét. Figyeljünk a tartományokra.  
 (b)  $\mathbf{E}(Y|X = x) = ?$   $\mathbf{E}(Y) = ?$   
 (c) Számoljuk ki  $\text{Cov}(X, Y)$ -t.
- 10.18 •• Egy gráf csúcsokból, és a csúcsokat összekötő élekből áll. Tekintsünk egy gráfot, melynek  $n$  csúcsát 1-től  $n$ -ig megszámoztuk, és tegyük fel, hogy mind az  $\binom{n}{2}$  csúcspár között egymástól függetlenül van él  $p$  valószínűséggel, és nincs él  $1 - p$  valószínűséggel. (Ezt hívják Erdős-Rényi véletlen gráfnak.) Az  $i$  csúcs  $D_i$  fokszáma az  $i$  csúcsból kiinduló élek száma.
- a) Mi a  $D_i$  véletlen szám eloszlása?  
 b) Határozzuk meg a  $D_i$  és  $D_j$  változók  $\rho(D_i, D_j)$  korrelációs együtthatóját. (Tipp: definiáljuk  $X_i$ -t mint az  $i$ -ből induló, de nem  $j$ -be érkező élek számát, és  $I_{ij}$ -t mint az  $i$  és  $j$  közötti él meglétének indikátorát. Fejezzük ki  $D_i$ -t és  $D_j$ -t az  $X_i$ ,  $X_j$ , és  $I_{ij}$  változókkal, ezután számoljunk korrelációt.)
- 10.19 Egy liftbe a földszinten belépő emberek száma egy ismeretlen eloszlású  $X$  valószínűségi változó, 1-nél nagyobb várható értékkel.  $n$  emelet van és minden ember egymástól függetlenül, azonos valószínűséggel száll ki az  $n$  emelet bármelyikén. Legyen  $Y$  az a valószínűségi változó, hogy hányszor áll meg a lift, míg az utolsó utast is kirakja. Bizonyítsuk be, hogy  $\mathbf{E}(Y) < \mathbf{E}(X)$ .
- 10.20 Az előző feladatban tegyük föl, hogy  $X$  eloszlása Poisson, 10 várható értékkel. Számoljuk ki  $\mathbf{E}(Y)$ -t.
- 10.21 Egy ember autóbaleseteinek száma egy adott évben  $\lambda$  paraméterű Poisson eloszlású valószínűségi változó. Ez a  $\lambda$  paraméter minden embernél más és más, a népesség 60 százalékánál 2, 40 százalékánál 3. Ha véletlenül kiválasztunk egy embert, mi a valószínűsége annak, hogy

- a) nem történt vele baleset,
- b) pontosan 3 balesetet szenvedett egy adott évben?
- c) Mi a feltételes valószínűsége, hogy pontosan 3 balesetet szenvedett egy adott évben, feltéve, hogy előző évben nem történt vele baleset?
- d) Ismételjük meg az előzőeket, ha az  $x$ -nél kisebb  $\lambda$  paraméterrel rendelkező emberek aránya a népességben  $1 - e^{-x}$ .

10.22 Legyenek  $X_1, X_2, \dots, X_n$  független és azonos eloszlású valószínűségi változók. Határozzuk meg

$$\mathbf{E}(X_1 | X_1 + X_2 + \dots + X_n = x)$$

értékét. (Tipp:  $\mathbf{E}(X_1 + X_2 + \dots + X_n | X_1 + X_2 + \dots + X_n = x)$ .)

10.23 Hamis érmével dobunk, de nem tudjuk, hogy mennyire torzít az érme. Előzetesen annyit elárult nekünk a torz-érme gyár, hogy egyenletesen torzítják az érméket, vagyis mindenféle  $p \in [0, 1]$  egyenletesen fordul elő. Az első írást  $n$ -szerre dobtuk (addig csupa fejet). Mít tippelünk, mekkora a  $p$ ? (Mi a legvalószínűbb  $p$ ?) Alulról illetve felülről (0-tól  $c$ -ig illetve  $c$ -től 1-ig) mekkora intervallumnak van már elég nagy (mondjuk 0.95-ös) valószínűsége, hogy oda esik a  $p$ ?

## 11. HF:

- 11.1 •• Jelölje  $D$  az origó középpontú egységkörlap és a  $(2, 2)$  középpontú  $\frac{1}{2}$  sugarú körlap unióját. Legyen  $(X, Y)$  a  $D$ -ben egyenletes eloszlás szerint választott véletlen pont koordinátapárja. Határozzuk meg  $X$  és  $Y$  várható értékét és szórását.
- 11.2 Dobok egy dobókockával. Ha az eredmény  $i$ , akkor folytonos egyenletes eloszlás szerint választok egy számot a  $(0, i)$  intervallumon. Mi lesz a kapott szám várható értéke és szórása?
- 11.3 A LEFULLAD akkumulátorok élettartama exponenciális eloszlású 9 hónap várható értékkel. Ha az autóm-ban egy LEFULLAD akkumulátor tönkremegy, azonnal kicserélem egy ugyanilyen típusú új akkumulátorra. Vettem egy autót benne egy vadonatúj LEFULLAD akkumulátorral. Ezt az autót  $T$  ideig fogom használni, ahol  $T$  egyenletes eloszlású a  $[0, 9 \text{ év}]$  intervallumon. Jelölje  $Y$ , hogy hányszor cserélek akkumulátort ezalatt az idő alatt az autóban.  $\mathbb{E}Y = ?$   $\mathbb{D}^2Y = ?$
- 11.4 (a) • Legyen  $X$  és  $Y$  a két koordinátája annak a pontnak, melyet az origó középpontú, 1 sugarú körlapon egyenletesen választottunk. (Azaz: a közös sűrűségfüggvény  $f(x, y) = 1/\pi$ , ha  $x^2 + y^2 \leq 1$ .) Határozzuk meg az  $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$  és a  $\Theta = \arctan Y/X$  valószínűségi változók közös sűrűségfüggvényét.
- (b) Legyen  $U_1, U_2$  két független egyenletes eloszlású valószínűségi változó a  $[0, 1]$ -en. Bizonyítsuk be, hogy ha  $X = \sqrt{-2 \ln U_1} \cos(2\pi U_2)$  és  $Y = \sqrt{-2 \ln U_1} \sin(2\pi U_2)$ , akkor az  $(X, Y)$  pár kétdimenziós normális eloszlású.
- 11.5 a) Legyenek  $X \sim E(0, 1)$ , és  $Y \sim \text{Exp}(1)$  függetlenek. Határozzuk meg  $X + Y$  eloszlását.
- b) Legyenek  $X \sim E(0, 1)$ , és  $Y \sim \text{Exp}(1)$  függetlenek. Határozzuk meg  $X/Y$  eloszlását.
- c) Legyenek  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , és  $Y \sim \text{Exp}(\mu)$  függetlenek. Határozzuk meg  $X/Y$  eloszlását, és a  $\mathbf{P}\{X < Y\}$  valószínűséget.
- d) • Legyen  $X$  és  $Y$  két független  $\lambda$  paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó. Bizonyítsuk be, hogy az  $U := X + Y$  és  $V := X/(X + Y)$  valószínűségi változók függetlenek.
- 11.6 Az  $X$  és  $Y$  valószínűségi változók együttes eloszlásának sűrűségfüggvénye legyen  $h(x, y) = f(x)f(y)$  alakú, ahol  $f(x)$  egydimenziós sűrűségfüggvény. Legyen  $U = \max\{X, Y\}$  és  $V = \min\{X, Y\}$ . Határozzuk meg  $U$  és  $V$  együttes eloszlásfüggvényét és ennek sűrűségfüggvényét.
- 11.7 Legyen  $\underline{X} = (X_1, X_2, X_3)$  háromdimenziós véletlen vektor, amelynek komponensei független  $\mathcal{N}(0, 1)$  eloszlásúak. Definiáljuk a következő változókat:

$$\varrho := \sqrt{X_1^2 + X_2^2 + X_3^2}, \quad \xi_i := X_i/\varrho, \quad i = 1, 2, 3.$$

- a) Határozzuk meg  $\varrho$  sűrűségfüggvényét.
- b) Bizonyítsuk be, hogy  $\varrho$  és a  $\underline{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$  vektorváltozó egymástól függetlenek, továbbá azt, hogy a  $\underline{\xi}$  véletlen vektor egyenletes eloszlású az egységgömb felszínén.

Bónusz Legyen  $X$  és  $Y$  két független standard normális eloszlású valószínűségi változó.

- a) Tekintsük az  $(X, Y)$  véletlen pontot a síkon, és tekintsük az  $(U, V)$  transzformált valószínűségi változókat, ahol  $U = X^2 + Y^2$  és  $V = Y/X$ . Bizonyítsuk be, hogy  $U$  eloszlása exponenciális,  $V$  eloszlása pedig standard Cauchy, és a két valószínűségi változó független.
- b) Számítsuk ki a  $\mathbb{E}(X^2/U^2)$  és a

$$\mathbb{E} \left( \frac{\min(|X|, |Y|)}{\max(|X|, |Y|)} \right)$$

várható értékeket.

11.8 Legyenek  $X$  és  $Y$  függetlenek és egyenletes eloszlásúak a  $[-1, 1]$  intervallumon. Legyenek  $U_\theta = \cos(\theta) \cdot X + \sin(\theta) \cdot Y$  és  $V_\theta = -\sin(\theta) \cdot X + \cos(\theta) \cdot Y$ .

- (a) Határozza meg  $X$  és  $Y$  kovarianciamátrixát!  
 (b) A  $\theta$  paraméter mely értékei esetén lesznek  $U_\theta$  és  $V_\theta$  korellálatlanok?  
 (c) A  $\theta$  paraméter mely értékei esetén lesznek  $U_\theta$  és  $V_\theta$  függetlenek?

11.9 Határozzuk meg  $X$  és  $Y$  kovarianciamátrixát, ahol  $X$  egy  $\lambda = 2$  paraméterű exponenciális eloszlású valószínűségi változó és  $Y = 2X + 1$ .

11.10 Legyenek  $X$  és  $Y$  független  $\mathcal{N}(0, 1)$  illetve  $\mathcal{N}(0, 9)$  eloszlású valószínűségi változók és  $M$  egy véletlenszerűen kiválasztott pont az  $\mathbb{R}^2$  síkon, melynek koordinátái  $(X; Y)$ . Határozzuk meg a következő események valószínűségét:

- a)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq 1, |y| \leq 2\}$ ,  
 b)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, |y| \leq 2\}$ ,  
 c)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 4\}$ ,  
 d)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq x, |y| \leq 1, x \geq -3\}$ ,  
 e)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y^2/9) \leq 1\}$ ,  
 f)  $M \in \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y^2/9) \leq c^2\}$ .

11.11 Legyen  $(X, Y)$  kétdimenziós normális eloszlású  $(0, 0)$  várható értékkel és  $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$  kovarianciamátrixszal.

Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy az  $(X, Y)$  koordinátájú véletlen pont beleesik az

- a)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq 3\}$  körgyűrűbe;  
 b)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2 \leq \min(|x|, |y|) \leq \max(|x|, |y|) \leq 3\}$  tartományba;  
 c)  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 3 \leq |x| + |y| \leq 4\}$  tartományba.

11.12 Legyen  $(X, Y)$  kétdimenziós normális eloszlású  $(0, 0)$  várható értékkel és  $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$  kovarianciamátrixszal.

Határozzuk meg annak az eseménynek a valószínűségét, hogy az  $(X, Y)$  koordinátájú véletlen pont a  $(0, 3)$ ,  $(4, 0)$ ,  $(1.8, 5.4)$ ,  $(5.8, 2.4)$  csúcsú téglalapba esik.

11.13 Legyen  $(X, Y)$  kétdimenziós normális eloszlású  $(0, 0)$  várható értékkel és  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  kovarianciamátrixszal.

Határozzuk meg annak a valószínűségét, hogy az  $(X, Y)$  koordinátájú véletlen pont beleesik abba a szabályos háromszögbe, melynek egyik oldala a  $[-1, 1]$  intervallum az  $x$  tengelyen, harmadik csúcspontja pedig a  $(0, \sqrt{3})$  koordinátájú pont.

11.14 Egy részecske tömegét két kutatócsoport is szeretné kimérni, az első csoport  $k$  mérést végez és átlagolja ezek eredményét, a második csoport  $\ell$  mérést végez és szintén átlagol. Az egyes mérések független azonos normális eloszlásúak, a várható érték a részecske tényleges  $\mu$  tömege, a szórás  $\sigma$ . Mi a valószínűsége, hogy az első csoport eredménye pontosabb, mint a második csoport eredménye?

11.15 •• Legyenek  $X_1, \dots, X_n, X_{n+1}$  független, standard normális eloszlású valószínűségi változók, és  $Y = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$ .

- (a) Határozzuk meg az  $(X_1, Y)$  valószínűségi változók kovarianciamátrixát.  
 (b)  $\mathbb{P}(|Y| \leq |X_{n+1}|) = ?$

11.16 Legyenek  $X$  és  $Y$  független és azonos  $\mathcal{N}(0, 1)$  eloszlású valószínűségi változók. Határozzuk meg a

$$Z := e^{(X^2 + Y^2)/2} (1 + X^2 + Y^2)^{-3/2}$$

valószínűségi változó várható értékét és szórását.



11.17 Legyen  $X$  standard normális valószínűségi változó. Számoljuk ki  $\mathbf{Cov}(\cosh(X), \sinh(X))$  értékét.

11.18 Legyen  $X \mathcal{N}(0, 1)$  eloszlású valószínűségi változó és  $Y := \text{sign}(1 - |X|) \cdot X$ .

(a) Határozzuk meg az  $Y$  valószínűségi változó eloszlását.

(b)  $Z := X + Y$  eloszlása normális-e?

11.19 •• Legyen  $X$  standard normális eloszlású, és  $I$   $X$ -től független,  $\mathbf{P}\{I = 1\} = \mathbf{P}\{I = 0\} = 1/2$  eloszlással. Definiáljuk a következő valószínűségi változót:

$$Y := \begin{cases} X, & \text{ha } I = 1, \\ -X, & \text{ha } I = 0. \end{cases}$$

Azaz:  $Y$  ( $X$ -től függetlenül) egyenlő eséllyel lesz  $X$  vagy  $-X$ .

a) Mutassuk meg, hogy  $Y$  standard normális eloszlású.

b) Független-e  $I$  és  $Y$ ?

c) Független-e  $X$  és  $Y$ ?

d) Mutassuk meg, hogy  $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$ .

11.20 Az  $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$  valószínűségi vektorváltozó legyen kétdimenziós normális eloszlású  $\underline{m} = (-1, 1)$  várható érték-vektorral és  $\underline{C} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$  kovarianciamátrixszal. Számítsuk ki a  $\mathbf{P}\{X \geq -1, Y \geq 1\}$  valószínűséget!

(Tipp:  $\underline{C} = \underline{B}^2$ , ahol  $\underline{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .)

11.21 a) A feltételes kovariancia a feltételes várható értékkel úgy van definiálva, mint a kovariancia a várható értékkel. Vezessük le a *feltételes kovariancia formulát*:

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(\mathbf{Cov}(X, Y | Z)) + \mathbf{Cov}(\mathbf{E}(X | Z), \mathbf{E}(Y | Z)).$$

b) Hamis érmével dobunk, melynél a *fej* valószínűsége  $p$ , az *írásé* pedig  $q = 1 - p$ . Jelöljük  $X$ -szel és  $Y$ -nal az első, illetve a második tiszta (fej vagy írás) sorozat hosszát. (Pl. ha dobássorozatunk  $FFFIF \dots$ , akkor  $X = 3, Y = 2$ ; ha pedig dobássorozatunk  $IFFI \dots$ , akkor  $X = 1, Y = 2 \dots$ ) Határozzuk meg a következő mennyiségeket:  $\mathbf{E}X, \mathbf{E}Y, \mathbf{E}X^2, \mathbf{E}Y^2, \mathbf{D}^2X, \mathbf{D}^2Y, \mathbf{Cov}(X, Y)$ .

11.22 Egy négyzetrácsos papírra egy tintapaca csöppen. Mekkora a valószínűsége, hogy a paca nem metszi a vonalakat, ha azok fél centire vannak egymástól, a tintafolt sugara pedig egyenletes eloszlású a  $[0 \text{ cm}, 1/3 \text{ cm}]$  intervallumon?

11.23 Emlékezzünk vissza a 3.5 feladatra! Az ott leírt feltételek mellett jelölje  $X_n$  azt, hogy a sorban  $n$ -edik hölgy hányadik legszebb az első  $n$  hölgy közül. Például ha az egymás utáni hölgyek egyre szebbek, akkor a sorozat  $1, 1, \dots, 1$  lesz, ha egyre csúnyábbak, akkor  $1, 2, 3, \dots, N$ . Bizonyítsuk be, hogy az  $X_1, X_2, \dots, X_N$  valószínűségi változók teljesen függetlenek.

11.24 Legyen  $Y \sim \mathcal{N}(\mu, 1)$ , és  $X | Y \sim \mathcal{N}(Y, 1)$ .

a) Mutassuk meg, hogy az  $(X, Y)$  pár együttes eloszlása ugyanaz, mint az  $(Y + Z, Y)$  páré, ahol  $Z$  egy  $Y$ -től független standard normális valószínűségi változó.

b) Ennek segítségével mutassuk meg, hogy az  $X, Y$  pár kétdimenziós normális eloszlású.

c) Számítsuk ki az  $\mathbf{E}X, \mathbf{D}^2X, \mathbf{Corr}(X, Y)$  mennyiségeket.

d) Határozzuk meg  $\mathbf{E}(Y | X = x)$  értékét.

e) Mi  $Y$  feltételes eloszlása az  $X = x$  feltétel mellett?