

# Második A4 gyakorlat

## 1. Feltételes valószínűség

Vizsgálhatjuk egy  $A$  esemény bekövetkezésének valószínűségét úgy is, hogy tudjuk, hogy egy másik  $B$  esemény már bekövetkezett. Például ha a lottón az első 4 szám talált, és még most húzzák az ötödik nyerőszámot, akkor nagyobb a telitalálat valószínűsége, mint a sorsolás megkezdése előtt. A feltételes valószínűség jelölése:  $P(A|B)$ . Olvasva:  $A$  valószínűsége feltéve  $B$ -t. Számítása:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

1. A barátommal snapszerozom. Ebben a játékban 20 darab lap van, minden színből 5. Kiosztok 5 – 5 lapot. Mi a valószínűsége, hogy az ellenfélnek van zöldje, ha nekem 3 zöldem és két pirosam van? És ha nem tudom milyen lapjaim vannak (még nem néztem meg)?
2. Egy szabályos kockával dobtam. Barátom látja a dobás eredményét, de én nem. Mennyi a valószínűsége, hogy párosat dobtam, ha barátomtól tudom, hogy legalább 4-est dobtam?
3. Feldobunk 2 kockát. Mi annak a valószínűsége, hogy legalább az egyik kockán 2-est dobunk, ha már tudjuk, hogy a dobott számok összege 6? És ha nem tudunk semmit?
4. Egy iskolába 260 ember jár, 230 tanuló és 30 tanár. Egyszer egy influenzajárvány tört ki köztük. Az orvos az alábbi táblázatot készítette:

	Beteg	Egészséges	Összesen	Esemény
Fiú	50	60	110	B1
Lány	40	80	120	B2
Tanár	10	20	30	B3
Összesen	100	160	260	
Esemény	A1	A2		

- a) Véletlenszerűen kihúzzuk egy kartont. Mi a valószínűsége, hogy: i) fiúé? ii) betegé? iii) beteg fiúé?
- b) Ha előzetesen a fiúk, lányok és tanárok kartonjait külön fiókokba gyűjtötték, én a lányokéból húzok, mi a valószínűsége annak, hogy beteg lányt húztam?
- c) Az orvos szorgos asszisztense egy kupacba kidobálta a fiókokból az összes kartont, aki beteg volt. Ebből véletlenszerűen húzva egyet, mi a valószínűsége annak, hogy tanár az illető?
- d) Ha kettőt húzok ugyanebből a beteg-kupacból egymás után, mi a valószínűsége, hogy az első fiú lesz, a második lány? És hogy mindkettő fiú lesz?

## 2. Szorzási szabály

Feltételes valószínűségek szorzási szabálya (avagy toronyszabály):

$$P(A_n \cap A_{n-1} \cap \dots \cap A_1) = P(A_n | A_{n-1} \cap \dots \cap A_2 \cap A_1) \cdot P(A_{n-1} | A_{n-2} \cap \dots \cap A_2 \cap A_1) \cdot \dots \cdot P(A_3 | A_2 \cap A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1).$$

5. Egy urnában 3 piros, 5 fehér és 6 zöld golyó van. Kihúzzunk közülük 3 golyót. Mennyi a valószínűsége, hogy elsőre pirosat, másodikra fehéret, harmadikra zöldet húzzunk, ha húzás után a golyókat a) visszatesszük b) nem tesszük vissza?
6. Egy lakótelepen csótányirtást végeztek. Az első vegykezelés még a csótányok 60%-át irtja ki, de utána a csótányok egyre inkább immúnissá válnak, így a másodsorra már csak a 40%, harmadsorra pedig csak a 20%-uk pusztul el. Mi a valószínűsége, hogy egy megjelölt csótány a) átvészeli a teljes eljárást? b) az utolsó irtáskor pusztul el? c) túléli a kezelést, ha az első kezelés után még látták élve?
7. Egy dobozban 16 alkatrész közül 3 hibás. Mi a valószínűsége, hogy három egymás után kivett alkatrész működőképes?
8. Egy valszámvizsgán 30 tétel van. Ezek közül 6 a nevezetes eloszlásokkal kapcsolatos. Az első két szóbeliző hallgató kihúz egy-egy tételt. Mi annak a valószínűsége, hogy a) csak az első hallgató húz nevezetes eloszlásos tételt? b) mindkét hallgató ilyen tételt húz (húzhatják mindketten ugyanazt is!) c) egyik sem húz ilyen tételt?

### 3. Teljes valószínűség tétele

Ha  $H_n, H_{n-1}, H_{n-2}, \dots, H_2, H_1$  teljes eseményrendszer alkot (azaz páronként diszjunktak és együtt kiadják a biztos eseményt),  $A$  pedig tetszőleges esemény, akkor:

$$P(A) = P(A|H_n) \cdot P(H_n) + P(A|H_{n-1}) \cdot P(H_{n-1}) + \dots + P(A|H_1) \cdot P(H_1).$$

9. Egy sulis tanulóinak 80%-a lány. Az első matekvizsgán általában a lányok 15%-át, a fiúk 10%-át húzzák meg. A hallgatóságnak hány %-a bukik meg az első vizsgán?
10. Információink szerint az  $A$  céggel kötött üzleteink 60%-a, a  $B$  céggel kötött üzletek 70%-a bizonyul kedvezőnek. Kettőjük közül a hamarabb jelentkező céggel rögtön két üzletet is kötünk. Feltehető, hogy 1/2 valószínűséggel jelentkezik hamarabb  $A$   $B$ -nél, és fordítva. Mi a valószínűsége, hogy a) az első üzletkötés kedvező lesz? b) mindkét üzletkötés javunkra válik? c) lesz köztük rossz és jó üzlet is?
11. Iszákos Iván a nap 2/3 részét kocsmában tölti. Mivel a faluban 5 kocsmában van, és nem válogatós, azonos eséllyel tartózkodik bármelyikben. Egyszer elindulunk, hogy megkeressük. Négy kocsmát már végigjártunk, de nem találtuk. Mi a valószínűsége annak, hogy az ötödikben ott lesz?
12. Ping-pongban az a nyertes, aki előbb éri el a 11 pontot, de legalább 2 pont különbség kell a nyéréshez (11-10-nél folytatják két pont különbségig). Egy versenyen csak a nyertes kap pénzdíjazást: 1.000.000 Ft-ot. Két azonos képességű játékosnál a döntő szettben 10-9-es állásnál áramszünet lesz, nem lehet folytatni. Mi az igazságos osztozkodás a pénzen?

### 4. Bayes tétel

Ha tudjuk, hogy  $A$  már bekövetkezett, mi annak a valószínűsége, hogy ez pontosan  $H_i$  eseménnyel valósult meg? (Itt  $H_1, H_2, \dots, H_n$  ismételtelen teljes eseményrendszer alkot.) A definíció szerinti képletet felírva a számlálóban a feltételes valószínűségekre, és a nevezőben a teljes valószínűség képletét alkalmazva adódik a következő képlet:

$$P(H_i|A) = \frac{P(A \cap H_i)}{P(A)} = \frac{P(A|H_i) \cdot P(H_i)}{P(A|H_n) \cdot P(H_n) + \dots + P(A|H_1) \cdot P(H_1)}.$$

13. A ketyere gyárban az A, B és C gépsoron állítják elő a ketyeréket. Az A gépsoron a ketyerék 25, a B-n 35, a C-n 40%-át gyártják. Az A gépsoron előállított ketyerék 5%-a, a B gépsoron előállítottak 4%-a, a C-n gyártott ketyeréknek csak 2%-a hibás. A hibásakat félredobják egy nagy kupacba. Ebből véletlenszerűen kiszedve egy ketyerét, mi a valószínűsége, hogy azt az A, B, illetve a C gépsoron gyártották?
14. Vándorlásai közben Odüsszeusz egy hármás útelágazáshoz ér. Az egyik út Athénbe, a másik Spártába, a harmadik Mükénébe vezet. Az athéniak kereskedő népség, szeretik ámítani a látogatókat, csak minden 3. alkalommal mondanak igazat. A mükénéiek egy fokkal jobbak: ők csak minden második alkalommal hazudnak. A szigorú spártai neveletésnek köszönhetően a spártaiak becsületesek, ők mindig igazat mondanak. Odüsszeusznak fogalma sincs, melyik út merre vezet, így feldob egy kockát, egyenlő esélyt adva mindegyik útnak. Megérkezve a városba, megkérdezi egy embert, mennyi  $2 \times 2$ , mire közli vele, hogy 4. Mi a valószínűsége, hogy Odüsszeusz Athénba jutott?
15. Az igazak városában az emberek 90%-a igazat mond, a hazugok városában az emberek 85%-a hazudik. Mivel lefüggönyözött busszal hoztak ide minket, nem tudjuk melyikben vagyunk. Megkérdezzük egy embert, aki azt mondja, hogy "Ez a hazugok városa." Mi a valószínűsége, hogy igazat mond?
16. Egy bináris csatornán a 0 jelet  $1/3$ , az 1 jelet  $2/3$  valószínűséggel adják le. Mivel az adást zajok zavarják, ha 0-t adnak le, akkor  $1/4$  valószínűséggel 1 érkezik, ha pedig 1-et adnak le,  $1/5$  valószínűséggel 0 érkezik.
- Kaptunk egy 0-t. Mi a valószínűsége, hogy ezt 0-ként is adták le?
  - Mi a valószínűsége, hogy 1-et kapunk?
17. Tegyük fel, hogy a lakosság 0.001-ed része szenved egy bizonyos ártalmas betegségben, 0.999-ed része egészséges. A betegség kimutatására szolgáló teszt olyan, hogyha valaki beteg, akkor 0.998 valószínűséggel betegséget jelez, 0.002 valószínűséggel azt mutatja, hogy az illető egészséges; ha pedig egészséges emberen végzik el a tesztet, akkor 0.995 valószínűséggel egészségesnek diagnosztizálja az illetőt, 0.005 valószínűséggel betegnek. Tegyük fel, hogy Móricka tesztje pozitív, vagyis betegnek mutatja a teszt. Mi a valószínűsége annak, hogy Móricka tényleg beteg?

## 5. Független események

Az  $A, B$  események függetlenek akkor és csak akkor, ha teljesül, hogy  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

Több esemény függetlensége esetén nem csak annak kell teljesülnie, hogy

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) \dots P(A_n),$$

hanem tetszőleges  $A_i$ -k helyett mindkét oldalon azok komplementerét véve is igaz az egyenlőség, például:

$$P(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4} \cap \dots \cap A_n) = P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3})P(\overline{A_4}) \dots P(A_n).$$

Ilyen egyenletből  $2^n$  darab van. Fordítva is igaz: ha az összes így származtatott egyenlet fennáll, akkor az  $A_1, A_2, \dots, A_n$  eseményekről azt mondjuk, hogy együttesen függetlenek.

18. Kétszer egymás után feldobunk egy szabályos pénzérmét. Legyen  $A$  az az esemény, hogy elsőre fejet dobunk,  $B$  az az esemény, hogy másodikkra dobunk fejet,  $C$  pedig, hogy a dobások egyezők. Győződjünk meg róla, hogy  $A, B, C$  eseményekből bármely kettő független egymástól, de a 3 esemény együttesen már nem alkot független rendszert!
19. Egy piros és egy zöld kockával dobunk. Tekintsük az alábbi eseményeket:  $A =$  a dobott számok összege 7,  $B =$  legalább az egyik kockán van hatos,  $C =$  mindkét kockával páratlant dobok,  $D =$  a két kockával különböző számokat dobok,  $E =$  a zöld kockával 4-est dobok.
- Válaszoljunk meg a következő kérdéseket:

- a) Függetlenek-e egymástól az  $A$  és  $C$  események?
- b) Kizáróak-e az  $A$  és  $C$  események?
- c) Mennyi a  $B$  esemény valószínűsége?
- d) Hogy viszonyul egymáshoz  $A$  és  $D$ ? Milyen következtetést vonhatunk le ebből a valószínűségeikre nézve? És a függetlenségekre nézve?
- e) Függetlenek-e egymástól az  $A$  és  $E$  események?
- f) Mindezek alapján mutassunk példát olyan eseményekre, amelyek
  - i. függetlenek, de nem kizáróak,
  - ii. kizáróak, de nem függetlenek.

## 6. További feladatok

20. Az  $A$  dobókockának 4 piros és 2 fehér oldala van, a  $B$  kockának pedig 2 piros és 4 fehér. Először feldobunk egy szabályos érmét. Ha fej, akkor a továbbiakban mindig az  $A$  kockával játszunk; ha írás, akkor pedig mindig a  $B$  kockával.
- a) Mutassa meg, hogy a piros dobásának valószínűsége mindig  $\frac{1}{2}$ .
  - b) Ha az első két dobás piros, mi a valószínűsége, hogy a harmadik is piros?
  - c) Ha az első három dobás piros, akkor mi a valószínűsége, hogy az  $A$  kockát használjuk? (Csak a kocka felső lapját látjuk, a kocka többi oldalát nem.)
21. (*Felületes utazó*) Egy utazó az íróasztalában, a nyolc fiók egyikében hagyta az útlevelet. Mielőtt a repülőtérre indulna, kapkodva próbálja megtalálni. A kapkodás miatt 0, 1 valószínűséggel akkor sem veszi észre az útlevelet, ha az éppen megnézett fiókban van.
- a) Mi a valószínűsége, hogy nem találja meg az első 5 fiókban?
  - b) Ha nem találta meg az első 5 fiókban, mi a valószínűsége, hogy az útlevelet nem is volt ezekben?
22. Az  $A$  városból a  $B$  városba három diszjunkt út vezet. Egy havas téli éjszakán  $A$ -ból  $B$ -be kell mennünk, és a rádiót hallgatjuk, hogy hol vannak az utakon hótorlaszok. Korábbi tapasztalatból tudjuk, hogy mind a három úton három kritikus pont van, amelyek mindegyike, egymástól függetlenül,  $p$  valószínűséggel járhatatlan a hó miatt. Mi a valószínűsége, hogy éjszaka el tudunk jutni  $A$ -ból  $B$ -be?
- 23.
- a) Minden héten egy szelvényvel játszunk az ötös lottón. Hány hétig kell ezt megtennünk, hogy legalább  $\frac{1}{2}$  valószínűséggel legyen legalább kettes találatunk?
  - b) Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten legalább kettes találatunk lesz, ha két függetlenül kitöltött szelvényvel játszunk?
  - c) Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten legalább kettes találatunk lesz, ha két olyan szelvényvel játszunk, amelyeken nincsen egyforma szám? (Segítség: A 90 számot ossza háromfelé: 5+5 szám van a szelvényeken, 80 szám pedig nincs egyikén sem.)
24. (*Nehéz feladat!*) Szindbád, az Ezeregyéjszaka meséinek híres hőse,  $N$  háremhölgy közül szeretné kiválasztani a legszebbet, akik egyesével elsétálnak előtte. Szindbád az ún.  $K$ -stratégiával választ közülük: hagyja, hogy  $K$  lány elsétáljon előtte (ezek közül semmiképpen nem választ), majd kiválasztja az első olyat, aki minden korábban látottnál szebb. Feltéve, hogy a lányok között szépség szempontjából egyértelmű rendezés van, és egy teljesen véletlen sorrendben jönnek elő, mi a valószínűsége, hogy Szindbád ki tudja választani a legszebbet a  $K$ -stratégiával? Kb. mennyi az optimális  $K$  érték, ha  $N$  nagy? (Segítség: Alkalmazza a teljes valószínűség formuláját azokkal az  $A_r$  eseményekkel, hogy a legszebb lány  $r$ -ediként jelenik meg,  $r = 1, 2, \dots, N$ . Határozza meg annak az eseménynek a feltételes valószínűségét, hogy az első  $r - 1$  ( $r > K + 1$ ) lányból a legcsinosabb nem esik az első  $K$  lány közé! Ugyanis ekkor Szindbád hibázni fog.)