

1. feladat (12 pont)

Milyen $x \in \mathbb{R}$ esetén konvergens az alábbi sor? Adjuk meg a hatványsor összegfüggvényét is!

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{x^{2k+3}}{(2k)!}$$

Mo. Minden $x \in \mathbb{R}$ esetén **(3p)**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+3}}{(2k)!} \stackrel{(3p)}{=} x^3 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \stackrel{(6p)}{=} x^3 \operatorname{ch}(x).$$

2. feladat (18 pont)

Határozzuk meg az alábbi függvény $x_0 = 0$ körüli Taylor-sorfejtését, Taylor-sorának konvergenciasugarát és az $f^{(100)}(0)$ deriváltat!

$$f(x) := \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \quad (x \in \mathbb{R})$$

Mo.

$$\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \stackrel{(3p)}{=} (1+4x^2)^{-\frac{1}{2}} \stackrel{(3p)}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{k} (4x^2)^k \stackrel{(2p)}{=} \sum_{k=0}^{\infty} 4^k \binom{-\frac{1}{2}}{k} x^{2k},$$

ahol a (*) egyenlőség $|x| < \frac{1}{2}$ esetén teljesül a binomiális sorfejtés alapján **(2p)**, tehát a Taylor-sor konvergenciasugara $\frac{1}{2}$ **(2p)**.

Minden $k \in \mathbb{N}$ esetén legyen $a_{2k} := 4^k \binom{-\frac{1}{2}}{k}$ **(2p)**. Ekkor (az előadáson tanultak alapján)

$$f^{(100)}(0) = a_{100} \cdot 100! = 4^{50} \binom{-\frac{1}{2}}{50} \cdot 100! \quad (4p).$$

3. feladat (6+10=16 pont)

Legyen

$$f(x, y) := y^2 \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2x^2 + y^4} \right) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}).$$

a) Mit mond ki a függvényhatárértékre vonatkozó átviteli elv? ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvények esetén)

b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = ?$

Mo. a) Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, $\underline{a} \in \operatorname{Dom}(f)$ **(2p)** és $b \in \mathbb{R}$. Ekkor

$$\lim_{\underline{x} \rightarrow \underline{a}} f(\underline{x}) = b \iff \begin{aligned} &\underline{x}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \underline{a} \Rightarrow f(\underline{x}_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b \\ &\forall (\underline{x}_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ sorozatra, amely } \operatorname{Dom}(f) \setminus \{\underline{a}\} \text{-ban halad.} \end{aligned} \quad (4p)$$

b) Tegyük fel, hogy $(x_k, y_k)_{k \in \mathbb{N}}$ olyan $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ -ban haladó sorozat, amelyre $(x_k, y_k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (0,0)$ **(2p)**. Ekkor

$$f(x_k, y_k) \stackrel{(4p)}{=} \underbrace{y_k^2}_{\xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0} \cdot \underbrace{\arctg\left(\frac{1}{2x_k^2 + y_k^4}\right)}_{\text{korlátos } \left(\xrightarrow{k \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}\right)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad (2p)$$

tehát az átviteli elv alapján $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ **(2p)**. (Akkor is adható maximális pont, ha a megoldásban nem szerepel az átviteli elv.)

4. feladat (10+4=14 pont)

Legyen

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{3x^3 + 2y^3}{x^2 + 4y^4} & , \text{ ha } (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \\ 0 & , \text{ ha } (x, y) = (0,0). \end{cases}$$

- a) Határozzuk meg f parciális deriváltjait \mathbb{R}^2 minden pontjában!
 b) A sík mely pontjaiban differenciálható (totálisan) f ?

Mo. a) Ha $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ **(1p)**, akkor

$$\partial_1 f(x, y) = \frac{9x^2(x^2 + 4y^4) - (3x^3 + 2y^3)2x}{(x^2 + 4y^4)^2} \quad (2p)$$

$$\partial_2 f(x, y) = \frac{6y(x^2 + 4y^4) - (3x^3 + 2y^3)16y^3}{(x^2 + 4y^4)^2} \quad (2p).$$

Az origóbeli parciális deriváltakat a definíció segítségével tudjuk kiszámolni **(1p)**:

$$\partial_1 f(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^3}{x^3} = 3 \quad (2p)$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2y^3}{4y^5} = +\infty,$$

azaz $\partial_2 f(0,0)$ nem létezik **(2p)**.

b) Az origóban nem differenciálható f , mert nem létezik az origóbeli második változó szerinti parciális deriváltja **(2p)**, a sík többi pontjában pedig differenciálható, mert $\partial_1 f$ és $\partial_2 f$ folytonos az $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ (nyílt) halmazon **(2p)**.

5. feladat (18+6+6=30 pont)

Legyen

$$f(x, y) := x^4 + y^4 + 4xy \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

- a) Határozzuk meg f lokális szélsőértékeit és ezek típusát!

b) Számítsuk ki az f függvény $(1, 1)$ pontbeli $\underline{v} := \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1)$ irány menti deriváltját!

c) Határozzuk meg az f függvény $(1, 1)$ pontbeli érintősíkjának egyenletét!

Mo. a) Minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$\partial_1 f(x, y) = 4x^3 + 4y \quad (\mathbf{1p}) \quad \partial_2 f(x, y) = 4y^3 + 4x \quad (\mathbf{1p})$$

$$\left. \begin{array}{l} 4x^3 + 4y = 0 \\ 4y^3 + 4x = 0 \end{array} \right\} \quad (\mathbf{2p}) \quad \Leftrightarrow \quad (x, y) \in \{(0, 0), (1, -1), (-1, 1)\} \quad (\mathbf{3p}),$$

és f a sík minden pontjában differenciálható, tehát csak a fenti három pontban lehet lokális szélsőértéke $(\mathbf{1p})$. Minden $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ esetén (f másodrendű parciális deriváltjai a sík minden pontjában folytonosak)

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 12x^2 & 4 \\ 4 & 12y^2 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{2p}),$$

tehát

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad H_f(1, -1) = \begin{pmatrix} 12 & 4 \\ 4 & 12 \end{pmatrix} = H_f(-1, 1) \quad (\mathbf{3p})$$

azaz $H_f(0, 0)$ indefinit, $H_f(1, -1) = H_f(-1, 1)$ pozitív definit (pl. főminorokkal indokolva) $(\mathbf{3p})$, következésképpen az origóban nincs lokális szélsőértéke f -nek, és az $(1, -1)$ és $(-1, 1)$ pontokban pedig lokális minimuma van $(\mathbf{2p})$.

b) Az előző részben láttuk, hogy $\text{grad}f(1, 1)$ létezik $(\mathbf{1p})$, ezért

$$D_{\underline{v}}f(1, 1) \stackrel{(\mathbf{2p})}{=} \langle \text{grad}f(1, 1), \underline{v} \rangle \stackrel{(\mathbf{2p})}{=} \left\langle (8, 8), \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1) \right\rangle \stackrel{(\mathbf{1p})}{=} 0.$$

c) Az érintősík egy normálvektora:

$$(\partial_1(1, 1), \partial_2(1, 1), -1) = (8, 8, -1) \quad (\mathbf{2p}),$$

egy pontja:

$$(1, 1, f(1, 1)) = (1, 1, 6) \quad (\mathbf{2p}),$$

tehát az érintősík egyenlete

$$8(x - 1) + 8(y - 1) - (z - 6) = 0 \quad (\Leftrightarrow \quad 8x + 8y - z = 10) \quad (\mathbf{2p}).$$

6. feladat (10 pont)

Számítsuk ki az

$$\int_0^1 \int_y^1 e^{\frac{1}{2}x^2} dx dy$$

integrál értékét!

Mo.

$$H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\} \stackrel{(2\text{p})}{=} \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

H normáltartomány **(1p)**, tehát

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 e^{\frac{1}{2}x^2} dx dy &\stackrel{(2\text{p})}{=} \int_H e^{\frac{1}{2}x^2} d(x, y) \stackrel{(2\text{p})}{=} \int_0^1 \int_0^x e^{\frac{1}{2}x^2} dy dx \stackrel{(1\text{p})}{=} \int_0^1 x e^{\frac{1}{2}x^2} dx \stackrel{(1\text{p})}{=} \\ &= \left[e^{\frac{1}{2}x^2} \right]_{x=0}^1 \stackrel{(1\text{p})}{=} \sqrt{e} - 1. \end{aligned}$$

IMSc feladat (15 IMSc pont) Legyen $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges $G \subseteq \mathbb{R}$ nyílt halmaz esetén az $f^{-1}(G) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \in G\}$ is nyílt halmaz \mathbb{R}^n -ben! (Segítség: használjuk a nyíltság és a pontbeli folytonosság definícióját.)

Mo. Legyen $\underline{a} \in f^{-1}(G)$; megmutatjuk, hogy létezik olyan $\delta > 0$, hogy $B_\delta(\underline{a}) \subseteq f^{-1}(G)$ **(3p)**. Mivel $f(\underline{a}) \in G$ és G nyílt halmaz \mathbb{R} -ben, ezért létezik olyan $\varepsilon > 0$, hogy

$$]f(\underline{a}) - \varepsilon, f(\underline{a}) + \varepsilon[\subseteq G \quad \mathbf{(4p)}.$$

Az f függvény \underline{a} -beli folytonossága miatt létezik olyan $\delta > 0$, hogy minden $\underline{x} \in \mathbb{R}^n$ és $|\underline{x} - \underline{a}| < \delta$ esetén

$$f(\underline{x}) \in]f(\underline{a}) - \varepsilon, f(\underline{a}) + \varepsilon[\subseteq G \quad \mathbf{(5p)},$$

azaz $\underline{x} \in B_\delta(\underline{a})$ esetén $\underline{x} \in f^{-1}(G)$ teljesül **(3p)**.