

\* 1. feladat (12+12=24 pont)

a)

$$\int_0^1 \int_y^1 \sin(x^2) dx dy = ?$$

(Próbálkozzunk az integrálok sorrendjének felcserélésével.)

b)

$$\int_H \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} d(x, y, z) = ?,$$

ahol  $H := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 4 \leq x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0, 0 \leq z \leq 2\}$

---

Mo. a) Legyen  $f(x, y) := \sin(x^2)$  ( $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ ) és  $H := \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1\}$ . Ekkor  $H$  normáltartomány és  $f$  folytonos (1p), továbbá  $H = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$  (1p)

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_y^1 \sin(x^2) dx dy &= \int_H f \stackrel{(3p)}{=} \int_0^1 \int_0^x \sin(x^2) dy dx \stackrel{(2p)}{=} \int_0^1 x \sin(x^2) dx \stackrel{(3p)}{=} \\ &= \frac{1}{2} [-\cos(x^2)]_{x=0}^1 \stackrel{(2p)}{=} \frac{1 - \cos(1)}{2}. \end{aligned}$$

b) Hengerkoordinátákkal,  $H = \underline{C}([2, 3] \times [0, \pi] \times [0, 2])$

$$\int_H f \stackrel{(6p)}{=} \int_2^3 \int_0^\pi \int_0^2 f(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi), z) \cdot r dz d\varphi dr \stackrel{(3p)}{=} \int_2^3 \int_0^\pi \int_0^2 1 dz d\varphi dr \stackrel{(3p)}{=} 2\pi.$$

(Normáltartományos próbálkozásért maximum 2 pont adható.)

---

\* 2. feladat (6+4=10 pont)

Legyen  $f$  az a  $2\pi$  szerint periodikus függvény, amelyre

$$f(x) := \begin{cases} x^2 + \pi & , \text{ ha } x \in [-\pi, 0[ \\ -x & , \text{ ha } x \in [0, \pi[. \end{cases}$$

a) Jelölje  $\Phi$  az  $f$  függvény Fourier-sorának összegfüggvényét. Adjuk meg a  $\Phi(0)$  és  $\Phi(1)$  értékeket

b) Egyenletesen konvergens-e  $\mathbb{R}$ -en az  $f$  függvény Fourier-sora? (Indokoljunk.)

---

Mo. a) Az  $f$  függvényre teljesülnek a Dirichlet-tétel feltételei (2p), ezért

$$\Phi(0) \stackrel{(2p)}{=} \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad \Phi(1) \stackrel{(2p)}{=} f(1) = -1$$

b) Nem, mert ha egyenletesen konvergens lenne, akkor  $\Phi$  folytonos lenne (2p), azonban  $\Phi$  pl. a 0-ban nem folytonos (2p).

**3. feladat (6+10=16 pont)**

Mondjuk ki és bizonyítsuk be a numerikus sorokra vonatkozó hányadoskritériumot. (Bármelyik verziót.)

*Mo. Tétel:* Legyen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  pozitív tagú sorozat **(2p)**. Ekkor a következő állítások teljesülnek.

- Ha  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ , akkor a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  sor konvergens. **(2p)**
- Ha  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ , akkor a  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  sor divergens. **(2p)**

(Egyéb verziók is elfogadhatók.)

*Bizonyítás.* Tegyük fel, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ , és legyen  $q \in \mathbb{R}$  olyan, hogy  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < q < 1$  **(2p)**. Ekkor létezik olyan  $N \in \mathbb{N}$ , hogy minden  $n \in \mathbb{N}$  és  $n \geq N$  esetén

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q \Leftrightarrow a_{n+1} \leq qa_n \quad \mathbf{(1p)}.$$

Teljes indukcióval kapjuk, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$  és  $n \geq N$  esetén

$$a_n \leq q^{n-N} a_N = q^n \frac{a_N}{q^N} \quad \mathbf{(2p)},$$

és  $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n \frac{a_N}{q^N}$  konvergens, tehát a majoráns kritérium alapján  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  konvergens **(1p)**.

A második rész bizonyításához tegyük fel, hogy  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ . Ekkor létezik olyan  $N \in \mathbb{N}$ , hogy minden  $n \in \mathbb{N}$  és  $n \geq N$  esetén

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Leftrightarrow a_{n+1} > a_n, \quad \mathbf{(2p)},$$

tehát teljes indukcióval kapjuk, hogy minden  $n \in \mathbb{N}$  és  $n \geq N$  esetén  $a_n > a_N$  **(1p)**. Ez azt jelenti, hogy  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  nem tart 0-hoz így, azaz nem teljesül a sorok konvergenciájának szükséges feltétele **(1p)**, következésképpen  $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$  divergens.

**4. feladat (plusz 10 pontért)**

Legyen  $n \in \mathbb{N}^+$ . Bizonyítsuk be, hogy ha az  $\mathbb{R}^n$ -beli  $A$  és  $B$  halmazok nyíltak, akkor  $A \cap B$  is nyílt.

*Mo.* Ha  $A \cap B = \emptyset$ , akkor a nyíltság definíciója alapján teljesül az állítás **(2p)**. Ellenkező esetben legyen  $\underline{x} \in A \cap B$  tetszőleges. Ekkor  $A$  és  $B$  nyíltsága alapján létezik olyan  $r_1 > 0$  és  $r_2 > 0$ , hogy  $B_{r_1}(\underline{x}) \subseteq A$ , illetve  $B_{r_2}(\underline{x}) \subseteq B$  **(4p)**, tehát az  $r := \min\{r_1, r_2\}$  választással  $B_r(\underline{x}) \subseteq A \cap B$  teljesül **(3p)**. Mivel  $\underline{x}$  tetszőleges volt, ez azt jelenti, hogy  $A \cap B$  nyílt **(1p)**.