

Altér, generátorrendszer, lineáris függetlenség

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÁSELMÉLETBE 1

6. gyakorlat

2021.

Altér.

A $\emptyset \neq V \subseteq \mathbb{R}^n$ részhalmazt az \mathbb{R}^n egy alterének nevezzük, ha V zárt az összeadásra és a skalárral való szorzásra nézve.

Lineáris kombináció.

Legyen $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k \in \mathbb{R}^n$ és $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$. A $\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_k \underline{v}_k$ vektort a $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ vektorok $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ skalárokkal vett lineáris kombinációjának nevezzük.

Generált altér.

Legyen $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k \in \mathbb{R}^n$. A

$$\langle \underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k \rangle := \{ \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_k \underline{v}_k \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \}$$

halmazt a $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k$ vektorok által generált altérnek nevezzük.

Lineáris függetlenség.

A $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k \in \mathbb{R}^n$ vektorrendszerrel azt mondjuk, hogy lineárisan független, ha

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_k \underline{v}_k = \underline{0} \iff \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0;$$

ellenkező esetben lineárisan összefüggő vektorrendszerrel beszélünk.

Az újonnan érkező vektor lemmája.

Ha az $\underline{f}_1, \underline{f}_2, \dots, \underline{f}_k$ rendszer lineárisan független, de az $\underline{f}_1, \underline{f}_2, \dots, \underline{f}_k, \underline{f}_{k+1}$ rendszer lineárisan összefüggő, akkor $\underline{f}_{k+1} \in \langle \underline{f}_1, \underline{f}_2, \dots, \underline{f}_k \rangle$ (vagyis \underline{f}_{k+1} kifejezhető az $\underline{f}_1, \underline{f}_2, \dots, \underline{f}_k$ lineáris kombinációjaként).

1. Legyen

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \underline{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \underline{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ és } \underline{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Határozzuk meg az alábbi vektorrendszerek által generált alteret, majd döntsük el, hogy a vektorrendszerek lineárisan függetlenek-e.

(a) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}$

(b) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}, \underline{a}$

(c) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}, \underline{b}$

2. Legyen

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \underline{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \underline{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ és } \underline{e} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Határozzuk meg az alábbi vektorrendszerek által generált alteret, majd döntsük el, hogy a vektorrendszerek lineárisan függetlenek-e.

(a) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}$

(b) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{e}$

(c) $\underline{u}, \underline{e}$

(d) $\underline{u}, \underline{v}, \underline{w}, \underline{e}$

3. Döntsük el, hogy lineárisan függetlenek-e az alábbi vektorrendszerek és határozzuk meg az általuk generált altér egyenletét.

$$(a) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 15 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

4. A p valós paraméter milyen értékeire lineárisan függetlenek-e az alábbi, \mathbb{R}^4 -beli vektorok?

$$\underline{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ p \end{pmatrix}, \quad \underline{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ p \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \underline{w} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ p \end{pmatrix}$$

5. Generátorrendszert alkotnak-e az alábbi, \mathbb{R}^3 -beli vektorok?

$$\underline{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \underline{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

6. Legyen \underline{a} , \underline{b} , \underline{c} lineárisan független vektorrendszer egy tetszőleges vektortérben. Bizonyítsuk be, hogy ekkor az $\underline{a} - \underline{b}$, $\underline{a} - \underline{c}$, $\underline{b} + \underline{c}$ vektorrendszer is lineárisan független.

7. Az $\underline{a}, \underline{b}, \underline{c} \in \mathbb{R}^n$ vektorok lineárisan függetlenek. Következik-e ebből, hogy a $3\underline{a} - \underline{b}$, $2\underline{a} + \underline{c}$ és $4\underline{b} - 3\underline{c}$ vektorok is mindig lineárisan függetlenek?

8. Döntsük el, hogy az \mathbb{R}^4 vektortérben alteret alkotnak-e az alábbi részhalmazok.

$$(a) \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mid x_3 = 0 \right\}$$

$$(b) \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mid x_2 = 1 \right\}$$

9. Alteret alkotnak-e \mathbb{R}^4 -ben azok a vektorok, melyek koordinátái (felülről lefelé)

(a) számtani sorozatot alkotnak;

(b) mértani sorozatot alkotnak?

10. Nevezzünk egy \mathbb{R}^5 -beli vektort Fibonacci-típusúnak, ha a (felülről számítva) harmadiktól kezdve mindegyik eleme a fölötte álló két elem összege. Így például az alábbi vektor Fibonacci-típusú. Igaz-e, hogy a Fibonacci-típusú vektorok alteret alkotnak \mathbb{R}^5 -ben?

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

11. Tegyük fel, hogy az $\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_m$ vektorok között pontosan egy olyan van, ami kifejezhető a többi lineáris kombinációjaként. Mutassuk meg, hogy ekkor ez a vektor csakis a nullvektor lehet.

12. Az \mathbb{R}^n -beli $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_k$ vektorokról tudjuk, hogy az összegük a nullvektor. Bizonyítsuk be, hogy

$$\langle \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{k-1} \rangle = \langle \underline{v}_2, \underline{v}_3, \dots, \underline{v}_k \rangle.$$

13. Tegyük fel, hogy az (\mathbb{R}^n -beli) $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{10}$ vektorok lineárisan összefüggők, de közülük bármely 9-et kiválasztva lineárisan független vektorrendszert kapunk. Mutassuk meg, hogy a $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{10}$ vektorok bármely $\underline{0}$ -t adó lineáris kombinációjában vagy mindegyik együttható 0 vagy egyik együttható sem 0. (Azaz: mutassuk meg, hogy $\lambda_1 \cdot \underline{v}_1 + \lambda_2 \cdot \underline{v}_2 + \dots + \lambda_{10} \cdot \underline{v}_{10} = \underline{0}$ esetén $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{10} = 0$ vagy $\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_{10} \neq 0$ teljesül.)