

Intervallumgráfok, görög betűk

Bevezetés a számításelméletbe 2

6. gyakorlat

Tétel

Minden G intervallumgráfra $\chi(G) = \omega(G)$ teljesül.


Állítás

Minden G gráfra $\nu(G) \leq \tau(G)$ teljesül.


Állítás

Minden G gráfra $\alpha(G) \leq \rho(G)$ teljesül.

1. Tekintsük azokat az intervallumokat a számegyenesen, amelyeknek mindkét végpontja 0 és 7 közötti egész, a hosszuk pedig 2 vagy 3. Adjuk meg az ezek által meghatározott intervallumgráf egy optimális színezését.
2. Döntsük el, hogy az alábbi gráfok intervallumgráfok-e.



3. Létezik-e 5 csúcsú, 8 élű intervallumgráf?
4. Tekintsük azokat az intervallumokat a számegyenesen, amelyeknek mindkét végpontja 1 és 100 közötti egész szám, a hosszuk legalább 1 és legfeljebb 4, valamint legalább az egyik végpontjuk páros szám. Határozzuk meg az ezek által meghatározott intervallumgráf kromatikus számát!
5. Egy adott intervallumrendszerhez tartozó intervallumgráf kromatikus száma 10. Mutassuk meg, hogy ha az intervallumrendszerből törölünk néhány olyan intervallumot, melyek közt semelyik háromnak nincs közös pontja, akkor a visszamaradó intervallumrendszerhez tartozó intervallumgráf kromatikus száma legalább 8.
6. Határozzuk meg az összes olyan fát, amely egyben intervallumgráf is.
7. A $2k$ csúcsú G egyszerű gráfban a nemszomszédos u és v csúcsok foka $k - 1$, az összes többi csúcs foka legalább k (ahol $k > 1$ egész). Mutassuk meg, hogy G -ben van teljes párosítás.
8. Adjunk meg egy maximális független élhalmazt és csúcshalmazt, valamint egy minimális lefogó csúcshalmazt és élhalmazt az alábbi gráfokban.



9. Egy G gráf csúcsai legyenek a 100-nál nemnagyobb pozitív egészek. Két különböző csúcs pontosan akkor szomszédos G -ben, ha a megfelelő egészek legnagyobb közös osztója pontosan 2. Határozzuk meg $\nu(G)$ -t és $\tau(G)$ -t.
10. Bizonyítsuk be, hogy a $\tau(G) \leq 2\nu(G)$ egyenlőtlenség minden egyszerű G gráfra teljesül.
11. Bizonyítsuk be, hogy a $\chi(G) \cdot \alpha(G) \geq n$ egyenlőtlenség minden n csúcsú, hurokélmentes G gráfra teljesül.
12. Mennyi az $\alpha(G) + \nu(G)$ lehetséges legnagyobb értéke, ha G tetszőleges 100 csúcsú gráf lehet?
13. Mutassuk meg, hogy ha egy G gráf valamely párosítása tovább már nem bővíthető (azaz nincs olyan él a gráfban, melyet hozzávéve párosítás marad), akkor legalább feleannyi élet tartalmaz, mint G egy maximális párosítása.
14. Legyen G és H két gráf ugyanazon a V csúcshalmazon, J pedig az a gráf, melynek csúcshalmaza szintén V , élhalmaza pedig G és H élhalmazainak uniója. Mutassuk meg, hogy $\chi(J) \leq \chi(G) + \tau(H)$.