

Mátrixok inverze, rangja
A SZÁMÍTÁSTUDOMÁNY ALAPJAI
13. gyakorlat
2023.

Inverz mátrix.

Egy A $n \times n$ -es mátrix inverzén azt az $n \times n$ -es A^{-1} mátrixot értjük, melyre $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$ teljesül.

Tétel.

Az $n \times n$ -es A mátrixnak akkor és csak akkor létezik inverze, ha $\det A \neq 0$.

Definíció.

Legyen A tetszőleges mátrix. Azt mondjuk, hogy

- (i) A oszloprangja r , ha A -nak van r darab lineárisan független oszlopa, de $r + 1$ darab már nincs;
- (ii) A sorrangja r , ha A -nak van r darab lineárisan független sora, de $r + 1$ darab már nincs;
- (iii) A determinánsrangja r , ha A -nak van $r \times r$ -es nemnulla determinánsú részmátrixa, de $(r + 1) \times (r + 1)$ -es már nincs.

Tétel, definíció.

Tetszőleges A mátrix oszlop-, sor- és determinánsrangja egyenlő. Ezt a közös értéket nevezzük az A mátrix rangjának.

Állítás.

- (i) Ha $A, B \in \mathbb{R}^{n \times k}$, akkor $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$.
- (ii) Ha $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ és $B \in \mathbb{R}^{k \times \ell}$, akkor $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$.

1. Számoljuk ki a következő mátrixok inverzét, amennyiben azok léteznek.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -3 \\ 4 & 1 & -7 \\ 6 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

2. Határozzuk meg az alábbi A és B mátrixok hiányzó, betűkkel jelölt elemeit, ha tudjuk, hogy $B = A^{-1}$.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ -1 & x & 1 \\ y & z & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & p \\ q & 5 & r \\ s & -26 & 27 \end{pmatrix}$$

3. Az A és B $n \times n$ -es mátrixokról tudjuk, hogy $|A| \neq 0$, valamint hogy $AB = 0$. Határozzuk meg a B mátrixot.
4. Legyen A $m \times n$ -es (vagyis m sorból és n oszlopból álló), B pedig $n \times m$ -es (vagyis n sorból és m oszlopból álló) mátrix. Tegyük fel, hogy $n < m$. Bizonyítsuk be, hogy ekkor az AB mátrix nem invertálható.

5. Az A és B $n \times n$ -es mátrixokról tudjuk, hogy $|A| \neq 0$. Bizonyítsuk be, hogy egyértelműen léteznek olyan C és D $n \times n$ -es mátrixok, amelyekre $CA = B = AD$ teljesül.
6. Számoljuk ki a következő mátrixok rangját.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 1 & 4 & 7 & 10 & 13 \\ 1 & 5 & 9 & 13 & 17 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

7. Számoljuk ki a következő mátrixok rangját az x , illetve a p és q valós paraméterek függvényében.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & x \\ 1 & x & x \\ x & x & x \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 6 & 9 & -3 \\ 1 & 0 & 1 & p \\ 3 & 4 & q & 2 \end{pmatrix}$$

8. A 6×6 -os A mátrixra $r(A) = 4$. Mutassuk meg, hogy léteznek olyan B és C mátrixok, amelyekre $r(B) = r(C) = 2$ és $A = B + C$.
9. Mutassuk meg, hogy bármely 2×2 -es mátrixot ki lehet egészíteni két új sorral, majd két új oszloppal úgy, hogy olyan 4×4 -es mátrixot kapjunk, melynek van inverze.