

1. Igazoljuk, hogy a $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ vektorrendszerre az alábbi két állítás ekvivalens:

- a) ha $\sum_{k=1}^n c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$, akkor $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$,
- b) ha $n > 1$, akkor egyik vektor sem fejezhető ki a többi lineáris kombinációjaként, ha $n = 1$, akkor $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$.

Megoldás. ld. könyv 1.46. tétel.

2. Legyen $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $0 \leq c \leq 1$. Írjuk fel az \mathbf{x} és \mathbf{y} helyvektorok végpontjait összekötő szakaszt $c : (1 - c)$ arányban osztó pontba mutató vektort \mathbf{x} és \mathbf{y} lineáris kombinációjaként!

Megoldás. Válasz: $(1 - c)\mathbf{x} + c\mathbf{y}$. Az \mathbf{x} és \mathbf{y} helyvektorok végpontjain átmenő egyenes ponthalmaza az $\mathbf{x} + c(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ előállításból $\{(1 - c)\mathbf{x} + c\mathbf{y} : c \in \mathbb{R}\}$, a szakasz ponthalmaza $\{(1 - c)\mathbf{x} + c\mathbf{y} : 0 \leq c \leq 1\}$.

3 (Pithagorász). Mutassuk meg, hogy $|\mathbf{x} + \mathbf{y}|^2 = |\mathbf{x}|^2 + |\mathbf{y}|^2$ pontosan akkor igaz, ha $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.

Megoldás. ld. könyv 1.19. tétel.

4. Mutassuk meg, hogy tetszőleges $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ vektorokra $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{2} (|\mathbf{u} + \mathbf{v}|^2 - |\mathbf{u}|^2 - |\mathbf{v}|^2)$.

5. Definiáljuk $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$ vektorok skaláris szorzatát az $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{k=1}^n \bar{x}_k y_k$ képlettel. Mutassuk meg, hogy

- a) $\mathbf{x} \cdot (\lambda \mathbf{y}) = \lambda(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$, $(\lambda \mathbf{x}) \cdot \mathbf{y} = \bar{\lambda}(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y})$ és $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \overline{\mathbf{y} \cdot \mathbf{x}}$,
- b) (CBS) $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}| |\mathbf{y}|$

- 6. a) Számítsuk ki a komplex N -edik egységgyökök összegét.
- b) Számítsuk ki a komplex N -edik egységgyökök n -edik hatványainak összegét.

Megoldás. a) Legyen ε egy primitív N -edik egységgyök, ennek hatványai kiadják az összes N -edik egységgyököt. Ezek összege $N > 1$ esetén 0, ugyanis $(1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \dots + \varepsilon^{N-1})(1 - \varepsilon) = 1 - \varepsilon^N = 1 - 1 = 0$. Ha $N > 1$, akkor $\varepsilon \neq 1$, így az első tényező 0. b) N , ha n osztható N -nel, egyébként 0.

7. Legyen $\varepsilon \in \mathbb{C}$ egy primitív N -edik egységgyök. Igazoljuk, hogy ha $\mathbf{x}_k = (1, \varepsilon^k, \varepsilon^{2k}, \dots, \varepsilon^{(N-1)k})$ ($0 \leq k < N$), akkor

$$\mathbf{x}_k \cdot \mathbf{x}_j = \begin{cases} 0, & \text{ha } k \neq j, \\ N, & \text{ha } k = j. \end{cases}$$

Megoldás. Vegyük figyelembe, hogy $\bar{\varepsilon} = \varepsilon^{-1}$.

8. Tegyük fel, hogy a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^k$ vektorok lineárisan függetlenek. Függetlenek-e a következő vektorrendszerek?

- a) $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n$,
- b) $\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{n-1} - \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n - \mathbf{v}_1$,
- c) $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \dots, \mathbf{v}_{n-1} + \mathbf{v}_n, \mathbf{v}_n + \mathbf{v}_1$.

Megoldás. a) Vizsgáljuk meg a lineáris függetlenséget: $x_1(\mathbf{v}_1) + x_2(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + \dots + x_n(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \dots + \mathbf{v}_n) = (x_1 + x_2 + \dots + x_n)\mathbf{v}_1 + \dots + (x_{n-1} + x_n)\mathbf{v}_{n-1} + x_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$, akkor \mathbf{v}_i vektorok függetlensége miatt: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = \dots = x_{n-1} + x_n = x_n = 0$, emiatt $x_n = x_{n-1} = \dots = x_1 = 0$. Emiatt a megadott vektorrendszer is lineárisan független lesz.

b) Nem lesz lineárisan független, hiszen $\sum_{i=1}^{n-1} (\mathbf{v}_{i+1} - \mathbf{v}_i) + (\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_1) = \mathbf{0}$.

c) Vizsgáljuk meg a lineáris függetlenséget: $x_1(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) + x_2(\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) + \dots + x_n(\mathbf{v}_n + \mathbf{v}_1) = (x_1 + x_n)\mathbf{v}_1 + \dots + (x_{n-2} + x_{n-1})\mathbf{v}_{n-1} + (x_{n-1} + x_n)\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$, akkor \mathbf{v}_i vektorok függetlensége miatt: $x_1 + x_n = \dots = x_{n-2} + x_{n-1} = x_{n-1} + x_n = 0$. Ha n páros, akkor $x_1 = x_3 = \dots = x_{n-1} = -x_2 = -x_4 = \dots = -x_n$ nem triviális megoldása az előző homogén egyenletrendszernek, ezért a megadott vektorrendszer összefüggő lesz. Egyébként pedig nem, mert az egyenletekből azt kapjuk, hogy $x_1 = x_3 = x_5 = \dots = x_n = x_2 = \dots = x_{2n-1} = 0$.

9. Bizonyítsuk be, hogy ha a $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in \mathbb{R}^k$ vektorok közül csak \mathbf{v}_1 áll elő a többi lineáris kombinációjaként, akkor $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$.

Megoldás. Ha $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, akkor a $\mathbf{v}_1 = \sum_{i=2}^n c_i \mathbf{v}_i$ lineáris kombinációban van olyan i index, hogy $c_i \neq 0$. Ekkor \mathbf{v}_i kifejezhető a többi lineáris kombinációjaként.

10. Egy nullvektortól különböző elemekből álló, legalább kételemű \mathbb{R}^n -beli $V = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ vektorrendszer pontosan akkor lineárisan összefüggő, ha van olyan $t \geq 2$ index, hogy \mathbf{v}_t a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{t-1}$ vektorok lineáris kombinációja.

Megoldás. Legyen t az a legkisebb egész, melyre a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_t$ vektorok már összefüggők. Mivel $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, ezért az első vektor nem lehet összefüggő, ezért $t \geq 2$. E vektorok összefüggősége miatt vannak olyan c_i konstansok, melyekkel

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + \dots + c_t \mathbf{v}_t = \mathbf{0}.$$

Biztos, hogy $c_t \neq 0$, különben már a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{t-1}$ vektorok is lineáris összefüggők lennének, és ez ellentmond t definíciójának. Így

$$\mathbf{v}_t = \frac{-c_1}{c_t} \mathbf{v}_1 + \frac{-c_2}{c_t} \mathbf{v}_2 + \dots + \frac{-c_{t-1}}{c_t} \mathbf{v}_{t-1},$$

ami bizonyítja, hogy összefüggő vektorrendszerben létezik ilyen vektor. Az állítás másik fele definíció szerint igaz, hisz ha létezik ilyen \mathbf{v}_t vektor, akkor ez valóban lineáris kombinációja az összes többi vektornak.

11. Bizonyítsuk be, hogy a következő struktúrák testet alkotnak:

- a) $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$ halmaz, ha a szorzást és az összeadást úgy definiáljuk, hogy az igazi szorzatnak illetve összegnek a p szerinti maradékát vesszük;
- az $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \subseteq \mathbb{C}$ halmaz a komplex összeadásra és szorzásra nézve.

Megoldás. a) Felhasználjuk, hogy ha a és a' , illetve b és b' p -vel vett maradéka megegyezik, akkor $a + b$ és $a' + b'$, illetve ab és $a'b'$ is azonos maradékot adnak. Ebből következik, hogy tetszőleges $+$ -gel és $-$ -tal alkotott kifejezés értékét úgy is megkaphatjuk \mathbb{Z}_p -ben, hogy először \mathbb{Z} -ben számoljuk ki, és csak a végén vesszük a maradékot. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a műveleti azonosságok teljesülnek \mathbb{Z}_p -ben, mert \mathbb{Z} -ben is teljesülnek. A $+$ -ra és $-$ -ra való zártság nyilvánvaló a definícióból. 0-elem és 1-elem a 0 és az 1, egy $a \neq 0$ elem negatívja pedig $p - a$ (a 0-é pedig 0). Azt kell még belátnunk, hogy minden $a \neq 0$ elemnek van reciproka. Tekintsük az $a, 2a, \dots, (p-1)a$ egész számok p -vel vett maradékait. Ezek mind különbözők, mert ha ia és ja azonos maradékot ad, akkor $ia - ja = (i - j)a$ osztható p -vel, és így $|i - j|$ is osztható, ami pedig 0 és $p-2$ között van, tehát ilyenkor $i = j$. Másrészt a 0 nincs a maradékok között, tehát az összes többi maradékot megkapjuk, köztük az 1-et. Ha ia maradéka 1, akkor i az a reciproka a \mathbb{Z}_p -ben.

- Legyen $K = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$. Itt a műveleti azonosságokat nem kell külön belátnunk, mert azok a K halmazt tartalmazó \mathbb{C} testben is teljesülnek. K zárt a műveletekre nézve: $(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i \in K$ és $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \in K$, mert az együtthatók racionálisak, hiszen \mathbb{Q} test. Van 0-elem: $0 + 0i$ és 1-elem: $1 + 0i$, továbbá additív inverz K -ban: $(-a) + (-b)i$. Végül multiplikatív inverz is létezik, ugyanis a \mathbb{C} -beli reciprok benne van a K -ban is: $1/(a + bi) = (a - bi)/(a^2 + b^2) = \frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2}i$ mindkét együtthatója racionális, ha a és b azok voltak.

12. Melyek alkotnak vektorteret \mathbb{R} fölött az alábbiak közül? A köztük szereplő vektorterek hány dimenziósak?

- 3×3 -as valós felső háromszögmátrixok a szokásos műveletekkel;
- a racionális számnégyesek a szokásos összeadásra és skalárral való szorzásra nézve;
- a legfőbb 5-ödfokú valós polinomok;
- a valós számpárok az $(a, b) \oplus (c, d) = (a + d, b + c)$ összeadásra és $\lambda \cdot (a, b) = (\lambda a, \lambda b)$ skalárral való szorzásra nézve;
- \mathbb{C} a komplex számok összeadására és valóssal való szorzására nézve;
- A sík pozitív y -koordinátájú helyvektorai a szokásos vektorösszeadásra és skalárral való szorzásra nézve.

Megoldás. Az a), c) és e) részekben definiált struktúrák vektorterek, a b)-ben megadott nem, mert egy racionális szám valósszorosa nem feltétlenül racionális. A d)-ben megadott összeadás pedig nem kommutatív (mellesleg, nem is asszociatív): $(a, b) \oplus (c, d) = (a + d, b + c)$, és $(c, d) \oplus (a, b) = (c + b, a + d)$ különböznek. Tehát a d)-beli nem vektortér; az f)-beli halmaz nem tartalmaz nullelemet, és negatív számmal való szorzásra sem zárt. A dimenziókat egy-egy bázis megadásával határozhatjuk meg:

- Bázisa az $\{E_{11}, E_{12}, E_{13}, E_{22}, E_{23}, E_{33}\}$, ahol E_{ij} azt a mátrixot jelöli, amelynek egyetlen nem nulla eleme az ij helyen levő 1. A vektortér dimenziója 6.
- Bázisa $\{1, x, x^2, x^3, x^4, x^5\}$, dimenziója 6.
- Bázisa $\{1, i\}$, dimenziója 2. Mindhárom esetben könnyű látni, hogy a vektortér elemei egyértelműen írhatók föl a báziselemek lineáris kombinációjaként.

13. Mutassuk meg, hogy az n -lakosú Páratlanvárosban, ahol minden klub páratlan létszámú, de bármely két klubnak páros sok a közös tagja, legfőbb n klub van.

Megoldás. \mathbb{F}_2 fölött a klubok karakterisztikus 0-1-vektorai lineárisan függetlenek, ugyanis páronként merőlegesek egymásra és egységvektorok, így bármely

$$c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + c_m \mathbf{x}_m = \mathbf{0}$$

lineáris kombinációjuk \mathbf{x}_j -vel beszorozva azt kapjuk, hogy $c_j \mathbf{x}_j \cdot \mathbf{x}_j = 0$, amiből $\mathbf{x}_j \cdot \mathbf{x}_j = 1$ miatt következik, hogy $c_j = 0$. Független vektorból viszont legföljebb n választható, így a klubok száma legföljebb n .

HF. Bizonyítsuk be, hogy az $F = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ halmaz testet alkot a valós összeadásra és szorzásra nézve.