

6. előadás

Mátrixok

Horváth Márton

BME, Matematika Intézet,
Algebra és Geometria Tanszék

2026. március 3.

Bevezetés

Táblázatszerűen téglalapba írunk számokat:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 7 & 9 \end{pmatrix} \text{ vagy } \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 5 & 7 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 7 & 9 \end{bmatrix}$$

típusa: 3×5 (3 sora és 5 oszlopa van)

Általános jelölés:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{bmatrix}$$

Az \mathbf{A} mátrix i -edik sorának j -edik eleme a_{ij} .

Típusa: $m \times k$ (m sora és k oszlopa van).

Ha $k = m$, akkor **négyzetes mátrix**.

Tranzponált

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mk} \end{bmatrix}$$

Az \mathbf{A} mátrix **főátlója** az $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{kk}/a_{mm}$.

Az \mathbf{A} mátrix **mellékátlója** $a_{1k}, a_{2,k-1}, \dots$

Az $m \times k$ -as \mathbf{A} mátrix **transzponáltja** az a \mathbf{B} $k \times m$ -es mátrix, melyre

$$b_{ij} = a_{ji} \quad (1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq m)$$

Jelölés: $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$

Tulajdonság: $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$.

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}$$

Mátrixok és vektorok

Az n dimenziós vektorokat is tekinthetjük mátrixoknak:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Sorvektorként $1 \times n$ -es mátrix: $[v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n]$

Oszlopvektorként $n \times 1$ -es mátrix: $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$

Ezek egymás transzponáltjai:

$$[v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n]^T = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}^T = [v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n]$$

Műveletek mátrixokkal

Összeadás:

Az $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ akkor van értelmezve, ha a két mátrix ugyanolyan típusú.

A megfelelő elemeket adjuk össze, azaz $\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ esetén $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Példa:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 4 \\ 6 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

Különbség:

Az összeadáshoz hasonlóan, csak $\mathbf{C} = \mathbf{A} - \mathbf{B}$ esetén $c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$.

Valós számmal való szorzás:

$\lambda \in \mathbb{R}$ és \mathbf{A} egy $m \times k$ -as mátrix.

A valós számmal a mátrix minden elemét megszorozzuk, azaz $\mathbf{B} = \lambda\mathbf{A}$ esetén $b_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Példa:

$$3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 6 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

Ezek a műveletek vektorokra is ugyanígy működnek.

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

$$i \begin{bmatrix} \phantom{a_{i1}} \\ \phantom{a_{i2}} \\ \phantom{a_{ik}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \phantom{b_{1j}} \\ \phantom{b_{2j}} \\ \phantom{b_{kj}} \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} \phantom{c_{ij}} \\ \phantom{c_{ij}} \\ \phantom{c_{ij}} \end{bmatrix}$$

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix}$$

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

The diagram shows a horizontal rectangle labeled 'i' on the left, followed by a dot, then a vertical rectangle labeled 'j' in the middle, followed by an equals sign, and finally a square labeled 'i' on the right. All three shapes are enclosed in large square brackets. The 'i' label is positioned to the left of the first bracket, and the 'j' label is positioned above the second bracket. The 'i' label is also positioned to the left of the final bracket.

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \\ 4 & 25 & & \end{bmatrix}$$

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

$$i \left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c} j \\ | \\ | \\ | \end{array} \right] = i \left[\begin{array}{c} j \\ \square \end{array} \right]$$

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \\ 4 & 25 & 19 & \end{bmatrix}$$

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

$$i \left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c} j \\ | \\ | \\ | \end{array} \right] = i \left[\begin{array}{c} j \\ \square \end{array} \right]$$

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \\ 4 & 25 & 19 & -2 \end{bmatrix}$$

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell} b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

$$i \left[\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ \text{---} \end{array} \right] \cdot \left[\begin{array}{c} j \\ | \\ | \\ | \end{array} \right] = i \left[\begin{array}{c} \square \\ | \\ | \\ | \end{array} \right]$$

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \\ 4 & 25 & 19 & -2 \\ 10 & & & \end{bmatrix}$$

Mátrixok szorzása

Az \mathbf{A} $m_1 \times k_1$ -es és \mathbf{B} $m_2 \times k_2$ -es mátrixot pontosan akkor szorozhatjuk össze, ha $k_1 = m_2$.

Ha \mathbf{A} $m \times k$ -as, \mathbf{B} $k \times n$ -es, akkor a szorzatuk $m \times n$ -es \mathbf{C} mátrix, és

$$c_{ij} = \sum_{\ell=1}^k a_{i\ell}b_{\ell j} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

The diagram shows a row vector i (represented by a horizontal rectangle) multiplied by a column vector j (represented by a vertical rectangle). The result is a scalar element i (represented by a small square) in a larger matrix structure, with the row index i and column index j indicated above the respective parts.

Példa:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 & 5 & 0 \\ 1 & 9 & 7 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 25 & 19 & -2 \\ 10 & 57 & 43 & -4 \\ 16 & 89 & 67 & -6 \end{bmatrix}$$

Feladat

Szorozzuk össze az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrixokat.

Feladat

Szorozzuk össze az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrixokat.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

Tehát

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 5 & 9 \\ 5 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

Szorzás tulajdonságai

Nem kommutatív:

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

Lehet, hogy az egyik elvégezhető, de a másik nem.

Ha el is végezhető, akkor is lehet különböző méretű az eredmény.

De még ha a méret stimmel, akkor sem kommutatív:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{AB} = \quad \quad \mathbf{BA} =$$

Szorzás tulajdonságai

Nem kommutatív:

$$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$$

Lehet, hogy az egyik elvégezhető, de a másik nem.

Ha el is végezhető, akkor is lehet különböző méretű az eredmény.

De még ha a méret stimmel, akkor sem kommutatív:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{BA} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Asszociatív:

Ha $(\mathbf{AB})\mathbf{C}$ értelmes, akkor $\mathbf{A}(\mathbf{BC})$ is, és ezek egyenlők:

$$(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$$

Disztributív:

Ha $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C})$ értelmes, akkor $\mathbf{AB} + \mathbf{AC}$ is, és ezek egyenlők:

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$$

Ha $(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C}$ értelmes, akkor $\mathbf{AC} + \mathbf{BC}$ is, és ezek egyenlők:

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC}$$

Mátrixok szorzása jobbról

\mathbf{A} $m \times k$ típusú mátrix,

$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k$ a k dimenziós tér egységvektorai (oszlopvektorként):

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}\mathbf{e}_1$ az \mathbf{A} mátrix első oszlopa,

$\mathbf{A}\mathbf{e}_2$ az \mathbf{A} mátrix második oszlopa,

\vdots

$\mathbf{A}\mathbf{e}_k$ az \mathbf{A} mátrix k -adik (utolsó) oszlopa

Ha $\mathbf{v} = (1, 2, 0, \dots, 0)^\top$ és $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^\top$, akkor

$\mathbf{A}\mathbf{v}$ az \mathbf{A} első oszlopának és a második oszlopa kétszeresének összege,

$\mathbf{A}\mathbf{1}$ az \mathbf{A} oszlopainak összege.

Általában $\mathbf{A}\mathbf{v}$ az \mathbf{A} oszlopainak lineáris kombinációja ($\mathbf{v} \in \mathbb{R}^k$ oszlopvektor), ahol az együtthatók a \mathbf{v} koordinátái.

Mátrixok szorzása balról

\mathbf{A} $m \times k$ típusú mátrix,

$\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_m$ az m dimenziós tér egységvektorai (sorvektorként):

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, \dots, 0), \quad \dots, \quad \mathbf{e}_m = (0, 0, \dots, 1)$$

$\mathbf{e}_1 \mathbf{A}$ az \mathbf{A} mátrix első sora,

$\mathbf{e}_2 \mathbf{A}$ az \mathbf{A} mátrix második sora,

\vdots

$\mathbf{e}_m \mathbf{A}$ az \mathbf{A} mátrix m -edik (utolsó) sora

Ha $\mathbf{v} = (1, 2, 0, \dots, 0)$ és $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)$, akkor

\mathbf{vA} az \mathbf{A} első sorának és a második sora kétszeresének összege,

$\mathbf{1A}$ az \mathbf{A} sorainak összege.

Általában \mathbf{vA} az \mathbf{A} sorainak lineáris kombinációja ($\mathbf{v} \in \mathbb{R}^m$ sorvektor), ahol az együtthatók a \mathbf{v} koordinátái.

Egységmátrix

Az $n \times n$ -es **egységmátrix** az az $n \times n$ -es mátrix, melynek a főátlójában minden elem 1-es és az összes többi eleme 0.

Jelölése: \mathbf{E}_n .

Példák:

$$\mathbf{E}_1 = [1] \quad \mathbf{E}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{E}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{E}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Tétel:

Ha az \mathbf{A} mátrix típusa $m \times k$, akkor:

$$\mathbf{A}\mathbf{E}_k = \mathbf{A} \quad \text{és} \quad \mathbf{E}_m\mathbf{A} = \mathbf{A}$$

Speciális eset: $m = k$ esetén (ekkor \mathbf{A} négyzetes):

$$\mathbf{A}\mathbf{E}_m = \mathbf{E}_m\mathbf{A} = \mathbf{A}$$

Vektorok szorzása

Ha \mathbf{v}, \mathbf{w} két n dimenziós oszlopvektor, akkor a $\mathbf{v}^\top \mathbf{w}$ mátrixszorzás eredménye egy 1×1 -es mátrix, melynek egyetlen eleme éppen a $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ skaláris szorzat.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}^\top = [v_1 \quad v_2 \quad \cdots \quad v_n] \quad \mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

A $\mathbf{v}\mathbf{w}^\top$ mátrixszorzásnak is van értelme, eredménye egy $n \times n$ -es mátrix, ezt **diadikus szorzatnak** nevezzük.

Ha sorvektorokként képzeljük el a vektorokat, akkor a $\mathbf{v}\mathbf{w}^\top$ szorzatmátrix egyetlen eleme adja meg a skaláris szorzatot.