

1. Mutassuk meg, hogy az alábbiak vektorterek! Hány dimenziósak? Adjunk meg bennük bázist!
  - a)  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$
  - b)  $\mathbb{C}_{\mathbb{C}}$
  - c) Az  $n \times n$ -es valós nulla nyomú mátrixok  $\mathbb{R}$  fölött. (Egy mátrix nyoma a diagonális elemeinek az összege.)
  - d) Az  $n \times n$ -es komplex nulla nyomú mátrixok  $\mathbb{R}$  fölött.
  - e) Az  $\mathbb{R}[x, y]$   $\mathbb{R}$ -vektortérben a legfőbb 3-adfokú polinomok.
  - f) Az  $\mathbb{R}[x, y]$   $\mathbb{R}$ -vektortérben a legfőbb 3-adfokú szimmetrikus polinomok
  - g) Adott  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$  mátrixszal felcserélhető  $2 \times 2$ -es valós mátrixok.
2. Bizonyítsuk be az axiómákból, hogy egy vektortérben  $\lambda \mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \lambda = 0$  vagy  $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ .
3. Tekintsük az  $X$  halmaz  $\mathcal{P}(X)$  hatványhalmazán értelmezett  $K = \mathbb{Z}_2$  fölötti  $V$  vektorteret, ahol az összeadás az  $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  szimmetrikus differencia.
  - a) Bizonyítsuk be, hogy  $V$  valóban vektortér!
  - b) Adjunk meg  $V$ -ben egy bázist, ha  $X$  véges halmaz!
  - c) Bizonyítsuk be, hogy (végtelen  $X$  halmaz esetén is) van olyan  $f : V_K \rightarrow K_K$  lineáris leképezés, amely  $X$  páros elemszámú véges részhalmazait 0-ba, a páratlanokat 1-be viszi!
4. Adjuk meg az  $f : (x, y, z) \rightarrow (x + y - 2z, x + z, 2x + y - z, -x - z)$  lineáris leképezés mátrixát standard bázisban. Mennyi a rangja? Hány dimenziós  $f$  magtere és képtere? Adjuk meg a magtérnek és a képtérnek egy-egy bázisát!
5. Legyen  $f : \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 3}$  az a leképezés, amelyre  $f : p(x) \mapsto (x - 1)p'(x^2 + 1)$ . Bizonyítsuk be, hogy  $f$  lineáris leképezés, és határozzuk meg a magját és a rangját! Írjuk fel a mátrixát a standard  $\{1, x, x^2, \dots\}$  bázisokból álló bázispárban, illetve keressünk egy olyan bázispárt, amelyben a mátrixa  $\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  alakú blokkmátrix!
6. Adjuk meg a következő lineáris transzformációk és leképezések mátrixát a megadott bázisban (vagy bázispárban)!  
Adjuk meg a képtér és a magtér egy-egy bázisát!
  - a)  $f(x, y, z) = (x + 2y - z, x - y + z)$  standard bázisban, illetve a  $(\mathcal{B}', \mathcal{C}')$  bázispárban, ahol  
a  $\mathcal{B}' = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}$  és  $\mathcal{C}' = \{(1, 1), (2, 3)\}$ .
  - b) az  $x = t, y = 2t, z = -t$  tengely körüli  $90^\circ$ -os forgatás a standard bázisban!
  - c) a  $2 \times 2$ -es valós mátrixokon az  $A \mapsto A + A^T$  leképezés a standard bázisban!
  - d) A  $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$  vektortéren egy  $z = a + bi$  komplex számmal való szorzás mátrixát a  $\mathcal{B} = \{1, i\}$  és a  $\mathcal{B}' = \{1 + i, 1 - i\}$  bázisban.
7. Legyen  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  az a lineáris transzformáció, melyre  $f(1, 1, 0) = (1, 0, 1)$ ,  $f(1, 0, 1) = (0, 1, 1)$  és  $f(0, 1, 1) = (1, 1, 0)$ . Adjuk meg  $f$  mátrixát a  $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$  bázisban és a standard bázisban is! Milyen vektorokat hagy helyben ez a leképezés? Mi az  $f$  mint geometriai transzformáció?

**Házi feladatok**

Beadási határidő: február 19.

*A feladatokra teljes, tömör és világos megoldást adjunk részletszámításokkal, indoklással, az eredmény leírása nem elegendő. A feladatok egy pontot érnek, a csillagos kettőt. A hétből hat feladat megoldását adjuk be, ezekből legalább 4 pontot el kell érni. Együtt gondolkozni szabad, de más megoldását lemásolni nem!*

- Mutassuk meg, hogy azok a  $3 \times 3$ -as valós mátrixok, melyekben minden sor összege 0, vektorteret alkotnak  $\mathbb{R}$  fölött. Hány dimenziós ez a vektortér? Adjunk meg benne egy bázist (lássuk is be, hogy bázis)!
- Bizonyítsuk be vektorterekben az  $\mathbf{u} - (\mathbf{v} - \mathbf{w}) = (\mathbf{u} - \mathbf{v}) + \mathbf{w}$  azonosságot, ahol a kivonás definíciója (K)  $\mathbf{u} - \mathbf{v} := \mathbf{u} + (-1)\mathbf{v}$ . Egy lépésben csak egy átalakítást végezzünk, és mindig írjuk oda, hogy melyiket használjuk az alább felsorolt (A1), ..., (A4), (S1), ..., (S4) axiómák közül, illetve a (K) definíciót vagy egy (T) testtulajdonságot!
 

(A1) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u} \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$	(S1) $\lambda(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u} + \lambda\mathbf{v} \quad \forall \lambda \in K, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$
(A2) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$	(S2) $(\lambda + \mu)\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v} + \mu\mathbf{v} \quad \forall \lambda, \mu \in K, \mathbf{v} \in V$
(A3) $\exists \mathbf{0} : \mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V$	(S3) $(\lambda\mu)\mathbf{v} = \lambda(\mu\mathbf{v}) \quad \forall \lambda, \mu \in K, \mathbf{v} \in V$
(A4) $\forall \mathbf{v} \in V \exists (-\mathbf{v}) : \mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$	(S4) $1\mathbf{v} = \mathbf{v} \quad \forall \mathbf{v} \in V$
- Bizonyítsuk be a Zorn-lemma segítségével, hogy ha  $\mathbf{v}$  egy  $V$  vektortér nemnulla vektora, akkor van  $V$ -nek maximális olyan  $W$  altere, amely nem tartalmazza  $\mathbf{v}$ -t.
- Adjuk meg az  $f : (x, y, z) \rightarrow (x + 2y - z, x + y, y - z)$  lineáris transzformáció mátrixát a standard bázisban. Mennyi  $f$  rangja? Hány dimenziós  $f$  magtere és képtere? Adjuk meg a magtérnek és a képtérnek egy-egy bázisát!
- Legyen  $\mathbb{R}[x]_{\leq 2} \rightarrow \mathbb{R}[x]_{\leq 2}$  az a lineáris transzformáció, amelyre  $f(p(x)) = xp'(x) - p(x)$ . Adjuk meg  $f$  mátrixát a standard  $\{1, x, x^2\}$  bázisban, és írjuk fel  $f$  magterének bázisát (a bázis elemeit polinomokként írjuk fel)!
- Adjuk meg az  $f(x, y, z) = (x + y + z, x - 2y + z)$  lineáris leképezés mátrixát a standard bázisban, illetve a  $\mathcal{B}'_1 = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, -1)\}$  és  $\mathcal{B}'_2 = \{(1, -1), (1, 1)\}$  bázispárban!
- 7\***. Bizonyítsuk be, hogy a vektortereknek a 2. feladatban felsorolt (A1), ..., (A4), (S1), ..., (S4) axiómái közül az (A1) kommutativitási axióma következik a többiből! Figyeljünk oda arra, hogy (A3) és (A4) csak "féloldalasan" lett kimondva, tehát ha szükségünk van a másik oldali azonosságra, azt bizonyítanunk kell az (A1) felhasználása nélkül!