*Egy kategóriában*

$$\begin{tikzcd} & Y \arrow[d, "\beta"] \\ X \arrow[r, "\alpha"'] & Z \end{tikzcd} \quad \textit{pullbackje} \quad \begin{tikzcd} U \arrow[r, "\alpha'"] \arrow[d, "\beta'"'] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \arrow[d, "\beta"] \\ X \arrow[r, "\alpha"'] & Z \end{tikzcd} \quad \textit{ha } \forall \quad \begin{tikzcd} U' \arrow[r, "\alpha''"] \arrow[d, "\beta''"'] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \arrow[d, "\beta"] \\ X \arrow[r, "\alpha"'] & Z \end{tikzcd} \quad \exists!\ \varepsilon \quad \begin{tikzcd} U' \arrow[dr, dashed, "\varepsilon"] \arrow[drr, "\alpha''"] \arrow[ddr, "\beta''"'] & & \\ & \# U \arrow[r, "\alpha'"] \arrow[d, "\beta'"] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \arrow[d, "\beta"] \\ & X \arrow[r, "\alpha"'] & Z \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} Z \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\alpha"'] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \\ X & \end{tikzcd} \quad \textit{pushoutja} \quad \begin{tikzcd} Z \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\alpha"'] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \arrow[d, "\alpha'"] \\ X \arrow[r, "\beta'"'] & U \end{tikzcd} \quad \textit{ha } \forall \quad \begin{tikzcd} Z \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\alpha"'] \arrow[dr, phantom, "\#"] & Y \arrow[d, "\alpha''"] \\ X \arrow[r, "\beta''"'] & U' \end{tikzcd} \quad \exists!\ \varepsilon \quad \begin{tikzcd} Z \arrow[r, "\beta"] \arrow[d, "\alpha"'] & Y \arrow[d, "\alpha'"] \arrow[ddr, "\alpha''"] \arrow[dl, phantom, "\#"] & \\ X \arrow[r, "\beta'"] \arrow[drr, "\beta''"'] & U \arrow[dr, dashed, "\varepsilon"] \arrow[d, phantom, "\#"] & \\ & & U' \end{tikzcd}$$

**1.** Bizonyítsuk be, hogy a pullback és pushout — ha létezik — izomorfia erejéig egyértelmű, és hogy Mod-$R$-ben mindig létezik pullback: $U = \{(x, y) \mid x\alpha = y\beta\} \leq X \oplus Y$ és pushout: $U = X \oplus Y / \{(z\alpha, -z\beta) \mid z \in Z\}$.

**2.** Bizonyítsuk be, hogy ha modulusok pullbackjében vagy pushoutjában $\alpha$ vagy $\beta$ monomorfizmus, illetve epimorfizmus, akkor a vele "párhuzamos" nyíl is ilyen!

**3.** Határozzuk meg az $\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_4)$ csoportot! Adjuk meg az elemeinek megfelelő bővítéseket $\mathrm{Ex}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_4)$-ben!

**4.** Legyen $A$ véges dimenziós $K$-algebra, és $M, N \in$ mod-$A$. Bizonyítsuk be, hogy ha a $\xi$ és $\eta$ bővítések lineárisan összefüggők, de egyik sem nulla $\mathrm{Ex}(M, N)$-ben (azaz nem felhasadók), akkor a középső tagjuk izomorf!

**5.** Tekintsük azt az $A$ gráfalgebrát, amelynek jobbreguláris modulusa $A_A = \begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{smallmatrix} \oplus \begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{smallmatrix}$.

Határozzuk meg az $\mathrm{Ext}^1_A(\,{\scriptstyle 1}\,, \begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix})$ vektortér dimenzióját, és adjunk meg a vele izomorf $\mathrm{Ex}_A(\,{\scriptstyle 1}\,, \begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix})$ térben egy bázist. Ciklikus lesz-e ez mint $\mathrm{End}(\,{\scriptstyle 1}\,)$-, illetve mint $\mathrm{End}(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix})$-modulus?

**Hf1.** Bizonyítsuk be a 2. feladat állítását arra az esetre, amikor egy pullbackban, illetve pushoutban $\alpha$ epimorfizmus! (Használjuk az 1. feladatban megadott konstrukciókat!)

**Hf2.** Legyen

$$\xi: \quad 0 \to \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_4 \to 0$$

az a bővítés $\mathrm{Ex}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_4)$-ben, amelynél a monomorfizmus az 1 elemet $(1, 2)$-be képezi, az epimorfizmus pedig $(0, 1)$-et 1-be, $(1, 0)$-t pedig 2-be. Határozzuk meg az $f\xi$ és $\xi g$ bővítésekben a középső tagot, ha $f : \mathbb{Z}_2 \to \mathbb{Z}_4$ és $g : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_2$ nemnulla homomorfizmusok!