

Komplex Számok

Nagy Noémi

Definíció

Vegyük a legegyszerűbb másodfokú egyenletet aminek nincs valós megoldása

$$z^2 + 1 = 0 \quad (1)$$

Ennek megoldásai legyenek i az imaginárius egység (képzeletbeli szám) és $-i$. Ebből következik, hogy $i^2 = (-i)^2 = -1$.

Definíció

Vegyük a legegyszerűbb másodfokú egyenletet aminek nincs valós megoldása

$$z^2 + 1 = 0 \quad (1)$$

Ennek megoldásai legyenek i az imaginárius egység (képzeltbeli szám) és $-i$. Ebből következik, hogy $i^2 = (-i)^2 = -1$.

Így a

$$(z - \alpha)^2 + \beta = 0, \quad \beta > 0, \alpha \in \mathbb{R} \quad (2)$$

egyenletnek is van megoldása:

$$z_1 = \alpha + i\sqrt{\beta}, \text{ és a } z_2 = \alpha - i\sqrt{\beta}$$

Definíció

Sőt, a teljesen általános

$$a \cdot z^2 + b \cdot z + c = 0 \quad (3)$$

egyenlet is a (2) alakba írható.

Definíció

Sőt, a teljesen általános

$$a \cdot z^2 + b \cdot z + c = 0 \quad (3)$$

egyenlet is a (2) alakba írható.

Így kapjuk a (4) egyenletre a

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

megoldóképletet, arra az esetre is, ha diszkrimináns negatív.

Példa

Adjuk meg a

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad (4)$$

egyenlet megoldásait a komplex számok halmazán a megoldóképlet segítségével!

Példa

Adjuk meg a

$$z^2 - 2z + 5 = 0 \quad (4)$$

egyenlet megoldásait a komplex számok halmazán a megoldóképlet segítségével!

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 5}}{2} = 1 \pm 2i,$$

ahol kihasználtuk, hogy $(4i)^2 = -16$.

Definíció

A másodfokú egyenleteknek a megoldása mindig

$$z = \underbrace{a}_{\text{valós rész}} + \underbrace{b}_{\text{képzetes rész}} \cdot i$$

alakba írható. A képzetes és valós rész alkotják a **komplex** számot. Ezt hívjuk a komplex szám algebrai alakjának.

Jelölés: $\text{Re } z =$ valós rész, $\text{Im } z =$ képzetes rész.


Legyen $\mathbb{C} := \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$.

A komplex számok testet alkotnak: a

$$a \cdot z + b = c$$

egyenlet minden $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{C}$, $c \in \mathbb{C}$ számra megoldható.

A komplex sík



A komplex számok ábrázolhatók a komplex síkon. Ahol az egyik tengely a valós (Re), a másik tengely a képzetes (Im) számokat ábrázolja.

Alapműveletek komplex számokkal

A komplex számok körében értelmezett a négy alapművelet. Legyenek $z_1 = a_1 + ib_1$ illetve $z_2 = a_2 + ib_2$ két tetszőleges komplex szám. Ekkor definíció szerint:

$$z_1 + z_2 = a_1 + ib_1 + a_2 + ib_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

$$z_1 - z_2 = a_1 + ib_1 - a_2 - ib_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

Alapműveletek komplex számokkal

A komplex számok körében értelmezett a négy alapművelet. Legyenek $z_1 = a_1 + ib_1$ illetve $z_2 = a_2 + ib_2$ két tetszőleges komplex szám. Ekkor definíció szerint:

$$z_1 + z_2 = a_1 + ib_1 + a_2 + ib_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

$$z_1 - z_2 = a_1 + ib_1 - a_2 - ib_2 = (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2)$$

A szorzás elvégzéséhez kell az $i^2 = -1$ összefüggés:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (a_1 + ib_1) \cdot (a_2 + ib_2) = a_1a_2 + i^2b_1b_2 + ia_1b_2 + ia_2b_1 \\ &= (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1) \end{aligned}$$

Konjugálás

A komplex számokon van egy olyan egyváltozós művelet aminek nincs valós párja: a konjugálás.

Konjugálás

A komplex számokon van egy olyan egyváltozós művelet aminek nincs valós párja: a konjugálás.

A $z = a + bi$ szám konjugáltján a $\bar{z} = a - bi$ komplex számot értjük.

Konjugálás

A komplex számokon van egy olyan egyváltozós művelet aminek nincs valós párja: a konjugálás.

A $z = a + bi$ szám konjugáltján a $\bar{z} = a - bi$ komplex számot értjük.

A konjugálás onnan jön, hogy a megoldó képlet

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

miatt ha egy komplex szám gyöke egy másodfokú egyenletnek akkor a komplex konjugáltja is az.

Konjugálás

A komplex számokon van egy olyan egyváltozós művelet aminek nincs valós párja: a konjugálás.

A $z = a + bi$ szám konjugáltján a $\bar{z} = a - bi$ komplex számot értjük.


A konjugálás onnan jön, hogy a megoldó képlet

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

miatt ha egy komplex szám gyöke egy másodfokú egyenletnek akkor a komplex konjugáltja is az.

A komplex számból és konjugáltjából kifejezhető a komplex szám valós és képzetes része, hiszen $\frac{z+\bar{z}}{2} = a$ és $\frac{z-\bar{z}}{2i} = b$.

A komplex sík II




A konjugált a komplex szám tükörképe a valós tengelyre. A

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2$$

a Pitagorasz tétel miatt a z távolságnégyzete az origótól.

A komplex sík II



A konjugált a komplex szám tükörképe a valós tengelyre. A

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2$$

a Pitagorasz tétel miatt a z távolságnégyzete az origótól.

Alapműveletek komplex számokkal - Osztás

Az osztás elvégzése algebrai alakban kicsit nehézkes, de ha a nevező komplex konjugáltjával bővítek akkor algebrai alakot kapok.

$$\begin{aligned} \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} &= \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2} \cdot \frac{a_2 - ib_2}{a_2 - ib_2} = \frac{a_1 a_2 - i^2 b_1 b_2 - ia_1 b_2 + ib_1 a_2}{a_2^2 - (ib_2)^2} = \\ &= \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + i(b_1 a_2 - a_1 b_2)}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_1 a_2 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \end{aligned}$$

Példák

Példa: Számítsuk ki a $3 + 6i$ és a $4 + 7i$ számok szorzatát!

$$(3 + 6i)(4 + 7i) = 12 + 42i^2 + 24i + 21i = -30 + 45i$$

Példák


Példa: Számítsuk ki a $3 + 6i$ és a $4 + 7i$ számok szorzatát!

$$(3 + 6i)(4 + 7i) = 12 + 42i^2 + 24i + 21i = -30 + 45i$$

Példa 2: Számítsuk ki a $2 + 3i$ és a $4 - 2i$ számok hányadosát!

$$\frac{2 + 3i}{4 - 2i} = \frac{2 + 3i}{4 - 2i} \cdot \frac{4 + 2i}{4 + 2i} = \frac{8 - 6 + i(4 + 12)}{4^2 + 2^2} = \frac{2 + 16i}{20} = \frac{1}{10} + i\frac{4}{5}$$

A komplex sík



A komplex számok ábrázolhatók a komplex síkon. Ahol az egyik tengely a valós (Re), a másik tengely a képzetes (Im) számokat ábrázolja.


Példák

1 $2z - i = 3i + 5$

2 $(2 + i)z = 5 + i$


3 $3z - 1 = \bar{z}, (z = a + ib)$

Komplex szám trigonometrikus alakja



Egy komplex számot nemcsak a valós és képzetes részével adhatunk meg, hanem megadhatjuk ehelyett az origótól vett távolságát $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ -t amit a polár koordináta rendszer jelölései miatt szoktuk r -nek is jelölni, és a valós tengely pozitív felével bezárt szögét, aminek jele: φ , $0 \leq \varphi < 2\pi$.

Komplex szám trigonometrikus alakja II



Ezek segítségével használhatjuk az ún. trigonometrikus alakot is

$$z = r[\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)]$$

mivel $\cos \varphi = \frac{a}{r}$ illetve $\sin \varphi = \frac{b}{r}$ definíció szerint (ahol z algebrai alakja: $z = a + bi$).

Alapműveletek trigonometrikus alakban - Szorzás

A szorzás és osztás művelete sokkal egyszerűbben elvégezhető a trigonometrikus alakban. Legyenek $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ illetve $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ két tetszőleges komplex szám. Ekkor

Alpműveletek trigonometrikus alakban - Szorzás

A szorzás és osztás művelete sokkal egyszerűbben elvégezhető a trigonometrikus alakban. Legyenek $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ illetve $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ két tetszőleges komplex szám. Ekkor

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 [\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

Alapműveletek trigonometrikus alakban - Szorzás

A szorzás és osztás művelete sokkal egyszerűbben elvégezhető a trigonometrikus alakban. Legyenek $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)$ illetve $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ két tetszőleges komplex szám. Ekkor

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 [\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)] = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

Tehát egy komplex számmal való szorzás az abszolút értékkel való „nyújtást” és a szöggel való forgatást jelent.

Alapműveletek trigonometrikus alakban - Osztás

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1 \cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1}{r_2 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2} \frac{\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2}{\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2} =$$

Alpműveletek trigonometrikus alakban - Osztás

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1 \cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1}{r_2 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2} \frac{\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2}{\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2} =$$

$$\frac{r_1}{r_2} \frac{\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)}{\cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} =$$

Alpműveletek trigonometrikus alakban - Osztás

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1 \cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2}{r_2 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2 \cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2} =$$

$$\frac{r_1 \cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \cos \varphi_1 \sin \varphi_2)}{r_2 \cos^2 \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2} =$$

$$\frac{r_1}{r_2} [\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)]$$

Példa

Számítsuk ki a $2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)$ és a $4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right)$ számok szorzatát!

Példa

Számítsuk ki a $2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right)$ és a $4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right)$ számok szorzatát!

$$\begin{aligned} 2 \left(\cos \left(\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) \right) 4 \left(\cos \left(\frac{\pi}{6} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{6} \right) \right) = \\ 8 \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) = 8i \end{aligned}$$

Alapműveletek komplex számokkal - Hatványozás

A magas kitevőjű hatványozást nem érdemes $a + ib$ alakban végezni, ugyanis míg a

$$z^n = (a + ib)^n$$

kifejezést magas hatványra csak a binomiális tétellel bontható ki, addig

Alapműveletek komplex számokkal - Hatványozás

A magas kitevőjű hatványozást nem érdemes $a + ib$ alakban végezni, ugyanis míg a

$$z^n = (a + ib)^n$$

kifejezést magas hatványra csak a binomiális tétellel bontható ki, addig

$$z^n = r^n(\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

igen könnyen számolható.

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám 2019-ik hatványát, a végeredményt algebrai alakban adjuk meg!

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám 2019-ik hatványát, a végeredményt algebrai alakban adjuk meg!

Írjuk át trigonometrikus alakra a számot.

$$|z| = r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{és} \quad \varphi = \frac{7\pi}{4}$$

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám 2019-ik hatványát, a végeredményt algebrai alakban adjuk meg!

Írjuk át trigonometrikus alakra a számot.

$$|z| = r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{és} \quad \varphi = \frac{7\pi}{4}$$

Ezután

$$\begin{aligned} z^{2019} &= \sqrt{2}^{2019} \left(\cos\left(\frac{14133\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{14133\pi}{4}\right) \right) = \\ &2^{1009} \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{14128}{8}2\pi + \frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{14128}{8}2\pi + \frac{5\pi}{4}\right) \right) \\ &= 2^{1009} \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{5\pi}{4}\right) \right) = -2^{1009} - 2^{1009}i \end{aligned}$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
 Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül.
Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül. Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n} \right) \right) \end{array} \right.$$

Alapműveletek komplex számokkal - Gyökvonás

A gyökvonás pedig nem is végezhető el a trigonometrikus alak nélkül. Legyen $z = r(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Ekkor a szám (komplex értelemben vett) n -edik gyökei:

$$\sqrt[n]{z} = \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} \right) \right) \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right) \\ \vdots \\ \sqrt[n]{r} \left(\cos \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n} \right) \right) \end{array} \right.$$

Tehát minden komplex számnak n darab n -edik gyöke van, melyek egy orgió középpontú szabályos n szöget alkotnak.

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám harmadik gyökeit!

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám harmadik gyökeit!

Már tudjuk, hogy a trigonometrikus alak $\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right)$.

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám harmadik gyökeit!

Már tudjuk, hogy a trigonometrikus alak $\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right)$.

Innen:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right),$$

ahol $k = 0, 1, 2$, azaz a három gyök:

Példa

Számítsuk ki az $1 - i$ szám harmadik gyökeit!

Már tudjuk, hogy a trigonometrikus alak $\sqrt{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{4} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right)$.

Innen:

$$\sqrt[3]{z} = \sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{12} + \frac{2k\pi}{3} \right) \right),$$

ahol $k = 0, 1, 2$, azaz a három gyök:

- $k=0$ -re: $\sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{7\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{7\pi}{12} \right) \right)$
- $k=1$ -re: $\sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{15\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{15\pi}{12} \right) \right)$
- $k=2$ -re: $\sqrt[6]{2} \left(\cos \left(\frac{23\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{23\pi}{12} \right) \right)$

Példa a másodfokú egyenlet megoldására

Oldjuk meg az $x^2 + 2x + 2 = 0$ egyenletet a komplex számok körében!

Példa a másodfokú egyenlet megoldására

Oldjuk meg az $x^2 + 2x + 2 = 0$ egyenletet a komplex számok körében!

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}$$

Példa a másodfokú egyenlet megoldására

Oldjuk meg az $x^2 + 2x + 2 = 0$ egyenletet a komplex számok körében!

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}$$

Azaz a gyökök $x_1 = -1 + i$ és $x_2 = -1 - i$.

Példa a másodfokú egyenlet megoldására

Oldjuk meg az $x^2 + 2x + 2 = 0$ egyenletet a komplex számok körében!

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}$$

Azaz a gyökök $x_1 = -1 + i$ és $x_2 = -1 - i$.

A gyökök ismeretében a gyöktényezős alak:

$$az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2).$$

Így most a gyöktényezős alak: $(x + 1 - i)(x + 1 + i)$.

Példa a másodfokú egyenlet megoldására

Oldjuk meg az $x^2 + 2x + 2 = 0$ egyenletet a komplex számok körében!

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = -1 \pm \sqrt{-1}$$

Azaz a gyökök $x_1 = -1 + i$ és $x_2 = -1 - i$.

A gyökök ismeretében a gyöktényezős alak:

$$ax^2 + bx + c = a(z - z_1)(z - z_2).$$

Így most a gyöktényezős alak: $(x + 1 - i)(x + 1 + i)$.

És valóban a másodfokú kifejezés egy felbontását kapjuk, hiszen

$$(x + 1 - i)(x + 1 + i) = x^2 + x(1 + i + 1 - i) + (1 - i)(1 + i) = x^2 + 2x + 2.$$

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa: Oldjuk meg a $z^3 = 8$ egyenletet!

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa: Oldjuk meg a $z^3 = 8$ egyenletet!

A valós számok körében ennek az egyenletnek csak egy megoldása volt.
Komplex számok körében viszont három lesz.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa: Oldjuk meg a $z^3 = 8$ egyenletet!

A valós számok körében ennek az egyenletnek csak egy megoldása volt.
Komplex számok körében viszont három lesz.

Ezek meghatározásához írjuk át 8-at trigonometrikus alakba:

$$8 = 8(\cos(0) + i \sin(0)).$$

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa: Oldjuk meg a $z^3 = 8$ egyenletet!

A valós számok körében ennek az egyenletnek csak egy megoldása volt. Komplex számok körében viszont három lesz.

Ezek meghatározásához írjuk át 8-at trigonometrikus alakba:

$$8 = 8(\cos(0) + i \sin(0)).$$

Innen a köbgyökök:

$$\sqrt[3]{8} = 2 \left(\cos \left(0 + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(0 + \frac{2k\pi}{3} \right) \right),$$

ahol $k = 0,1,2$.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa: Oldjuk meg a $z^3 = 8$ egyenletet!

A valós számok körében ennek az egyenletnek csak egy megoldása volt. Komplex számok körében viszont három lesz.

Ezek meghatározásához írjuk át 8-at trigonometrikus alakba:

$$8 = 8(\cos(0) + i \sin(0)).$$

Innen a köbgyökök:

$$\sqrt[3]{8} = 2 \left(\cos \left(0 + \frac{2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(0 + \frac{2k\pi}{3} \right) \right),$$

ahol $k = 0, 1, 2$.

Innen a megoldások: $z_1 = 2$

$$z_2 = 2 \left(\cos \left(\frac{2\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{2\pi}{3} \right) \right) = -1 + i\sqrt{3}$$

$$z_3 = 2 \left(\cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{4\pi}{3} \right) \right) = -1 - i\sqrt{3}.$$

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetes részük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetes részük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját.

$$a + ib + \sqrt{a^2 + b^2} = 3 + i$$

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetes részük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját.

$$a + ib + \sqrt{a^2 + b^2} = 3 + i$$

Innen a valós részekre vonatkozó egyenlet: $a + \sqrt{a^2 + b^2} = 3,$

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetes részük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját.

$$a + ib + \sqrt{a^2 + b^2} = 3 + i$$

Innen a valós részekre vonatkozó egyenlet: $a + \sqrt{a^2 + b^2} = 3$,

a képzetes részre vonatkozó egyenlet $b = 1$. Ezt visszaírva a valós részre vonatkozó egyenletbe: $a + \sqrt{1 + a^2} = 3$.

Komplex számokra vonatkozó egyenletek

Példa 2: Oldjuk meg a $z + |z| = 3 + i$ egyenletet!

Két komplex szám pontosan akkor egyenlő ha külön-külön a valós és a képzetes részük egyenlő. Az egyenlet megoldásához tehát írjuk ki a z szám algebrai alakját.

$$a + ib + \sqrt{a^2 + b^2} = 3 + i$$

Innen a valós részekre vonatkozó egyenlet: $a + \sqrt{a^2 + b^2} = 3$,

a képzetes részre vonatkozó egyenlet $b = 1$. Ezt visszaírva a valós részre vonatkozó egyenletbe: $a + \sqrt{1 + a^2} = 3$.

Innen:

$$\sqrt{1 + a^2} = 3 - a$$

A megoldáshoz nincs más választásunk, mint mindkét oldalt négyzetre emelni, kikötés: $3 - a \geq 0$.

Példa - folyt.

Vigyázzunk, ekkor keletkezhet hamis gyök, ha elfelejtünk kikötni, ezért a kapott gyököket illik ellenőriznünk!

$$\sqrt{1 + a^2} = 3 - a$$

$$1 + a^2 = 9 - 6a + a^2$$

$$6a = 8$$

Példa - folyt.

Vigyázzunk, ekkor keletkezhet hamis gyök, ha elfelejtünk kikötni, ezért a kapott gyököket illik ellenőriznünk!

$$\sqrt{1 + a^2} = 3 - a$$

$$1 + a^2 = 9 - 6a + a^2$$

$$6a = 8$$

Ellenőrizzük az $a = \frac{4}{3}$ gyököt!

$$\frac{4}{3} + \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3,$$

Példa - folyt.

Vigyázzunk, ekkor keletkezhet hamis gyök, ha elfelejtünk kikötni, ezért a kapott gyököket illik ellenőriznünk!

$$\begin{aligned}\sqrt{1+a^2} &= 3-a \\ 1+a^2 &= 9-6a+a^2 \\ 6a &= 8\end{aligned}$$

Ellenőrizzük az $a = \frac{4}{3}$ gyököt!

$$\frac{4}{3} + \sqrt{1 + \frac{16}{9}} = \frac{4}{3} + \frac{5}{3} = 3,$$

azaz nem hamis gyök a $\frac{4}{3}$. Innen az eredeti egyenlet megoldása:

$$z = \frac{4}{3} + i.$$