

Integrálszámítás

Nagy Noémi

Háttér

Mint ahogy a függvény érintője, ugyanúgy a függvény alatti terület is fontos fizikai jelentőséggel bír:

Háttér


Mint ahogy a függvény érintője, ugyanúgy a függvény alatti terület is fontos fizikai jelentőséggel bír:

Például: Ha a sebességet ábrázolom a grafikonnal, akkor a grafikon alatt lévő terület az út.

Háttér

Mint ahogy a függvény érintője, ugyanúgy a függvény alatti terület is fontos fizikai jelentőséggel bír:


Például: Ha a sebességet ábrázolom a grafikonnal, akkor a grafikon alatt lévő terület az út.



Háttér


Mint ahogy a függvény érintője, ugyanúgy a függvény alatti terület is fontos fizikai jelentőséggel bír:

Például: Ha a erőt ábrázolom a grafikonnal, akkor a grafikon alatt lévő terület az erő által elvégzett munka.



Előjeles terület

Egy kis csavar: Ha a függvényem negatív (például a sebességem negatív, tehát visszafele megyek), akkor szeretném hogy a terület negatív legyen (hiszen visszafele teszem meg az utat).




Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon.


Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon. Felosztjuk az intervallumot, majd a függvényértékek alá és fölé téglalapokat rajzolunk. A felosztást finomítva, ha a téglalapok összterületére közös határértéket kapunk, akkor az lesz az integrál értéke.




Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon. Felosztjuk az intervallumot, majd a függvényértékek alá és fölé téglalapokat rajzolunk. A felosztást finomítva, ha a téglalapok összterületére közös határértéket kapunk, akkor az lesz az integrál értéke.




Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon. Felosztjuk az intervallumot, majd a függvényértékek alá és fölé téglalapokat rajzolunk. A felosztást finomítva, ha a téglalapok összterületére közös határértéket kapunk, akkor az lesz az integrál értéke.




Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon. Felosztjuk az intervallumot, majd a függvényértékek alá és fölé téglalapokat rajzolunk. A felosztást finomítva, ha a téglalapok összterületére közös határértéket kapunk, akkor az lesz az integrál értéke.



Riemann Integrál, nagykép

Először is feltesszük, hogy f korlátos az $[a,b]$ kompakt intervallumon. Felosztjuk az intervallumot, majd a függvényértékek alá és fölé téglalapokat rajzolunk. A felosztást finomítva, ha a téglalapok összterületére közös határértéket kapunk, akkor az lesz az integrál értéke.



Riemann Integrál, definíciók

Definíció

Az $[a, b]$ intervallum egy *felosztása* egy $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ pontsorozat. Ebből a k -adik *résztintervallum* $I_k = [x_{k-1}, x_k]$. Ennek hossza $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Ezen felosztás *finomsága*: $\Delta F = |F| = \max_k \Delta x_k$. Egy F_n *felosztássorozat minden határon túl finomodó*, ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta F_n = 0$

Riemann Integrál, definíciók

Definíció

Az $[a,b]$ intervallum egy *felosztása* egy $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ pontsorozat. Ebből a k -adik *részintervallum* $I_k = [x_{k-1}, x_k]$. Ennek hossza $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Ezen felosztás *finomsága*: $\Delta F = |F| = \max_k \Delta x_k$. Egy F_n *felosztássorozat minden határon túl finomodó*, ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta F_n = 0$

Definíció

Egy $[a,b]$ intervallum egy F felosztásához és egy f folytonos függvényhez tartozó *alsó közelítő összeg* s_F :

$$s_F = \sum_k m_k \Delta x_k, \quad m_k = \min_{x \in I_k} f(x)$$

Riemann Integrál, definíciók

Definíció

Az $[a,b]$ intervallum egy *felosztása* egy $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ pontsorozat. Ebből a k -adik *részintervallum* $I_k = [x_{k-1}, x_k]$. Ennek hossza $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$. Ezen felosztás *finomsága*: $\Delta F = |F| = \max_k \Delta x_k$. Egy F_n felosztássorozat minden határon túl finomodó, ha $\lim_{n \rightarrow \infty} \Delta F_n = 0$

Definíció

Egy $[a,b]$ intervallum egy F felosztásához és egy f folytonos függvényhez tartozó *felső közelítő összeg* S_F :

$$S_F = \sum_k M_k \Delta x_k, \quad M_k = \max_{x \in I_k} f(x)$$

A felosztássorozat tulajdonságai

Az triviális, hogy

$$s_F \leq S_F \quad (1)$$


A felosztássorozat tulajdonságai

Az triviális, hogy

$$s_F \leq S_F \quad (1)$$

Ugyanakkor, ha F^* olyan felosztás amit F -ből kapok úgy, hogy plusz pontokat veszek hozzá akkor

$$s_F \leq s_{F^*}, \quad S_F \geq S_{F^*} \quad (2)$$




A felosztássorozat tulajdonságai

Az triviális, hogy

$$s_F \leq S_F \quad (1)$$

Ugyanakkor, ha F^* olyan felosztás amit F -ből kapok úgy, hogy plusz pontokat veszek hozzá akkor

$$s_F \leq s_{F^*}, \quad S_F \geq S_{F^*} \quad (2)$$



A felosztássorozat tulajdonságai II

Ha F_1 és F_2 két tetszőleges felosztás akkor

$$s_{F_1} \leq s_{F_2} \quad (3)$$

Mivel $s_{F_1} \leq_{(2)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(1)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(2)} s_{F_2}$.

A felosztássorozat tulajdonságai II

Ha F_1 és F_2 két tetszőleges felosztás akkor

$$s_{F_1} \leq s_{F_2} \quad (3)$$

Mivel $s_{F_1} \leq_{(2)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(1)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(2)} s_{F_2}$.

Legyen $h = \sup_F \{s_F\}$, $H = \inf_F \{S_F\}$.

A felosztássorozat tulajdonságai II

Ha F_1 és F_2 két tetszőleges felosztás akkor

$$s_{F_1} \leq S_{F_2} \quad (3)$$

Mivel $s_{F_1} \leq_{(2)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(1)} S_{F_1 \cup F_2} \leq_{(2)} S_{F_2}$.

Legyen $h = \sup_F \{s_F\}$, $H = \inf_F \{S_F\}$.

Mivel $s_F \leq S_F$ minden F -re ezért $h \leq H$

A felosztássorozat tulajdonságai II

Ha F_1 és F_2 két tetszőleges felosztás akkor

$$s_{F_1} \leq S_{F_2} \quad (3)$$

Mivel $s_{F_1} \leq_{(2)} s_{F_1 \cup F_2} \leq_{(1)} S_{F_1 \cup F_2} \leq_{(2)} S_{F_2}$.

Legyen $h = \sup_F \{s_F\}$, $H = \inf_F \{S_F\}$.

Mivel $s_F \leq S_F$ minden F -re ezért $h \leq H$

Bizonyítható: Ha F_n egy minden határon túl finomodó felosztássorozat akkor

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{F_n} = h, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_{F_n} = H$$

Integrálhatóság

Definíció

Azt mondjuk, hogy f *Riemann-integrálható* $[a,b]$ -n ha $h = H$, vagyis az alsó közelítő összegek legkisebb felső korlátja (szuprémuma) és a felső közelítő összegek legnagyobb alsó korlátja (infimuma) megegyezik.

Integrálhatóság

Definíció

Azt mondjuk, hogy f *Riemann-integrálható* $[a,b]$ -n ha $h = H$, vagyis az alsó közelítő összegek legkisebb felső korlátja (szuprémuma) és a felső közelítő összegek legnagyobb alsó korlátja (infimuma) megegyezik.

Másképp megfogalmazva: f integrálható, ha egy minden határon túl finomodó F_n felosztássorozatra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{F_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{F_n} = \int_a^b f(x) dx$$

Integrálhatóság

Definíció

Azt mondjuk, hogy f *Riemann-integrálható* $[a,b]$ -n ha $h = H$, vagyis az alsó közelítő összegek legkisebb felső korlátja (szuprénuma) és a felső közelítő összegek legnagyobb alsó korlátja (infimuma) megegyezik.

Másképp megfogalmazva: f integrálható, ha egy minden határon túl finomodó F_n felosztássorozatra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_{F_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{F_n} = \int_a^b f(x) dx$$

Jelölés: Ha f integrálható $[a,b]$ -n, akkor $f \in R_{[a,b]}$.

Példák

Például: Ha $f(x) \equiv c$ $[a,b]$ -n akkor

$$s_F = S_F = c(b - a)$$

minden F felosztásra.

Példák

Például: Ha $f(x) \equiv c$ $[a,b]$ -n akkor

$$s_F = S_F = c(b - a)$$

minden F felosztásra.

Például: Legyen D a Dirichlet-függvény

$$D(x) = \begin{cases} 1 & , \text{ha } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & , \text{ha } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Akkor bárhogy veszek egy F felosztást, az $[a,b]$ intervallumban lesz racionális és irracionális szám is, ezért

$$s_F = 0, \quad S_F = 1, \text{ ha } [a,b] \text{ 1 hosszú.}$$

Így a D Dirichlet-függvény nem Riemann-integrálható.

Integrálhatóság matematikai feltétele

Definíció

Az F felosztáshoz tartozó oszcillációs összeg:

$$0 \leq \Omega_F = S_F - s_F = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k$$

Integrálhatóság matematikai feltétele

Definíció

Az F felosztáshoz tartozó oszcillációs összeg:

$$0 \leq \Omega_F = S_F - s_F = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k$$

Tehát

$$\exists \int_a^b f(x) dx \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists F \text{ melyre } \Omega_F \leq \varepsilon.$$

Milyen függvények integrálhatók?

Tétel

Ha f monoton és korlátos, akkor integrálható.

Milyen függvények integrálhatók?

Tétel

Ha f monoton és korlátos, akkor integrálható.

Bizonyítás: Legyen f monoton növekvő, ekkor

$$\Delta x_k = \frac{b-a}{n} \text{ (Egyenletesen osszuk fel az intervallumot)}$$

$$\begin{aligned} \Omega_F &= \sum_{k=1}^n (M_k - m_k) \Delta x_k = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k) - f(x_{k-1}) = \\ &= \frac{b-a}{n} (f(x_1) - f(x_0) + f(x_2) - f(x_1) + f(x_3) - f(x_2) + \cdots + \\ &\quad + f(x_n) - f(x_{n-1})) = \frac{b-a}{n} (f(b) - f(a)) \end{aligned}$$

Ez viszont kisebb mint ε , ha $n \geq \frac{(b-a)(f(b)-f(a))}{\varepsilon}$.

Integrálható függvények, integrál közelítő összeg

Megmutatható:

- 1 Ha f folytonos, akkor integrálható.
- 2 Az integrál értéke nem változik, ha a függvényt véges sok pontban megváltoztatom.

Integrálható függvények, integrál közelítő összeg

Megmutatható:

- 1 Ha f folytonos, akkor integrálható.
- 2 Az integrál értéke nem változik, ha a függvényt véges sok pontban megváltoztatom.

Sőt, f integrálható, ha véges sok monoton vagy folytonos függvényből képzett szakaszonként értelmezett függvény.

Integrálható függvények, integrál közelítő összeg

Megmutatható:

- ❶ Ha f folytonos, akkor integrálható.
- ❷ Az integrál értéke nem változik, ha a függvényt véges sok pontban megváltoztatom.

Sőt, f integrálható, ha véges sok monoton vagy folytonos függvényből képzett szakaszonként értelmezett függvény.

Például: ha

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x), & \text{ha } x \in [a, x_1) \\ f_2(x), & \text{ha } x \in [x_1, x_2) \\ f_3(x), & \text{ha } x \in (x_2, x_3) \\ \vdots & \\ f_l(x), & \text{ha } x \in (x_{l-1}, x_l = b] \end{cases}$$

és f_i -k monotonok, vagy folytonosak, akkor $f(x)$ is integrálható.

A határozott integrál tulajdonságai

Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

A határozott integrál tulajdonságai

1 Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

2 $\int_a^a f(x) dx = 0$

A határozott integrál tulajdonságai

1 Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

2 $\int_a^a f(x) dx = 0$

3 Ha $f \in R_{[a,c]}$ és $f \in R_{[c,b]}$ ($a < c < b$) $\Rightarrow f \in R_{[a,b]}$ és

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

A határozott integrál tulajdonságai

1 Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

2 $\int_a^a f(x) dx = 0$

3 Ha $f \in R_{[a,c]}$ és $f \in R_{[c,b]}$ ($a < c < b$) $\Rightarrow f \in R_{[a,b]}$ és

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

4 Ha $f \in R_{[a,b]}$ és $f(x) \geq 0$ ha $x \in [a,b]$ $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$

A határozott integrál tulajdonságai

1 Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

2 $\int_a^a f(x) dx = 0$

3 Ha $f \in R_{[a,c]}$ és $f \in R_{[c,b]}$ ($a < c < b$) $\Rightarrow f \in R_{[a,b]}$ és

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

4 Ha $f \in R_{[a,b]}$ és $f(x) \geq 0$ ha $x \in [a,b]$ $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$

5 Ha $f \in R_{[a,b]}$, akkor $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

Integrál közelítő összeg

Definíció

Az f függvény F felosztáshoz tartozó *integrálközelítő összege*:

$$\sigma_F = \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1})$$

ahol $c_k \in I_k = [x_{k-1}, x_k]$ reprezentáns pont, $f(c_k)$ a reprezentáns függvényérték.

Integrál közelítő összeg

Definíció

Az f függvény F felosztáshoz tartozó *integrálközelítő összege*:

$$\sigma_F = \sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1})$$

ahol $c_k \in I_k = [x_{k-1}, x_k]$ reprezentáns pont, $f(c_k)$ a reprezentáns függvényérték.

Nyilvánvaló: $s_F \leq \sigma_F \leq S_F$, ezért:

Ha $f \in R_{[a,b]} \Rightarrow$ Rendőr elv. $\Rightarrow$ az összes minden határon túl finomodó F_n felosztássorozatra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{F_n} = \int_a^b f(x) dx$$

Newton-Leibniz formula

Az integrál gyakorlati kiszámításához ad segítséget az alábbi formula.
Ehhez, kell először egy definíció:

Newton-Leibniz formula

Az integrál gyakorlati kiszámításához ad segítséget az alábbi formula. Ehhez, kell először egy definíció:

Definíció

Az $f(x)$ függvény *primitív függvénye* $F(x)$, ha $F'(x) = f(x)$.

Newton-Leibniz formula

Az integrál gyakorlati kiszámításához ad segítséget az alábbi formula. Ehhez, kell először egy definíció:

Definíció

Az $f(x)$ függvény *primitív függvénye* $F(x)$, ha $F'(x) = f(x)$.

Példa: $x^2 + 1$ primitív függvénye a $\frac{x^3}{3} + x$ és $\frac{x^3}{3} + x + 100$ is.

Tétel (Newton-Leibniz formula)

Legyen $g(x) \in R_{[a,b]}$ és legyen $G(x)$ az $g(x)$ primitív függvénye, ekkor:

$$\int_a^b g(x) dx = G(b) - G(a).$$

Példa

$$\int_1^3 x^2 + 1 \, dx = ?$$

Példa

$$\int_1^3 x^2 + 1 \, dx = ?$$

Tehát itt $f(x) = x^2 + 1$. A Newton-Leibniz formula szerint:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) \text{ ahol } F(x) \text{ az } f(x) \text{ függvény primitív függvénye.}$$

Példa

$$\int_1^3 x^2 + 1 \, dx = ?$$

Tehát itt $f(x) = x^2 + 1$. A Newton-Leibniz formula szerint:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) \text{ ahol } F(x) \text{ az } f(x) \text{ függvény primitív függvénye.}$$

Az $x^2 + 1$ primitív függvénye például a $\frac{x^3}{3} + x$. Így:

$$\begin{aligned} \int_1^3 x^2 + 1 \, dx &= F(3) - F(1) = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{x=3} - \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{x=1} = \\ &= \left(\frac{27}{3} + 3 \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = 11 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Határozatlan integrál definíciója

Láttuk, hogy a primitív függvény(ek) fontosak abban, hogy ki tudjuk számítani a függvények alatti területet.

Határozatlan integrál definíciója

Láttuk, hogy a primitív függvény(ek) fontosak abban, hogy ki tudjuk számítani a függvények alatti területet.

Ha $F(x)$ primitív függvény, akkor $F(x) + C$ is az (ahol C egy tetszőleges konstans jelöl). Az **Integrálszámítás első főtétele**ből tudjuk, hogy más primitív függvény nincsen.

Határozatlan integrál definíciója

Láttuk, hogy a primitív függvény(ek) fontosak abban, hogy ki tudjuk számítani a függvények alatti területet.

Ha $F(x)$ primitív függvény, akkor $F(x) + C$ is az (ahol C egy tetszőleges konstans jelöl). Az **Integrálszámítás első főtétele**ből tudjuk, hogy más primitív függvény nincsen.

Definíció

Az $f(x)$ **határozatlan integrálján** az $f(x)$ összes primitív függvényének a halmazát értjük. Jele: $\int f(x) dx$.

Határozatlan integrál definíciója

Láttuk, hogy a primitív függvény(ek) fontosak abban, hogy ki tudjuk számítani a függvények alatti területet.

Ha $F(x)$ primitív függvény, akkor $F(x) + C$ is az (ahol C egy tetszőleges konstans jelöl). Az **Integrálszámítás első főtétele**ből tudjuk, hogy más primitív függvény nincsen.

Definíció

Az $f(x)$ **határozatlan integrálján** az $f(x)$ összes primitív függvényének a halmazát értjük. Jele: $\int f(x) dx$.

Például:

$$\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C$$

Határozatlan integrál definíciója

Láttuk, hogy a primitív függvény(ek) fontosak abban, hogy ki tudjuk számítani a függvények alatti területet.

Ha $F(x)$ primitív függvény, akkor $F(x) + C$ is az (ahol C egy tetszőleges konstans jelöl). Az **Integrálszámítás első főtételéből** tudjuk, hogy más primitív függvény nincsen.

Definíció

Az $f(x)$ **határozatlan integrálján** az $f(x)$ összes primitív függvényének a halmazát értjük. Jele: $\int f(x) dx$.

Például:

$$\int x \, dx = \frac{x^2}{2} + C$$

Ezt ellenőrizni úgy lehet, hogy visszaderiváljuk tehát $(\frac{x^2}{2} + C)' = \frac{2x}{2}$

Határozatlan integrál néhány tulajdonsága

A deriválási szabályok és a definíció miatt:

Határozatlan integrál néhány tulajdonsága

A deriválási szabályok és a definíció miatt:

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

Határozatlan integrál néhány tulajdonsága

A deriválási szabályok és a definíció miatt:

$$\int (f(x) + g(x)) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

$$\int c \cdot f(x) \, dx = c \cdot \int f(x) \, dx$$

Határozatlan integrál néhány tulajdonsága

A deriválási szabályok és a definíció miatt:

$$\int (f(x) + g(x)) \, dx = \int f(x) \, dx + \int g(x) \, dx$$

$$\int c \cdot f(x) \, dx = c \cdot \int f(x) \, dx$$

$$\int x^\alpha \, dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad \alpha \neq -1$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx =$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx = x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\begin{aligned}\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx &= x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C \\ &= x + x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{4}x^4 + C\end{aligned}$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\begin{aligned}\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx &= x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C \\ &= x + x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{4}x^4 + C\end{aligned}$$

$$\int \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} + x^\pi + x^{e+1} dx =$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\begin{aligned}\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx &= x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C \\ &= x + x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{4}x^4 + C\end{aligned}$$

$$\int \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} + x^\pi + x^{e+1} dx = \int x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{4}{3}} + x^\pi + x^{e+1} dx =$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\begin{aligned}\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx &= x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C \\ &= x + x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{4}x^4 + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} + x^\pi + x^{e+1} dx &= \int x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{4}{3}} + x^\pi + x^{e+1} dx = \\ &= \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} + \frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} + \frac{x^{e+2}}{e+2} + C\end{aligned}$$

Példák: $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$

$$\begin{aligned}\int 1 + 2x + 5x^2 + 7x^3 dx &= x + 2\frac{x^2}{2} + 5\frac{x^3}{3} + 7\frac{x^4}{4} + C \\ &= x + x^2 + \frac{5}{3}x^3 + \frac{7}{4}x^4 + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt[3]{x^4}} + x^\pi + x^{e+1} dx &= \int x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{4}{3}} + x^\pi + x^{e+1} dx = \\ &= \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{-\frac{1}{3}}}{-\frac{1}{3}} + \frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} + \frac{x^{e+2}}{e+2} + C \\ &= \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} - 3x^{-\frac{1}{3}} + \frac{x^{\pi+1}}{\pi+1} + \frac{x^{e+2}}{e+2} + C\end{aligned}$$

Egy fontos példa

Példa:

$$\int \frac{1}{x} dx = ?$$

Tudjuk, hogy $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, így logikus lenne, hogy $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$, ahol $C \in \mathbb{R}$ egy tetszőleges konstans. De ez azt jelentené, hogy a primitív függvény csak a pozitív számokra értelmezett. Kérdés, tudunk-e mondani valamit a negatív számok esetén.

Egy fontos példa

Példa:

$$\int \frac{1}{x} dx = ?$$

Tudjuk, hogy $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, így logikus lenne, hogy $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$, ahol $C \in \mathbb{R}$ egy tetszőleges konstans. De ez azt jelentené, hogy a primitív függvény csak a pozitív számokra értelmezett. Kérdés, tudunk-e mondani valamit a negatív számok esetén.

Vizsgáljuk meg $\ln(-x)$ deriváltját! Ez a függvény csak a negatív számokra értelmezett.

Egy fontos példa

Példa:

$$\int \frac{1}{x} dx = ?$$

Tudjuk, hogy $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, így logikus lenne, hogy $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$, ahol $C \in \mathbb{R}$ egy tetszőleges konstans. De ez azt jelentené, hogy a primitív függvény csak a pozitív számokra értelmezett. Kérdés, tudunk-e mondani valamit a negatív számok esetén.

Vizsgáljuk meg $\ln(-x)$ deriváltját! Ez a függvény csak a negatív számokra értelmezett.

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{-x}(-x)' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$$

Egy fontos példa

Példa:

$$\int \frac{1}{x} dx = ?$$

Tudjuk, hogy $\ln'(x) = \frac{1}{x}$, így logikus lenne, hogy $\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$, ahol $C \in \mathbb{R}$ egy tetszőleges konstans. De ez azt jelentené, hogy a primitív függvény csak a pozitív számokra értelmezett. Kérdés, tudunk-e mondani valamit a negatív számok esetén.

Vizsgáljuk meg $\ln(-x)$ deriváltját! Ez a függvény csak a negatív számokra értelmezett.

$$(\ln(-x))' = \frac{1}{-x}(-x)' = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$$

Ennek is $\frac{1}{x}$ a deriváltja!

Egy fontos példa II

Tehát $\frac{1}{x}$ primitív függvénye $\ln(x)$ ha x pozitív, és $\ln(-x)$ ha x negatív. Így:

Egy fontos példa II

Tehát $\frac{1}{x}$ primitív függvénye $\ln(x)$ ha x pozitív, és $\ln(-x)$ ha x negatív. Így:

$$\int \frac{1}{x} = \ln |x|$$

Egy fontos példa II

Tehát $\frac{1}{x}$ primitív függvénye $\ln(x)$ ha x pozitív, és $\ln(-x)$ ha x negatív. Így:

$$\int \frac{1}{x} = \ln |x|$$

Példa:

$$\int \frac{1}{3x+4} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{x+\frac{4}{3}} dx = \frac{\ln \left| x + \frac{4}{3} \right|}{3} + C$$

További szabályok

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

További szabályok

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

Példa:

$$\int \frac{2 \cdot 5^x + 5 \cdot 2^x}{5^x} dx = \int 2 + 5 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x dx = 2x + \frac{5}{\ln\left(\frac{2}{5}\right)} \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^x + C$$

További szabály

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

További szabály

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\int (2x + 5)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{2 \cdot \frac{5}{2}} + C$$

További szabály

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int (2x + 5)^{\frac{3}{2}} dx &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{2 \cdot \frac{5}{2}} + C \\ &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{5} + C \end{aligned}$$

További szabály

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int (2x + 5)^{\frac{3}{2}} dx &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{2 \cdot \frac{5}{2}} + C \\ &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{5} + C \end{aligned}$$

$$\int \sinh(5x - 7) dx =$$

További szabály

$$\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int (2x + 5)^{\frac{3}{2}} dx &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{2 \cdot \frac{5}{2}} + C \\ &= \frac{(2x + 5)^{\frac{5}{2}}}{5} + C \end{aligned}$$

$$\int \sinh(5x - 7) dx = \frac{\cosh(5x - 7)}{5} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx = \frac{(5 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{-2^{\frac{3}{2}}} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx = \frac{(5 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{-2 \cdot \frac{3}{2}} + C = -\frac{\sqrt{(5 - 2x)^3}}{3} + C$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln|4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx = \frac{(5 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{-2 \cdot \frac{3}{2}} + C = -\frac{\sqrt{(5 - 2x)^3}}{3} + C$$

$$\int (1 + e^x)^2 dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx = \frac{(5 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{-2 \cdot \frac{3}{2}} + C = -\frac{\sqrt{(5 - 2x)^3}}{3} + C$$

$$\int (1 + e^x)^2 dx = \int 1 + 2e^x + e^{2x} dx =$$

Példák: $\int f(ax + b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + C$, ahol
 $\int f(x) dx = F(x)$

$$\int \frac{1}{\cos^2(4 - 3x)} dx = \frac{\tan(4 - 3x)}{-3} + C$$

$$\int \frac{1}{4 - 3x} dx = \frac{\ln |4 - 3x|}{-3} + C$$

$$\int \frac{e^{7x+1}}{e^{2x}} dx = \int e^{5x+1} dx = \frac{e^{5x+1}}{5} + C$$

$$\int \sqrt{5 - 2x} dx = \frac{(5 - 2x)^{\frac{3}{2}}}{-2 \cdot \frac{3}{2}} + C = -\frac{\sqrt{(5 - 2x)^3}}{3} + C$$

$$\int (1 + e^x)^2 dx = \int 1 + 2e^x + e^{2x} dx = x + 2e^x + \frac{e^{2x}}{2} + C$$

További szabály

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

További szabály

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

Példa:

$$\int \frac{x^2}{x^3 + 3} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3x^2}{x^3 + 3} dx = \frac{\ln |x^3 + 3|}{3} + C$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

$$\int \frac{e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

$$\int \frac{e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

$$\int \frac{e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{\ln |5 + e^{2x}|}{2} + C$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

$$\int \frac{e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{\ln |5 + e^{2x}|}{2} + C$$

$$\int \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} dx =$$

Példák: $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$

$$\int \frac{1}{x \ln(x)} dx = \int \frac{\frac{1}{x}}{\ln(x)} dx = \ln |\ln(x)| + C$$

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \ln |\cos(x)| + C$$

$$\int \frac{2x + 3}{x^2 + 3x} dx = \ln |x^2 + 3x| + C$$

$$\int \frac{e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2e^{2x}}{5 + e^{2x}} dx = \frac{\ln |5 + e^{2x}|}{2} + C$$

$$\int \frac{\sin(x)}{1 - \cos(x)} dx = \ln |1 - \cos(x)| + C$$

További szabály

$$\int f'(x)f^{\alpha}(x) \, dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$$

További szabály

$$\int f'(x) f^{\alpha}(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$$

Példa:

$$\int \sin^3(x) \cos(x) dx = \frac{\sin^4(x)}{4} + C$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx =$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx =$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) \, dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} \, dx = -\frac{1}{2} \frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) \, dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} \, dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \arctan^2(x) dx =$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \arctan^2(x) dx = \frac{\arctan^3(x)}{3} + C$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \arctan^2(x) dx = \frac{\arctan^3(x)}{3} + C$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{\tan(x)}}{\cos^2(x)} dx =$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \arctan^2(x) dx = \frac{\arctan^3(x)}{3} + C$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{\tan(x)}}{\cos^2(x)} dx = \int \frac{1}{\cos^2(x)} \tan^{\frac{1}{3}}(x) dx =$$

Példák: $\int f'(x)f^\alpha(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + C$

$$\int x\sqrt{3-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int -2x(3-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = -\frac{(3-x^2)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int \frac{\arctan^2(x)}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{1+x^2} \arctan^2(x) dx = \frac{\arctan^3(x)}{3} + C$$

$$\int \frac{\sqrt[3]{\tan(x)}}{\cos^2(x)} dx = \int \frac{1}{\cos^2(x)} \tan^{\frac{1}{3}}(x) dx = \frac{\tan^{\frac{4}{3}}(x)}{\frac{4}{3}} + C$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\int \frac{e^{2\sqrt{x}+1}}{\sqrt{x}} dx = \int e^{2\sqrt{x}+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = e^{2\sqrt{x}+1} + C$$

$$\text{ahol } \int f(x) dx = \int e^x dx = e^x = F(x)$$

$$\text{és } \phi(x) = 2\sqrt{x} + 1 = 2x^{\frac{1}{2}}, \quad \phi'(x) = x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int \cos(x^2 + 4x - 7) \cdot (x + 2) dx &= \frac{1}{2} \int \cos(x^2 + 4x - 7) \cdot (2x + 4) dx = \\ &= \frac{1}{2} \sin(x^2 + 4x - 7) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ahol } \int f(x) dx &= \int \cos(x) dx = \sin(x) = F(x) \\ \text{és } \phi(x) &= x^2 + 4x - 7, \quad \phi'(x) = 2x + 4 \end{aligned}$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

További szabály

$$\int f(\phi(x))\phi'(x) dx = F(\phi(x)) + C, C \in \mathbb{R}, \text{ ahol } \int f(x) dx = F(x)$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sin(x) \cos(x)} dx &= \int \frac{\cos(x)}{\sin(x)} \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \\ &= \int \frac{1}{\tan(x)} \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \ln(|\tan(x)|) + C \end{aligned}$$

$$\text{ahol } \int f(x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| = F(x)$$

$$\text{és } \phi(x) = \tan(x), \quad \phi'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$