

Matematika A3 építőmérnököknek 6. gyakorlat

Kombinatorika, a valószínűségi modell és annak egyszerű következményei, klasszikus valószínűségi modell

Kombinatorika

Permutáció

- Ismétlés nélküli permutáció: n különböző elemet hányféleképpen lehet sorba rendezni: $P_n = n!$.
- Ismétléses permutáció: n elemet hányféleképpen lehet sorba rendezni, ha ezek közül k_1, k_2, \dots, k_s egyforma: $P_n^{(k_1, k_2, \dots, k_s)} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_s!}$.

Kombináció

- Ismétlés nélküli kombináció: n különböző elemből hányféleképpen lehet k darabot kiválasztani: $C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \binom{n}{k}$.
- Ismétléses kombináció: n különböző elemből hányféleképpen lehet k darabot kiválasztani, ha egy elemet többször is választhatunk: $C_n^{k,i} = \binom{n+k-1}{k}$.

Variáció

- Ismétlés nélküli variáció: n különböző elemből hányféleképpen lehet k darabot kiválasztani, ha a sorrend is számít: $V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$.
- Ismétléses variáció: n különböző elemből hányféleképpen lehet k darabot kiválasztani, ha a sorrend is számít és egy elemet többször is választhatunk: $V_n^{k,i} = n^k$.

1. feladat Hányféleképpen alakulhat a 12 csapatos NBI tabellája, ha tudjuk, hogy a Fradi kiemelkedik, így vezeti a bajnokságot, az Újpest pedig leggyengébb csapatként a megérdemelt, utolsó helyet foglalja el? És, ha azt is tudjuk, hogy a Felcsút biztosan a tabella első felében van?

2. feladat Az ELŐVÁLASZTÁS szó betűinek összekeverésével hány különböző (nem feltétlenül értelmes) 12 betűs szó készíthető? És a VADÁSZKIÁLLÍTÁS betűiből hány 15 betűs?

3. feladat A differenciálegyenletek zh-n 10 különböző típusú feladat lehet.

- Hányféleképpen lehet összeállítani az 5 feladatos dolgozatot, ha tudjuk, hogy minden feladat különböző típusú és minket csak az érdekel, hogy milyen típusú egyenletek szerepelnek?
- Hogyan változik ez a szám, ha egy típus többször is szerepelhet?
- Mennyi a lehetőségek száma a két esetben, ha azt is tudni akarjuk, hogy melyik feladat melyik differenciálegyenlet típusba sorolható?

4. feladat A fenti zárthelyre a hallgatók olyan jól felkészültek, hogy senkit se sikerült megbuktatni. 2 darab kettes, 4 darab hármas, 5 darab négyes és 8 darab ötös dolgozat született. Hányféleképpen lehet kiválasztani 5 hallgatót úgy, hogy a jegyeik között szerepeljen mind a négy osztályzat?

5. feladat Egy másik tanszéken véletlenszerűen osztályoznak, csak azt határozzák meg előre, hogy a különböző osztályzatokból hány darabnak kell születnie. Hányféleképpen alakulhatnak a hallgatók jegyei egy 20 fős csoportban, ha minden érdemjegyhez 4-4 hallgatót szeretnének kiválasztani?

A valószínűségi modell és annak egyszerű következményei, klasszikus valószínűségi modell

Véletlen kísérletek eredményét vizsgáljuk. Lehetséges kimeneteleket **elemi eseményeknek** nevezzük, ezek összessége az **eseménytér**. Az eseménytér tetszőleges részhalmazát **eseménynek** nevezzük.

Például kockadobásnál az elemi események (a dobás lehetséges eredményei): 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az eseménytér: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Események például: $A = \{\text{páros dobunk}\}$, $B = \{\text{a dobás 1 vagy 2}\}$.

Alapfogalmak:

- A és B esemény egymás **komplementere**, ha biztosan az egyik következik be közülük, jel: $B = \bar{A} = A^C$.
- E az A és B **uniója** (vagy összege), ha E pontosan akkor következik be, ha A és B közül legalább az egyik: $E = A + B = A \cup B$.
- F az A és B **metszete** (vagy szorzata), ha F pontosan akkor következik be, ha A és B is bekövetkezik: $F = A \cdot B = A \cap B$.
- G az A és B **különbsége**, ha G pontosan akkor következik be, ha A bekövetkezik, de B nem: $G = A - B = A \setminus B$.
- A és B **egymást kizáró események**, ha egyszerre soha nem következnek be.
- A **maga után vonja** B eseményt, ha A bekövetkezése esetén B is bekövetkezik: $A \subset B$.

Ha egy kísérletet végtelen sokszor megismételhetünk és n_A -val jelöljük azon kísérletek számát, ahányszor A esemény bekövetkezik n kísérletből, akkor $\frac{n_A}{n}$ egy számhoz fog tartani, ezt nevezzük A **valószínűségének**, $\mathbb{P}(A)$ -val jelöljük.

A valószínűség axiómái, alaptulajdonságai

- $0 \leq \mathbb{P}(E) \leq 1$ minden E eseményre
- $\mathbb{P}(S) = 1$, $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, ahol S az eseménytér
- Ha $A = A_1 + \dots + A_k + \dots$ és $A_i \cdot A_j = \emptyset$ minden $i \neq j$ -re, akkor $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A_1) + \dots + \mathbb{P}(A_k) + \dots$
- $\mathbb{P}(E^C) = 1 - \mathbb{P}(E)$
- $\mathbb{P}(E) \leq \mathbb{P}(F)$, ha $E \subset F$
- $\mathbb{P}(E \cup F) = \mathbb{P}(E) + \mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(E \cap F)$
- $\mathbb{P}(A \cup B \cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A \cap C) - \mathbb{P}(B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap C)$
- Ha egy kísérletnek véges sok kimenetele lehet és ezek mind azonos valószínűséggel következnek be, akkor egy E esemény valószínűsége:

$$\mathbb{P}(E) = \frac{E\text{-beli elemi események száma}}{\text{az összes elemi esemény száma}}$$

6. feladat Két dobozba 7 golyót teszünk, véletlenszerűen. Mi a valószínűsége, hogy mindkét dobozban lesz golyó?

7. feladat Egy dobozban van 7 zöld és 4 fehér golyó. Visszatevés nélkül kiveszünk hármat. Mi a valószínűsége, hogy az első kettő zöld és a harmadik fehér lesz?

8. feladat Az A illetve B urnák 4 zöld és 8 fehér illetve 2 zöld és 3 fehér golyót tartalmaznak. Ha egy-egy golyót kiveszünk a két urnából, mi a valószínűsége, hogy különböző színűek lesznek?

9. feladat Ha két kockát feldobunk, mi a valószínűsége, hogy a két dobás eltérése legfeljebb 2?

10. feladat Öt ember, nevezzük őket A, B, C, D, E-nek, véletlenszerűen leül egy padra. Mi a valószínűsége, hogy A balra ül B-től és B balra ül C-től?

11. feladat Az 1-től 1000-ig terjedő számok közül találmra kiválasztunk egyet. Mi a valószínűsége, hogy a szám 3-mal vagy 5-tel osztható?

12. feladat Egy dobozban 3 új és 2 használt teniszlabda van. Találmra kiveszünk egyet és játszunk vele, majd visszatesszük a dobozba. A következő játékban (ismét találmra kivéve egyet) milyen valószínűséggel játszunk majd új labdával?

13. feladat Öt ember, nevezzük őket A, B, C, D, E - nek, véletlenszerűen leül egy padra. Mi a valószínűsége, hogy A és B egymás mellé ül?

14. feladat Két férfi és három nő ül egy padon. Mi a valószínűsége, hogy nemek szerint felváltva ülnek?